


UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

WASHINGTON, D.C.

ICONES ANATOMICAE
QUIBUS
PRAECIPUAE ALIQUAE PARTES
CORPORIS HUMANI

DELINEATAE PROPONUNTUR
& Arteriarum potissimum Historia

CONTINETUR

AUCTORE

ALBERTO DE HALLER

SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM GOTTINGENSIS PRAESIDE, ACADD.
ET SOCIETT. GALLICAE SCIENTIARUM ET CHIRURGIAE, BRITANNICAE,
IMPERIALIS, BORUSSICAE, SUECICAE, UPSALIENSIS, BONONIENSIS,
FLORENTINAE BOTANICAE, HELVETICAE &c. SODALI, SUPREMI
SENATUS REIPUBLICAE BERNENSIS DUCENTUMVIRO,
PRAEFECTO CURIAE, ET TRIUMVIRO
CURANDAE VALETUDINIS.



GOTTINGAE.

APUD VIDUAM B. ABRAMI VANDENHOECKII

MDCCLVI.

ICONES ANATOMICAE

QUIBUS

PRAECEPTAE ALIQUAE PARTES

CORPORIS HUMANI

DELINEATAE PROPOUNUNTUR

& Arteriarum possumunt Historiam

CONTINETUR

AUCTOR

ALBERTO DE HALLER

SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM GOTTINGENSIS PRAESIDE, ACAD.
ET SOCIET. GALLICAE SCIENTIARUM ET CHIRURGICAE, BRITANNICAE
IMPERIALIS, BORUSSICAE, SUEVICAE UPSALIENSIS, BONONIENSIS,
FLORENTINAE BOTANICAE, HELVETICAE AC SODAL. SUPREMI
SENATUS REIPUBLICAE BERNEENSIS DUCENTUMVIRI,
PRAEFECTO CURIAE, ET TRIMUMVIRI
CURANDAE VALETUDINIS.

GOTTINGAE

APUD VIDEAM B. ABRAMI VANDERHOEGEN

MDCCLXXI

GEORGIO SECONDO

MAGNAE BRITANNIAE, FRANCIAE ET HIBERNIAE REGI

DEFENSORI FIDEI

DUCI BRUNSVICI LUNEBURGI

S. R. IMPERII ELECTORI.

Has in Tuā Academia natas scholas Augusto
Tuo nomini dedicare jubet gratus, quo
beneficia Tua non desino recolere, animus. Tua
factum est beneficentia, REGUM optime, ut cu-
ris de sumtibus impendendis solutus, opportuni-
tatibus abundarem, quibus has ipsas corporis hu-
mani imagines perficere, & repetitis experimen-
tis emendare liceret. Addidit animum munifi-
centia Tua, ut longis laboribus sensim propius ad
naturam progrederer, quam pauca pericula nun-

quam

quam adtigissent. Decora voluisti rebus meis accedere, quae etiam invitum ad enitendum animarent. A Tua Academia in Helvetiam reverso iussisti Tuos mecum manere honores, & societatis conditae curam, cum qua Regium Nomen communicare non es dedignatus. Adeo, quantum in libera republica viventi homini licet, Tibi me voluisti devinctum, ut animo certe & voluntate Tuus essem, quem sibi patria vindicaverat. Innocentissima certe vincula sunt, quibus detineor, literarum amor, & iusta Tuae benignitatis recordatio.

Haec Tua beneficia humili homini laudasse vel ideo licuerit, quod Britannorum princeps, legum & aequi & libertatis custos integerrimus, longe a Te illorum, sive Reges sunt, sive Tyranni, tumores repudies, qui sibi solis integras gentes natas, seque a civibus suis eo intervallo distinctos reputant, quod metus sejunctum servet, nulla vero caritas unquam diminuat. Tu vero eum verissime regnare dudum sensisti, qui animis imperet, perque beneficia sua, tamquam placidissimum & tamen valentissimum clavum, populorum mentes gubernet.

Ita porro Te FIDEI DEFENSOREM, Britanniae, Europae universo orbi, divina clementia porro indulgeat, publicae libertatis & foederum unicum vindicem. Bernae D. 3. Junii 1756.

ICONUM ANATOMICARUM
QUIBUS PRAECIPUAE PARTES
CORPORIS HUMANI

DELINEATAE CONTINENTUR

FASCICULUS I.

Diaphragma, Medulla Spinalis,
Vagina Uteri, Omentum, &
Cranii Basis.

George G. G. G.
LIBRARY
28787
Washington, D.C.



G.D. Schumacher Grav. de la Cour de S.M. Brit. & de l'Univ. de Göttingen

GOTTINGAE,
APUD ABRAM VANDENHOECK
MDCCXLIII.

ICONUM ANATOMICARUM


QUEBUS PRÆCIPUÆ PARTES

CORPORIS HUMANI

DELINEATAE CONTINENTUR

FASCICULUS I

Diaphragma, Medulla Spinalis,
Vagina Uteri, Omentum, &
Cranii Basis.



GOTTINGÆ

APUD ABRAHAM VANDERHOECH

MDCCLXIII

D. ALBERTUS HALLER
ANATOMEN CADAVERIS
VIRILIS

INDICIT

AD DIEM XXIII. FEBRUAR. MDCCXLI.

ET

TABULAM NOVAM
DIAPHRAGMATIS

ADDIT.

R. ALBERTUS HALLER
ANATOMIEN CADAVERICIS
VIRILIS

INDEX

AD THEM XXIII. FEBRUARII. MDCCCLXII.

TABULAM NOVAM
DIAGNOSTICAM



D. ALBERTI HALLER
NOVA ICON
SEPTI TRANSVERSI

Cum ante hos duodecim annos Basileae Diaphragma humanum demonstravissem, nonnullis particulis ditius, quam vulgo videbam depingi, Cl. HUBERUS, tunc discipulus, nunc vero Aulæ Cassellanae Medicus & Anat. P. P. ejus iconem calamo expressit. Eam, cum uberiore descriptione, edidi ante undecim annos, non certe ita factam, ut vel naturam imitetur undique, vel mihi satisfaciat: sed talem, qualem ea Anatomici aetas pati poterat. Ergo, ut libellum irrevocabilem, & ab humanissimis hominibus iterato editum, publicae utilitati aptiorem redderem, in opportuno munere constitutus, aliquot icones veriores paravi. Harum optimam elegi, ad strangulatae feminae corpus expressam, ut addi possit libello meo, atque mentem lectoris notione justiori pulcherrimae fabricae imbuat. Simul adjeci, quae in quinque adultis corporibus, & id ALBINI, SENNACI, atque COWPERI iconibus, aut descriptionibus offendi, diversa ab iis, quae proposui, aut cum exquisitiore cura proposita.

EXPLICATIO LITTERARUM.

- A 1) Cartilago mucronata, in hoc corpore bifida.
- B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Costae a sexta ad duodecimam obiter expressae.
- B 1. Costa sexta. 2)
- B 2. Costa septima, quae oram thoracis longe efficit. 3)
- B 3. Costa octava 4), Spuriarum prima.
- B 4. Costa nona. 5)
- B 5. Costa decima. 6)
- B 6. Costa undecima 7)
- B 7. Costae duodecimae mucro 8)
- C 1. 2. 3. Vertebrae lumborum, prima, secunda, tertia 9)
- D Aortae truncus resectus. 10)
- E Ostium arteriae Coeliacae.
- F Mesenterica Superior.
- G Arteriae Renales.
- H Vena Cava in ostio suo resecta.
- I Oesophagus.
- K Psoae musculi.
- L Quadrati lumborum.
- N Nervus Intercostalis, qui in hoc corpore migravit, ex thoracis sede, ad partes abdominis, inter appendicem extimam, brevissimam, & eam, quae proxima est 11)
- O Nervus *Splanchnicus*, 12) sive ramus princeps nervi Intercostalis, qui Ganglia Semilunaria efficit.

P

1) SENNAC *Memoir. de l'Acad. des scient.* 1729. T. XIV. f. I. & II. FF. Fibrarum carnearum ab extremo apice hujus cartilaginis ortarum fasciculum vel duplicem, vel unicum, perpetuo invenio. Hunc omisit COWPERVS in T. XXXIV. & XXXV. splendidissimae *Myotomiae* 1724. fol. Adscendunt fere ad perpendicularum retro sternum, & in icone mea sola pars suprema earum exprimitur. Ad utrumque latus solent a fibris costalibus spacio aliquo dissidere, quod sola pinguedo replet, eaque remota pericardium nudum apparet SENNAC l. c. DD.

2) A cartilagine costae sextae, fere in medio, ubi propior est septimae, fasciculus carneus Diaphragmatis oritur, inferior intima origine, quae a costa septima est. Aliquando adesse ALBINVS *hist. muscul. homin.* p. 301.

3) Longe oritur ab hac costa Diaphragmo, ab ipso initio cartilaginis, juxta oram eminentem Thoracis, fere per dimidium. Confer. ALBIN. l. c. Hae fibrae carnae sunt.

4) Ab octava oritur ab ipso limite partis ossae, & a cartilagine adusque apicem.

5) Fibrae carnae ab extrema parte ossae no-

nae, & a cartilagine fere ad mucronem usque, sed paulo brevius, proveniunt.

6) Ab extrema parte ossae, & a cartilaginea, ad mucronem usque carnea est origo.

7) Ab extrema parte ossae, & continuo ad apicem usque cartilaginis.

8) Ab ea costa nihil omnino in meis cadaveribus provenit. Aliquando tamen reperit ALBINVS.

9) In aliis corporibus Diaphragma ad quartam, & quintam usque vertebrae descendit: hi tamen limites frequentiores sunt.

10) Cum Aorta ductus Thoracicus adscendit dexterior.

11) Ita in alio etiam cadavere fuit, & in sinistro latere comes nervi transiit Azyga sinistra.

12) Huc videtur facere foramen a COWPERO depictum T. XXXV. Nobiscum in sinistro latere ALBINVS. Nam in dextro facit unicam, pro utroque trunco & Azyga, viam. p. 299. atque ita vidi in latere sinistro cadaveris virilis. In alio cadavere, cum duae tantum essent appendices, per intervallum fibrarum interioris cruris transiit.

P Nervus, qui supra duodecimam vertebra[m] dor[si] oritur,
Dorsalium ultimus.

Q Q Venarum Phrenicarum ¹³⁾ reliquiae.

R *Arcus interior*, sive limes ¹⁴⁾ carnis *c*, cui Peritoneum
adhaeret. Terminatur in fibras ligamentosas, aut ten-
dineas, quae a processu transverso primae vertebrae lum-
borum veniunt. Transmittit Psoam.

S *Ligamentum valens*, ¹⁵⁾ continuum fibris tendineis muscoli
transversi abdominis. Oritur, junctis fibris cum arcu
R, a processu transverso vertebrae primae lumborum,
terminatur in apicem costae duodecimae, & perpetuum
est. Hujus ligamenti pars interior transmittit Quadratum.

T V X Y Z Tendo ¹⁶⁾ Septi transversi.

T T T Princeps tela ¹⁷⁾ fibrarum tendinearum est, quae con-
jungit carnes obpositas, appendices cum fibris a Sterno
ortis, & easdem appendices cum fibris, quae ex costis
proveniunt. Illae fibrae rectae, hae inclinatae sunt, &
transversis propiores.

V Hac sede Peritoneum, initio facto a ligamento S, fibris
tendineis splendentibus firmatur, & aliquando a carni-
bus a ligamento ortis aegre separatur.

X Fibrae tendineae, quae alae Sinistrae oram ¹⁸⁾ legunt, or-
tae a fasciculo, quem ligamentum R emittit, atque ad
superiora Oesophagi in princeps stratum T, degenerantes.

Y Magnus fasciculus ¹⁹⁾ fibrarum, in universum lunatus, cu-
jus cornua in costales carneas degenerant, pars gibba
Oesophago & venae Cavae obvertitur. Supra ²⁰⁾ hunc
fasciculum adscendunt fibrae carnum mediarum.

Z Z

¹³⁾ COWPER N. dextrum superius T. XXXV. *Norimb.* 1733. T. III. f. 1.

¹⁴⁾ SENNAC l. c. p. 168. & ic. T. T. V. Hunc arcum etiam describit Cl. DOUGLAS-
SIUS de Periton.

¹⁵⁾ SENNAC l. c. & W. In alio cadavere, pars Quadrati, ante hoc ligamentum, in thora-
cem adscendit, inter secedentes carnes Dia-
phragmatis, appendicem nempe extimam, &
fibras a ligamento ortas.

¹⁶⁾ Figuram hanc perpetuam invenio, &
eamdem in iconibus melioris notae video, ut
SENNAC l. c. COWPER, l. c. & in Collegae
conjunctissimi Cl. SEGNEI icone *Comm. Lit.*

¹⁷⁾ ALBIN. p. 304. Nuper in ala dextra fi-
brae, a cruribus ortae, cum costalibus fibris
decussatae fuerunt, cum plerumque occurren-
do continentur.

¹⁸⁾ Plerumque praeterea in media ala si-
nistra similes fibrae, a carne ligamenti, paral-
lelae his ipsis, adscendunt ALBIN. p. 304.
SENNAC in icone l. Sed in hoc cadavere nul-
lae fuerunt.

¹⁹⁾ SENNAC N. b. b. ALBIN. p. 304. *Jam*
a superiore parte &c.

²⁰⁾ Nempe rectae hoc fasciculo, & pleurae
propiores.

Z Z Intricationes variae, ²¹⁾ & vix dicendae, fibrarum, quae a Sterno ad adpendices feruntur, cum iis fibris, quae dextras costales cum sinistris conjungunt: Sternales vero retro eundo se ad dextra & sinistra disjiciunt.

α Fibrae transversae ²²⁾, quales a costalibus dextris ad sinistras feruntur, proximae carni sternali.

Γ Fasciculus *anterior Cavae* ²³⁾, tendineus, validus, ante ostium venae Cavae positus, pene transversus. Oritur partim a magno lacerto Δ, partim a fibris lacerti sinistri. Δ

Δ Fasciculus *Sinister Cavae* ²⁴⁾, ortus partim a carnibus mediis, partim a detortis & inflexis fibris fasciculi posterioris.

⊙ *Fasciculus posterior Cavae* ²⁵⁾, perpetuus, latus, continuus telae principi alae dextrae, & degenerans partim in lacertum Δ, partim, supra eum, in fibras carneas medias productus.

Λ *Fasciculus dexter venae Cavae* ²⁶⁾. In duobus cadaveribus pulcherrimus adfuit; anterieus & in costales dextras, & in lacertum Γ dispersus, & inferius in carnes costales, & a ligamentosis arcubus ortas, & medias, pulchre distributus. Pontis instar inpositus fibras transversas T contegebat, & inter ipsum, easque fibras via erat venae Phrenicae Q. Saepe minor ²⁷⁾ est, semper aliquis.

≡ Hic saepe foramen ²⁸⁾ adest pro arteria Phrenica, quando tendinis stratum infimum perforat, atque inter hoc & superius stratum decurrit.

a a a Carnes a costis ortae.

b b Carnes a ligamento S, quae fere rectae adscendunt ²⁹⁾ renemque & capsulam renalem sustinent.

c c Carnes ³⁰⁾ quae ab arcu interiori R, proveniunt.

d e

21) ALBIN. p. 306.

22) COWPER. Tab. XXXIV. ad C. SENNAC non habet. ALBINVS lunatas vocat p. 306. Ad haec per priorem & C.

23) ALBINVS p. 307. fere eodem modo, SENNAC. b. b. Nuper bifidum vidi, ut a lacerto Δ aliquo intervallo distaret, totus minor.

24) ALBINVS l. c. fere eodem modo. SENNAC hunc fasciculum non habet, inde ostium

venae Cavae fecit triangulare, quod quadrato propius est.

26) ALBINVS p. 304. Deinde in dextro latere & C.

27) SENNAC. d. d.

28) ALBIN. p. 308. COWPER ad N. finistrum superius.

29) SENNAC supra W.

30) Caput quartum ALBINI p. 299. Fibrae supra V. SENNAC l. c.

d e f g h m n Crus diaphragmatis dextrum totum.

d Appendix lateralis extrema ³¹⁾, orta a corpore vertebrae primae lumborum, lateraliter, proxime supra cartilagine, quae sub ea vertebra est.

e Appendicis secundae pars extrema, quae, cum appendice proxima *f*, facit tendinem validum *g*,

f Altera portio appendicis secundae, quae cum priori descendit in corpus vertebrae tertiae ³²⁾, lateraliter, & inferius.

g Tendo communis duarum carniū *e*, & *f*.

h Appendix intima ³³⁾, quae partim conjuncta cum carne *g*, constituit tendinem *m*, ³⁴⁾, qui inseritur secundae vertebrae in medio, supra cartilagine, qua a tertia distinguitur; partim efficit tendineam columnam *k*, ³⁵⁾, quae denuo, interius quidem cum socia finistri lateris *l*, conjungitur in tendinem *i*, ³⁶⁾, insertum imo & medio corpori vertebrae tertiae; exterius vero in hanc insertionem, & terminum tendinis *g*, ³⁷⁾ inseritur in vertebra tertia ad *n*.

o Appendix intima, quae respondet carni *h*, & partim cum ea inseritur in secundae vertebrae lumborum medio corpore anterieus ad *n*, ³⁹⁾, partim in ima vertebra tertia lumborum finitur juxta *i* in *s*.

p Appendix media ⁴⁰⁾ quae aucta accessoria parte a fasciculo *o* inseritur cum ea in *s*.

q Appendix extrema ⁴¹⁾, quae respondet *d* lateris dextri, sed

31) Caput tertium ALBINI p. 299. Fibrae supra V. SENNAC. p. 168. In alio cadavere provenit & ab hoc corpore vertebrae, & a cartilagine, quae sub ea est. In alio, se habuit, ut in icone.

32) Appendicem secundam vidi etiam bis oriri a vertebrae secundae corpore. In aliis duobus cadaveribus, cum duae tantum appendices essent, loco *e. f.* & *h.* unica, bifida, caro fuit, & ab infima secunda vertebra provenit, alteroque fasciculo a tertia.

33) Caput primum ALBINI p. 296. quod in latere dextro oriri dicit a tertia vertebra. Alias vidi a secunda, & tertia, provenisse, alias a corporibus vertebrarum quintae, quartae, tertiae & secundae: in sinistro vero latere a tertia & secunda.

34) *m.* & *n.* videntur esse D. COWPER T. XXXV.

35) Caput secundum ALBINI p. 298. Con-

Fasc. I.

venit certe tendo longissimus & vertebrae numerus.

36) Similis est columna S. apud SENNAC.

37) *g.* & *s.* exprimunt tendines R. R. apud SENNAC.

38) Plerumque brevius & minus dextro ALBINI p. 296. Confer iconem nostram veterem.

39) Caput primum ALBINI, eodem fere modo p. 297.

40) Caput secundum ALBINI. In alio cadavere, cum duae tantum essent appendices, loco carniū *o.* & *p.*, unica fuit, in secunda vertebra orta, adeoque brevior, quam dextra appendix.

41) Caput tertium ALBINI. Caeterum haec concinna tendinum inferiorum fabrica non perpetua est, & qualis hic pingitur raro habetur, cum plerumque seorsim appendices descendant. In alio cadavere a cartilagine provenit, quae inter secundam & tertiam vertebra est.

sed secundae vertebrae inferitur, sub cartilagine, quae inter eam & primam media est.

r Caro a ligamento R, respondens *rw* *b*.

s Caro a ligamento S respondens carni *c*.

t u w x Decussatio, ⁴²⁾ appendicum intimarum sub Oesophago.

t Crus finistrum idemque superius, quod dextrorsum descendit.

u Crus secundum, dextrum, quod finistrorsum & deorsum abit.

w Crus tertium, majus, a sinistris dextrorsum.

x x Crus quartum, majus, a dextris finistrorsum. Idem posterius est.

y Columna Oesophagi dextra.

z ————— finistra.

a β Decussatio columnarum supra Oesophagum.

α Columna dextra anterior. ⁴³⁾

β ————— finistra & posterior. ⁴⁴⁾


γ Sedes in vertebrae, in qua, in priori cadavere, ab appendice finistra, trans vertebrae; caro communicans descendit trans cartilaginem, quae inter primam & secundam vertebrae media est.

⁴²⁾ Unicam describit cum Veteribus ALBINUS p. 307. & pingit COWPER T. XXXIV. Sed duas habet CL. SEGNER l. c. & plures etiam SENNAC l. c.

⁴³⁾ SENNAC. ad N.

⁴⁴⁾ Hanc vidi fibras tendineas divisisse, ut aliae supra fasciculum Y antrorsum in fibrarum sternalium occursum pergerent, aliae sub eo se dispergerent radiatae.







D. I O H. I A C O B I H U B E R I
Medullae Spinalis ¹⁾ Iconum, ex Infantibus trium
circiter annorum ad vivum delineatarum,
iterata Explanatio.

Ne petito Typographi nostri, atque institu-
to, praecipuarum H. C. partium Icones
aliquas, ad vivum diligentissime delineatas, col-
ligendi, deessent; has quoque, ad illustrationem
eorum, quae in Programmate *de Medulla Spinali*,
atque in commentatione *de Nervis a Spin. Med.*
provenientibus dixi, factas, heic cum ampliori
paulo, quantum spacium angustum patitur, ex-
planatione iterum exhibere volo; Ut quasi in
compendio ejus partis historia breuiter exhi-
beatur.

ICON

¹⁾ Cum neque BIDLOI neque RIDLEYI
Icones, ut minus clare minusque exacte rem
exprimentes, neque Icon EVSTACHII, VE-
SALIANAE opposita, neque VIEVSSENI,
longe quamvis caeteras superantes, minus ad-
huc aliorum Anatomicorum figurae, ex bru-
tis plerumque desumptae, satis omnino mihi
facerent; eo facilius speravi, exercitiores A-

natomicos accuratiores picturas desideraturos
esse. Quod, quantum porui, hic praestare
studui. Plures primo ex diuersarum aetatum
Cadaveribus Icones ad vivum omnes delineari
curavi, ac subinde penicillo manum admoui,
&, correctiores tandem, ut aeri inciderentur,
operam dedi.

ICON PRIMA Medullam Spinalem vel potius Durae Matris productionem, spinalem medullam ejusque nervos investientem, repraesentat; prout se in situ naturali, una cum Nervis Vertebralibus omnibus, eorum directione, situ, & magnitudine naturali in specu vertebrarum habet. Omnia a facie postica spectata. ²⁾

A Vertebrae primae colli pars antica, paulum oblique sursum elevata.

a a Ejus sinus articularii.

b b - - processus transversi cum foraminibus suis.

B B Involucrum medullae spinalis, a dura matre productum, ab occipitis osse ad medium usque os sacrum continuatum, saccum fere repraesentans. ³⁾

C - C Cavitas seu interstitium, inter durae matris thecam osseam intercedens, nigro colore distinctum, quo optime conspici possit, quam viam secundum diversas directiones nervus quisque in cavo eo ⁴⁾ faciat; quorum ganglia intra specum vertebrarum generentur, quorum non; & quo modo Nervi ex ordine ad certas ac diversas distantias foramina sua subeant. ⁵⁾

D Ligamentum ex infimo durae matris sacco secedens, & recta inter infimos nervos ad os coccygis, cui infigitur, descendens. Hoc Veteres pro nervo impari habuerunt. ⁶⁾

E Den-

²⁾ Ob summam difficultatem, simulque ad evitandam omnem obscuritatem, ipsas simul vertebrae exprimi nolui, earum tamen loco inania spatia, magnitudini vertebrarum exacte respondentia, relicta sunt.

³⁾ Involucrum hocce non convenire cum capacitate thecae osseae, nec cum ipsius Medullae Spinalis figura, & quantum ab utroque recedat, ex specu vertebrarum C. C. ejusdem Ic. atque ex Ic. II. medullam repraesentante, facile intelligitur. Musculosae hujus involucri fibrae, quarum *VIEVSS. Neurogr. p. 140.* mentionem facit, non distincte conspiciuntur, utcunque tamen interna facies, alba, elotas columnas carneas, in suprema maxime & infima sui parte refert natura.

⁴⁾ Nervus secundi paris. & insequentes ad 13. usque par, sursum paulo vergunt. Altiores plus, inferiores minus. Dein nervi 14. 15. 16. paris recta exeunt. Insequentes dein omnes, quo inferiores sunt, eo plus deorsum vergunt.

⁵⁾ Ita plerumque ganglia 27. paris intra specum osseam conspici inspiciunt, cum superiorum aliquot in foraminibus, a vertebrae relictis, lateant; ibique quasi in trochlea arcuata jaceant.

⁶⁾ Cum foramen nullum subeat, & ganglio careat, facile a nervis vicinis distinguitur. In se enim recipit loco filamentum nervei, a cauda equina producti, ultimam piaae matris productionem Ic. II. e. e. per mediam caudam equinam excurrentem.

- E Dentis secundae vertebrae supereminens mucro.
- F Medulla spinalis ad ortum abscissa. ⁷⁾
- I ad 30. usque. Nervi Spinales omnes sinistri lateris, una cum gangliis suis.
- 1C ad 8C Octo nervi Cervicis lateris dextri.
- 1D ad 12D Duodecim nervi Dorfi.
- 1L ad 5L Quinque nervi Lumborum.
- 1S ad 5S Quinque nervi ossis Sacri.
- c - c Gangliorum triginta paria ⁸⁾, pro diversa regione diversa; sibi ex utroque latere exacte respondentia; quamvis in dextro tantum latere litteras iis apponere commodum fuerit.
- d Nervi primi ⁹⁾ paris ramus, antico vix minor, in sinulo suo circa sinum articulatorium circumflexus, & antrorsum vergens.
- e Ejus ramus alter, postice versus Cervicem abiens. ¹⁰⁾
- f Nervi secundi paris ramus major, qui postice fertur, & minor.
- g Antrorsum vergens.
- h Ramus ganglii tertii paris major, qui antrorsum ad collum fertur:

i Mi-

7) Cum ibi medulla iam extra caluariam posita sit, nomen quoque spinalis medullae accipere debet, prout veteres Anatomici omnes fatentur, & ipse quoque MORGAGNIUS *Advers. Anat. VI. anim. 32.* quamvis nervum infra hunc locum egredientem, decimum nempe WILLISII, nervis cerebri jungat. (Hic in transitu errorem typographicum, in Commentatione n. de nervis med. spinal. commissum, & sensum turbantem, corrigi peto, ubi, pag. 9. ultima linea textus loco *comnumeravit* legendum est *non comnumeravit*.)

8) Primum par nervorum jam in hac aetate suum semper hic conspicuum efficit ganglion, quanquam in junioribus interdum illud minus evidens reperiatur. Non semel tamen in nato illud distinctum quoque vidi: ut ita vix unquam deficiat. Caeterum constantissima & perpetua naturae lege nervus iste per sinum, a prima vertebra basique ossis occipitis relictum, atque exsculptum, viam sibi facit.

9) Novem tantum nervorum paria cerebro tribui possunt ac debent. Quemadmodum de-

Fasc. I.

cimum par WILLISII, circa quod hic versamur, duplici suo principio, ortu, egressu extra thecam osseam, atque demum ganglio sub ab omnibus nervis Cerebri diversum est, Spinalibus contra nervis quoad omnia accedit. Hinc omni quoque jure illud cum toto Anatomicorum veterum, ad WILLISIVM usque, choro Cervicalium nervorum primum par vocari debet.

10) Nunquam distincte videre potui tertium, ex hocce ganglio secedentem, ramulum; prout talem, cum vasis vertebralibus per collum descendentem, aperte describit WINSLOWIUS *Trait. des Nerfs 159.* & obscure paulum de eo loquitur LANCIUS *de mot. Cord. & Aneurism. p. 75. edit. Rom.* Semel tantum tenuissimum filum, ibi se demergens, obscure videre mihi visus sum, nec tamen ultra ganglion secundi paris prosequi datum fuit. An vero propago ipsius nervi 1. paris fuerit, non facile dixerim. Posthaec enim, exactissime & accuratissime in id filum inquirens, id perspicere nunquam potui.

D



- i Minor versus spinam vergens. ¹¹⁾
- k - k Filamenta s. ligamenta quatuor, ex infimo durae matris apice, duo utrinque, secedentia, & ossibus vicinis infixa. ¹²⁾
- l l l Foramina in ipsis gangliis, vel intra ea, pro transitu vaporum intra thecam osseam, frequenter in his locis conspicua.

ICON SECUNDA a facie quoque averſa, uti prior, ſpectata, Medullae Oblongatae partem, in infima baſi cranii poſitam, refert, omnemque ex ea productam Medullam Spinalem, in ſitu & connexione naturali intra thecam vertebrarum, quae tamen conſpici nequit, ſitam, & ab omni involucro, excepta pia matre, denudatam exhibet. Ubi notandum, quod offis occipitis pars poſtica, aduſque arteriae vertebralis comiſtiſque nervi tranſitum, uti & vertebrarum pars poſtica, ablata ſit; pars autem anterior offis occipitis & offis petroſi portio, paulum elevata & retrorſum inclinata, ſpectetur. Lobi Cerebelli vero cum verme antrorſum inclinati ſunt, quo commodius Ventrículus quartus, partesque ei vicinae, conſpici ac indicari poſſint.

A A Spacium, quod lobi Cerebelli reclinati, una cum proceſſu eorum vermiformi

B ruditer adumbrato, occupant

C C C C Portiones offis petroſi & offis occipitis, dura matre inveſtitae

D D

¹¹⁾ Et ſic inſequentes nervi omnes trunco ſuo antrorſum vergunt; exiliorem multo, & perpetuum ramulum ſpinam verſus dimittunt, ultimo tantum vel & penultimo Sacralium nervorum excepto.

¹²⁾ Praeter haec quatuor, & alia plerumque

exilia filamenta ibi occurrunt; non tamen cum VIEUSSENIO *l.c. Tab. XX. fig. 1. B. B.* nervis annumeranda ſunt craſſiora iſta filamenta, gangliorum defectu, planitie ſua, brevitate, ac inſertionis modo facillime a nevis diſtinguenda.

- D D** Medullae oblongatae pars, ex qua dein Medulla spinalis continua serie descendit.
- a a** Striae albae medullares ex ipso ventriculi quarti fulco surgentes, & ad nervum septimi paris mollem vtrunque abeuntes.
- b b** Ventriculus quartus.
- c c** Ejus sulcus longitudinalis continuatus cum rima calami scriptorii. ¹³⁾
- E E** Medulla spinalis. ¹⁴⁾
- d** Ejus duae Eminentiae, fere orbiculares, in quas definit infimus medullae apex, quae totae laeves sunt, nulla filamenta nervea demittentes ¹⁵⁾
- e - e** Ligamentum, ex infimo piaae matris apice cum vasis sanguiferis, hic non expressis, productum, per mediam caudam equinam excurrent, & per infimum durae matris apicem elabens, sicque nervum imparem mentiens, tandem vero in osse coccygis dispersum desinens; aciculis sustentum, quo clarius conspici possit.
- f f** Ganglion vigesimi noni paris nervorum.
- g g** - - - - trigesimi paris, ex quo in sinistro latere praeter nervum ejusdem numeri alius insuper nervulus, propriam intumescentiam gangliiformem efficiens, exit, h. insignitus ¹⁶⁾
- F F** Medullae spinalis theca a dura matre producta hic per medium discissa, utrimque reclinata, & acicularum ope expansa.

G G

¹³⁾ Huncce sulcum semel tantum vidi, infra primum par nervorum Cervicalium (quod Xtum est WILLISII) usque descendere, integrum nempe & absque ulla vi factum. Tantam autem caveam, quantam MORGAGN. *Adu. Ann. VI. anim. 14.* describit, nunquam, caute quanquam inquirens saepius detegere potui.

¹⁴⁾ Ipsa Medullae spinalis substantia, ex cinericia atque corticali concreta, infimo suo apice, ex quo ligamentum exit, ordinario ad secundam usque vertebrae Lumbalium descendere solet, rarissime profundius, minus infrequenter tamen primam solummodo vertebrae L. attingit.

¹⁵⁾ Talem in modum semper fere Medullae apex terminari solet: rarius quoque unicam saltem Eminentiam talem ibi efficit: nunquam vero secundum mentem Anatomicorum in

Conum convergit simpliciter. Infimus ille apex laevis, & omnibus filamentis carens in adultis semipollicem longitudine sua aequat, totusque filamentis Caudae Equinae obiectus later in f. n.

¹⁶⁾ Tale ganglion cum nervo suo, ex praecedente nervo productum, hic exprimere volui, non quod huic nervorum pari proprium sit, sed ut naturam infimi nervi, utrimque e theca durae matris egressi, sive ille sit numero 28. sive 29. sive, quod rarius fit, 30. paris, aperirem; hunc interdum in modum aliud insuper nervorum par producentem. Interea hoc tum demum fieri plerumque observavi; quando natura 29. tantum foraminum paria in theca, a dura matre producta, efformavit; quo nervorum vertebraliu numerus ordinarius triginta parium tamen compleatur.

- G G Nervus septimi paris.
- H H - - octavi paris, in dextro latere duplex foramen in dura matre habens, in sinistro simplex. ¹⁷⁾
- I - I Nervus Accessorius a prima ejus inter sexti & septimi nervi ¹⁸⁾ postica filamenta origine, in sinistro latere distinctius expressa quam in dextro, adusque exitum per duram matrem. In sinistro latere peculiare durae matris foramen subit, in dextro communem cum inferioribus filamentis nervi octavi paris viam facit. Nervi hujus portiones, filamentis nerveis obtectae, punctis indigitatae sunt. E regione
- i - i Ejus radiculae, quarum quatuor sunt filamentosae, e medulla oblongata ortae, & sex simplicis originis, e medulla spinali exeuntes, partim distincte conspicuae, partim quoque, qua filamentis nerveis obtectae sunt, punctis indicatae. ¹⁹⁾
- k - k Filamenta nervea communicantia, ab unius nervi filamentorum infimo ad alterius supremum oblique trans-euntia; ubi notandum non sat bene expressa esse, cum singulorum altera portio cum superiori nervo excurrent non conspiciatur, sed tantum furculus communicans.
- K - K Nervus noni f. ultimi paris Cerebri, utrimque ex quatuor filamentis constans; quae in dextro latere concurrunt & commune durae matris foramen subeunt, in sinistro autem per duo distincta, nec arcte sibi apposita, foramina elabuntur. ²⁰⁾
- L Origo Ligamenti denticulati f. prima ejus ad duram matrem

¹⁷⁾ Non infrequens est, in uno vel altero latere, vel in utroque simul, superiorum nervi 8. P. filamentorum duo vel tria suum sibi facere in dura matre foramen, septulo distinctum a foramine reliquorum filamentorum; non raro quoque ab eodem latere N. Accessorius proprium habet foramen; ut saepius ibi tria distincta foramina reperiamus, pro transmittendo per d. m. nervo 8. P. atque N. Accessorio, quam unicum tantum.

¹⁸⁾ Quando profundissime oritur, ita se habet. Non raro quoque e supremo quasi filamentum 6. vel 5. P. rarius quoque ad 4. P. oritur inter filamenta semper postica nervorum atque ligamentum denticularum.

¹⁹⁾ Harum radicularum modo plures modo pauciores reperiuntur, constantissime tamen quaedam, nervorum principis posticis obtectae, simplicis originis e med. spin. proveniunt; & aliae, constantissimae ipsae quoque, filamentosae plerumque originis, a medulla oblongata accedunt. Omnes ad augendum N. Accessorium factae.

²⁰⁾ Fere ab uno vel etiam ab utroque latere nervus 9. P. duo distincta in dura matre facit foramina; ita quoque apud VIEUSSENIUM l. c. Tab. XVII. γ. γ. z. z. in utroque latere duo foramina perfodiens exhibetur, male autem ibidem pro duobus distinctis Nervis 9. sc. & 10. Paris W. traditus est.

trem adhaesio ²¹⁾, ex qua deinde dentes omnes ex ordine conspiciuntur l-l ad interstitia nervorum durae matri inserti ²²⁾, ab uno tantum latere repraesentata.

- M M Corpora pyramidalia postica }
 N N - - - - - olivaria postica } utcunque expressa.
- O O Arteriae Vertebrales e foraminibus suis cum nervo i P (iC) exeuntes.
- m - m Filamenta nervea ab antica medullae facie accedentia & cum posticis foramina durae matris fubeuntia, hinc inde conspicienda, ex parte tantum indicata. ²³⁾
- n Locus ubi filamenta nervea concurrere incipiunt, & caudae equinae basis constituitur. Ibi reliqua medullae portio in situ naturali conspici desinit.
- o Locus, ubi definunt filamenta nervea oriri.
- p - p Filamentorum, caudam equinam constituentium, exortus ²⁴⁾ e medulla spinali. Haec filamenta utrimque paulum reclinata sunt, quo medullae in medio latentis natura & forma detegatur.
- q q q Cauda equina.
- i Ad usque 30 triginta nervorum vertebraliū origines posticae, earumque exitus e dura matre.
- iC ad 8C Filamenta nervea octo nervorum Ceruicis. Observa, duo filamenta nervi primi paris in latere dextro nervo Accessorio immisceri, a quo demum, paulo superius tamen,

²¹⁾ Facta hac prima ad duram matrem insertione in medio spacio, nervo 9. P. Cer. atque 1. Cervic. intercepto, tenuis inter arteriam vertebralem atque originem posticam nervi 1. P. Cervicis oblique introrsum descendit, reliquosque dentes ex ordine dimittit.

²²⁾ Horum dentium, per triangularia nervorum interstitia exeuntium, non semper sunt viginti duo, sed interdum pauciores sunt, prout medulla altius descendit, vel citius desinit Inferiores dentes longissimi sunt, superiores brevissimi. Hujus ligamenti ope nervorum spinalium omnium in utroque latere, non solum eorum, qui insertos inter duorum e dura matre exitum habent illius dentes, principia antica & postica seiunguntur a se invicem ac distin-

guuntur; cum illud ad apicem usque Medullae Spin. excurrat.

²³⁾ Similem fere in modum, uti postica filamenta, se habent antica; per omnem Medullae decursum: numero saltem atque crassitie conveniunt; sunt tamen haec filamentosae originis, vid. Ic. III. C. C. cum posticae simplicissimi sint ortus.

²⁴⁾ Quanquam Caudae equinae chordulae s. filamenta nervea mire implicata sint, & absque ordine progredi videantur; eorum tamen exortus e Med. Spin. exactissime respondet egressui. Altiores enim nervi etiam altioris originis filamenta accipiunt, & insequentes nervi omnes eodem ex ordine generantur; ut ita infimum filamentum nerveum, ultimo e medulla exiens, infimum quoque nervum producat.

tamen, filamentum, loco originis posticae primi paris, ad foramen arteriae vertebralis fertur. ²⁵⁾

1D ad 12D & 1L ad 5L item 1S ad 5S uti in priori Icone.

ICON TERTIA Medullae spinalis portionem e supremo dorso desumptam, & ab antica facie, corporibus vertebrarum respondente, spectatam offert.

- A Ligamentum a pia matre productum, & ad unam vel alteram lineam medullari substantiae inmissum.
- B B Intumescitiae utcunque vermem sericeum referentes. ²⁶⁾
- C C Nervorum filamenta s. origines anticae, filamentosae; ubi plures furculi tenues bina filamenta nervea pro quovis nervo constituunt. ²⁷⁾
- D Medulla per medium horizontaliter discissa, ubi portio medullaris s. alba E in ambitu posita conspicitur, & cinereae figura & magnitudo in centro F exhibetur. ²⁸⁾


²⁵⁾ Multum varietatis hic loci occurrit, si caute & frequenter in diversis Cadaveribus humanis inquiratur. Ad concursum s. commisionem principiorum posticorum Nervi r. P. Cervicis cum Nervo Accessorio, non infrequenter ganglion interdum generatur, interdum non, ex qua demum commissione filamentum unum vel duo secedunt, cum principio antico N. r. P. Cervicis, in foramine arteriae vertebralis concurrentia: truncus autem Nervi Accessorii nomine exinde sursum vergit, nec semper e regione commissionis exit origo postica, sed interdum, rarius tamen, paulo superius exit. vid. latus dextrum. Ordinario tamen origo postica N. r. P. Cerv., duobus vel




tribus filamentis constans, pone Nervum Accessorium absque ulla commissione incedit, uti in latere sinistro expressum est. Interdum quoque lenissime ibi, non turbata eorum natura, sibi invicem adhaerent.

²⁶⁾ Ab hac saltem parte, nec nisi in summo ac medio dorso frequentes sunt.

²⁷⁾ Hunc in morem omnia principia antica e medulla prodeunt, cum e contra a postica facie unumquodque filamentum simplici principio gaudeat.

²⁸⁾ Ibi praeterea conspici potest, nullum filum s. ligamentulum piae matris, a postica facie medullae inmissum, vti Anatomici volunt, adesse.





D. IOH. IACOBI HUBER

Uteri muliebris partiumque ad eum facientium praecipuarum
ITERATA EXPLANATIO.

Eadem ratio, quam *Medullae Spinalis* iteratae explanationi adjeci, me excitat, novam harum quoque partium, notulis illustratam explicationem hic sistere. Partes equidem, hac tabula expressas, non pertractavi omnes in Commentatione mea *de Vaginae uteri structura rugosa nec non de hymene*, nupero vere typis mandata. Ut tamen feminarum partes praecipuae, generationi dicatae, uno intuitu Anatomicorum oculis hic exhiberentur, fideles maxime earum, & ad vivum curiose delineatarum figurae, nec non rugarum cervicis uteri exactior, quae hactenus desiderabatur ab Anatomicis, repraesentatio, hac occasione elaborata, me impulerunt. Prae reliquis partibus imprimis sollicitus fui, veram vaginae rugosae ¹⁾, Hymenis ²⁾, Caruncularumque myrti-

1) Probe hic tenendum est, rugas vaginae non ita vage ac inordinate dispersas esse, ac vulgo putatur, Iconibusque eae exprimuntur. Anteriores enim suis quatuor columnis constant, e quibus laterales rugae secedunt; praeterquam quod in interiori vagina rugae disponantur, in orbem excurrentes, leves, segmentaque circuli efficientes, quas dein breves lamellae, transversim interpositae, interfecant. Cum enim anteriores rugae ad quatuor diversas regiones emineant ultra vicinas; ideoque partes eas eminentes non male vocari posse Columnas putavi: Quarum alias eminentiores, superiorem scilicet atque inferiorem, *carneo-papillares* vocavi, quia hae papillis gaudent, iis, quae sensui dicatae sunt haud dissimilibus; laterales vero ob elegantem contextum *reticulares* dixi. Quantumvis plures essent rugarum vaginae icones, nullibi tamen archetypum vere

expressum reperi; ne quidem exceptis *de GRAAFII* atque *BIDLOI* elegantissimis Imaginibus, *MORGAGNI*ve Icone.

2) Virginibus intactis rarissime deficit hymen; qui pro diversa aetate ratione figurae varius reperitur. In junioribus enim, infra pubertatis annos constitutis, plerumque rotundum observavi, contra quam *RUYSCHIIUS Catalog. rarior* p. 20. & *BASSIUS Observ. 3. Decad. 2.* putant; Puberibus autem falcatus plerumque est, seu crescentis lunae figuram referens. Hymenem quamvis aliquoties columnae ope sustentum, aditum ad vaginam in duo segmenta dividendum, viderim, eam nihilominus conformationem, quae operationem chirurgicam plerumque requirit, ad vitiatam ac praeternaturalem conformationem referre malo. Omnes hae diversae tres figurae hic sistuntur.



myrtiformium ³⁾ tradere structuram, variantem valdopere, pro diversaque aetate variam. Ad comparandam dein intactae Virginis vaginae cum adultioris Feminae, virum passae, structuram, utraque hic sistitur.

FIGURA I.

Uterum ostendit muliebrem feminae LX. circiter annorum, nupera hyeme cultro anatomico subjectae. Mater fuerat filii unici spurii, ante triginta annos nati. Non tamen ab eo tempore castam, sed vere dissolutam vitam vixerat. Interim tamen elegantissime rugosam inveni vaginam uteri, nec tantopere, ac vulgo putatur, differentem, quoad partes praecipuas, a structura virginum; ut ex comparatione hujus figurae Primae cum Quinta magis elucet. Vagina atque uterus a parte postica, intestino Recto respondente, per longum resecta sunt. Caeterum partes ad uterum facientes, prout se habuerunt, exhibet curate expressas, ex parte morbosas, ex parte naturali modo constructas.

A A Labia pudendi.

B B Nymphae in hoc cadavere praeter morem magnae a clytoride ad infimam usque rimae magnae partem descendentes.

C Clitoris.

D Ejus Praeputium.

E Orificium urethrae, quod ambit corpus glandosum, paulum eminens.

F F Ventriculi duo in vestibulo vaginae conspicui. ⁴⁾

G G G Vagina a facie postica dissecta, atque explanata, in ante-

³⁾ Aut hymen adest in ostio vaginae, aut adsunt carunculae; Sunt vero carunculae dilacerati hymenis reliquiae. Reperiuntur tamen non raro Carunculae quaedam pisiformes, integro adhuc hymene, ad columnarum vaginae rugosae radices pone hymenem locatae; quae cum dilacerato hymeni suam originem non debeant, non confundendae sunt cum carunculis myrtiformibus, proprie sic dictis. Caeterum caruncularum myrtiformium quatuor ordinario reperiuntur in mulieribus, virum passis, vaginae os, cum hymenis locum occupant, occludentes quasi. Modo vero una vel & altera earum deficit; modo fissi est superior vel lateraliū alterutra, & duplex apparet, unde numerus quaternalis auctus videtur. Rarius

earum loco rugae tantum adsunt. Non nocebit, hic semel adhuc distinguere tubercula haecce atque inaequalitates, in diversis Cadaveribus diverse occurrentes; & quidem 1mo in Carunculas carneopapillares pisiformes, quae una cum hymene subsistunt; 2do in corpuscula myrtiformia, proprie sic dicta, 3tio in simplices ostii vaginae rugas. Qui vero plura quam hic tradi possunt, de his atque aliis in hac Tabula expressis, scire cupit, adeat ipsam Commentationem.

⁴⁾ Cum perpetuo adsint hae leves depressiones, plica circumdatae, & lacunas comprehendant, iis ad comparationem cum MORGAGNI ventriculis laryngis proprium quoque nomen dedi.

- anteriori parte tota rugosa, in profundiori penitus laevi. ⁵⁾
- H H Rugarum crassa Columna, carneo papillosa superior valde eminens; cujus rugae anteriores crenulatae magis sunt ⁶⁾, atque eminentes; interiores papillofae ac exiliores.
- I I Columna carneo papillosa posterior per medium rescissa, brevior superiore minusque eminens.
- K K Rugae exiliores binis columnis H & I interceptae, crenulatae quoque; non tamen ut in virginibus reticulatae.
- L L Uteri sectio longitudinalis.
- M Uteri cavitas. Cervix ejus tota laevis erat, neque rugis ullis neque hydatidibus praedita.
- N Leve molae seu sarcomatis rudimentum, in media fere uteri cavitate lateris sinistri locatum, rubentem carnem referens.
- O Similis fere caro, os uteri, cum adhuc integrum esset penitus occludens. ⁷⁾
- P P Sectio oris uteri, utrimque paulum reclinati.
- Q Oris uteri pars suprema, integra adhuc.
- R Hydatides magnae, aliae in unum corpus conglomeratae, circa os uteri dispositae; alia hydatis magna, in ipso oris foramine carni O adjacens.
- S S Ligamenti uteri lata.
- T T Ureteres ante ligamenta (in situ naturali) ad vesicam incedentes. ⁸⁾
- V V Ligamenta uteri teretia.
- W W Ovaria duo; quorum dextrum hydropicum erat, finistrum maxime naturali modo se habebat; bina in situ suo

⁵⁾ Rugae in orbem excurrentes, leviores reliquis, hic penitus jam oblitteratae sunt coitu frequenti. Hae primae destruuntur, dein columnae reticulatae, tandemque, vix tamen penitus, crassae illae columnae carneopapillofae.

⁶⁾ In universum ita crenulatae fiunt per aetatem rugae omnes anteriores, uti exhibentur hac figura; In junioribus non ita se habent.

⁷⁾ Simile fere sarcomatis rudimentum vidit KERKRINGIUS *observ. anat.* LIII. instar dactyli orificio uteri adhaerens.

⁸⁾ Sunt hic aequalis diametri depicti, cum sint inanes; quando autem flatu distenduntur, diversae, & pluries in decursu variantis diametri ordinario reperiuntur.

- fuo naturali, scilicet ante tubas locata. Dextrum resecuti, partemque resectam w reclinavi, ut corpuscula, interiori ovarii faciei adhaerentia conspicerentur, prout se exhibebant, exilia, plurima, potius hydatides exiles, quam ovula referentia.
- X X Ligamentorum latorum portiones crassiores, quam reliquum ligamentum, ovaria fulcientes, a Veteribus oviductus falso appellatae.
- Y Y Tubae Fallopianae; 9) aere, per amplam satis aperturam z. z. immisso, perque orificia in cavum uteri facile rursus exeunte; distentae.
- Z Z Tubarum fimbriae, amplae satis ac multiplices, quae in medio orificium habent z. z. mediocrem tubulum admittens. 10)
- a a Lacunae in ventriculis vestibuli. 11)
- b b Lacunae in utroque latere duae, ad Prostatas BARTHOLINI ducentes.
- c c Carunculae myrtiformes laterales, in latere sinistro duplices in dextro crenulatae.
- d d Caruncula myrtiformis suprema, in duas quoque fissa.
- e e Caruncula myrtif. infima per medium discissa.
- f f Sectio vaginae & labiorum.
- g Lacuna ampla valde, in ipso corpore urethrae glandoso.
- h h Lacunae aliae plures in ipsa vaginae cavitate.
- i Striae carneae, prout in hoc cadavere se exhibebant in vestibulo 12) vaginae.
- k k Basis corporis glandosi, urethrae orificium ambientis, fulcata, in duas portiones inaequales desinens. 13)

FIGU-

9) Eas in situ naturali reliquimus, nisi quod sinistra paulum elevata sit, quo melius conspiciatur. Nunquam equidem Tubas hasce contortas circa ovaria vidi in statu naturali; prout innuit MORGAGNIUS *Adv. Anat. I. Tab. III. p. 65 Q in explicatione*. Potius enim ante ovaria incedunt extrorsum, fimbriis exteriori ovarii parti applicatis. Caeterum quoad figuram semper ita tortuosae, decrecendo sensim versus uterum, modo constrictae paulum, modo rursus ampliatae observantur.

10) Nulla aetate, omnibus sc. bene se habentibus, tubuli ope aer hic immissus, non penetrat in uteri cavum usque.

11) Ex hisce Lacunis, uti ex iis quoque quae litt. b. & g. indicatae sunt, humor inungens, fuscus exprimi potest, qui ad defendendas partes vicinas excernitur.

12) Quid vestibulum sit dicetur in explicatione fig. IV. litt. H.

13) Haecce corporis glandosi pars non semper bifurcata reperitur, pluries quoque simplicem observavi; semper tamen, uti integrum corpus glandosum, eminet extra orificium urethrae. EUSTACHIUS simplex expressit Tab. XIV. fig. 3. Ne confundatur cum carunculis myrtiformibus, prout haud pauci Scriptores fecerunt, attendendum est.

FIGURA II.

Ostendit iterum corpuscula ea ovarii dextri Fig. I^{ae}, per lentem considerata, acinos referentia. Non ovula sed potius hydatides esse videntur.

FIGURA III.

Hymenem refert rotundum puellae aliquot hebdomadam natae.

- A A Labia pudendi, distenta acicularum ope.
- B Clitoris.
- a Orificium urethrae.
- b b Duo ventriculi vestibuli.
- c Hymen rotundus, os vaginae circum circa ambiens.
- d d Sinuli hymenis, ad concursum laminae hymenis superioris cum inferiori producti. ¹⁴⁾
- e Cavitas vaginae, tota rugosa.

FIGURA IV.

Externas quoque pudendi partes puellae XIV. annorum repraesentat.

- A A Labia pudendi.
- B B Nymphae, ordinario modo constitutae. ¹⁵⁾
- C Clitoris.
- D Ejus praeputium.
- E Hymen elegans, falcatus.
- F Concurfus marginis eminentis carnei d d.
- G Fossa navicularis.
- H Aditus ad vaginam, hymenis limbo atque urethrae orificio interceptus. Reliquum spatium, clytoride, nymphis, ipsoque hoc aditu interceptum, est Vestibulum vaginae. ¹⁶⁾

I Pe-

¹⁴⁾ Ex hac forte consideratione quidam Veterum hymenem reticulatum vocarunt.

¹⁵⁾ Hic optime patet, id quod perpetuum est, quo modo nymphae vel exeant ex clitoride vel saltem cum ea continuae sint. Unde haud male crura clitoridis vocari possunt.

¹⁶⁾ Semper enim ibi tale interstitium relinquitur ante vaginae aditum, quod in Virginibus distinctum ac limitatum magis quam in adultis, quibus haec omnia in unum os amplum degenerant, observatur. In vestibulo illo siti sunt duo ventriculi, urethrae exitus, ipsaeque lacunae.



- I Perinaeum.
 K Anus.
 a b c Sunt partes in vestibulo locatae.
 a Orificium urethrae.
 b b Duo Ventriculi.
 c Duo orificia f. Lacunae, in summo vestibulo sitae.
 d d Margines eminentes carnei arctioris rimae.

TABULA V.

Exhibet Vaginam uteri cum partibus externis ejusdem puellae Tab. IV. Vagina atque hymen a latere sinistro per longum ad os uteri usque dissecta sunt.

- A B C D Uti prius.
 E Columna carneopapillosa superior, quo modo in media fere vagina e duobus cornubus producitur, & ante hymenem rursus in duo cornua desinit divergentia.
 F Columna carneopapillosa inferior, simplicior longe atque brevior.
 G G Columnae laterales seu reticulatae ¹⁷⁾; quarum dextra integra est, sinistra autem discissa. His quatuor columnis aliae plures rugae intercipiuntur, nullis litteris indicatae.
 H H Rugae simplices, in orbem quidem excurrentes, sed nonnisi segmenta circuli facientes ¹⁸⁾
 I I Exilis pars vaginae laevis, omnibus rugis carens.
 K Os uteri. ¹⁹⁾
 L Rima ejus transversa, quae crenulata magis erat sua natura, quam hic cernitur.
 M Planum oris uteri inferius.
 N - - - Superius. NB. Haec figura non bene exprimit planum

¹⁷⁾ Has reticulatas columnas raphas seu futuras appellat WINSLOW *Expos. Anat. du Bas ventre* N. 650. Cur autem GARENGEOTUS *Splanchn. p. 318.* eas ligamentosum interstitium dicat non video; cum hae ipsae rugae reliquarum in morem crenulatae reddantur per aetatem, uti patet consideranti fig. la. K. K.

¹⁸⁾ Hae alias exiliores, expressas quoque, in interstitiis habent, quarum nexu coniunguntur oblique inter se.

¹⁹⁾ De hoc notandum, non rotundum esse, sed duplici plano constare; quae duo plana in continuam, eminentem tamen, carnem ovalem desinunt, & applanantur anterieus ea parte, qua rimam relinquunt transversam, ampliorem longe, quam ipse sit ad uteri cavum aditus; planum superius eminet paulum extra inferius, utraque autem crenulatos margines habent. Constanter ita crenulatos observavi margines illos in virginibus, & quidem in junioribus elegantem in modum, & attenuatos quoque.

planum superius, ultra inferius eminens, quod tamen esse deberet.

- a Orificium urethrae.
- b b Ventriculi duo Vestibuli.
- d Lacunae duae ad Prostatas Bartholini ducentes.
- e Plicae f. Lamellae tenues. ²⁰⁾
- f Caruncula carneopapillosa, pisiformis. ²¹⁾
- g g Hymen, in duas partes dissectus.
- h Lamina f. plica magna pone urethrae orificium. ²²⁾
- i Exilis caruncula carneopapillosa in quam abiit in hoc corpore columna reticulata.
- k Acicula, qua vaginae os ita distentum servabatur.

FIGURA VI.

Hymenem monstrat praeternaturalem, ²³⁾ columna carnea praeditum, aditum ad vaginam in duo segmenta inaequalia dividente. E puella VII. annorum.

E Hymen.

c Hymenis columna.

Reliqua sunt eadem cum fig. V.

FIGURA VII.

Uterum ostendit ab omnibus partibus liberum atque resectum, & facta sectione in latere sinistro apertum, atque distentum in gratiam rugarum Cervicis. Desumptus est e muliere XL. annorum. ²⁴⁾

A A

²⁰⁾ Hae ipse quoque lamellae per usum harum partium ampliores fiunt, tandemque crenulatae.

²¹⁾ Haec atque altera, litt. i. designata caruncula non constanter adsunt; & tum quidem in diversis cadaveribus diverso modo se habent; interdum enim infima hymenem suffulcit, ferreque triangularem reddit; interdum quoque suprema longius se porrigit, quam ordinario fieri solet, & cum infima penitus in unam concrevit columnulam; uti observare licet in fig. VI. litt. c. plerumque tamen liberae manent dictae carunculae, nec quid cum hymene habent commune.

²²⁾ Interdum singularis plica est, interdum in unam membranam concrevit cum hymene, proprie sic dicto, eumque rotundum efficit,

Fasc. I.

prout figura III. exhibetur: interdum penitus deficit haecce lamina.

²³⁾ Exempla sat multorum Observatorum docent, tali in casu operationem chirurgicam praecedere debere coitum, debite celebrandum: Quapropter etiam talem conformationem ad praeternaturalem ablegare malui, quam cum MORGAGNIO *Advers. An. I. §. 29.* atque BASSIO *Obs. III. Dec. II. §. 10.* qui posterior ita constitutos hymenes recens natis semper tribuit, eam structuram naturalem agnoscere.

²⁴⁾ Ut tamen verum fatear, minus ex voto successit aeris incisio, quam quidem ex elegantiori delineatione ROLLINI nostri sperare licebat. Hic enim non satis expressae, atque distinctae sunt rugarum columnae b. & c. nec satis conspicitur, quo modo laterales rugae, penatim dispositae, exeant e columnis.

G

- A A Cavitatis triangularis uteri.
- B Oris ejus planum superius, crassum valde, ac longe ultra inferius eminens, plurimis lacunis, glutinosum humorem excernentibus, praeditum.
- C Oris uteri planum inferius.
- D Rimae oris uteri, ad cavitatem uteri ducentis, latus dextrum.
- E E Cervix totus rugosus, rugis variis constans, quae omnes pennatae quasi, e duabus columnis eminentibus ac crassis, rugosis quoque, secedunt oblique.
- F Setae duae, foraminibus Tubarum Fallopii inmissae.
- a a a Hydatides aliquot, a NABOTHIO ovula dictae.
- b Rugarum Columna superior.
- c - - - inferior.
- d Lacunae aliquot in cavitate uteri.



Fig. VII.




Fig. II.



Fig. I.



Fig. V.




Fig. III.





Fig. IV.



Fig. VI.



D. ALBERTUS HALLER

ANAT. P. P. O.

ANATOMEN PUBLICAM

F E M I N A E

SUSPENSÆ INDICIT

OMNESQUE CURIOSOS AD VISCERUM DEMONSTRATIONEM

INVITAT

ET

O M E N T I

NOVAM ICONEM TRADIT.

AD DIEM X. MART. MDCCXXXII.

D. ALBERTUS HALLER

MDCCCLXXV

ANATOMEN PUBLICAM

FEMINAE

SUBVERSAE INDICIT

OMNESQUE GENIOS AD VIRGILIUM DEMONSTRATIONES

MDCCCLXXV

OMEN TI

NOVAM ICONEM TRADIT

AD DIEM 2 MART. MDCCCLXXV

O M E N T I N O V A F I G U R A.

Cum Veterum figurae solum Omentum majus, ejusque partem Gastrocolicam repraesentent, GARENGETIANA vero *Splanchnol.* T. VI. quae Omentum minus, post WINSLOWUM, exhibet, nullos limites habeat, & nullam naturae speciem, non inutile fore putavi, si aliam figuram darem, atque descriptionem, ex triginta, ad minimum, cadaveribus collatam.

- A A Hepatis pars cava, reclinata, ut anterior sit, quae erat inferior, margo vero anterior nunc superior sit.
- B B Vesicula fellea, uti solet in pueris *a)*, hepate brevior.
- C Vena & fossa umbilicalis. *b)*
- D Lobulus, quem non bene a SPIGELIO *c)* vocant, cujus eminentia per omentum minus pellucet.
- E Ventriculus, cujus inprimis curvatura anterior apparet, sed tecta bullis inflati omenti.
- F Arteria & vena *Gastro-Epiploica dextra*.
- G Sedes anuli Pylori.
- H Lienis apex, in cavitatem Omenti antrorsum eminens, Ventriculo interpositus & Colo intestino.
- I Ligamentum, quod Lienem sustinet, ab altero, vulgo noto *d)*, diversum, Lieni non adnatum, sed libere mobile, quod plerumque suprema sedes est Mesocoli sinistri, non raro tamen transversi potius, adnexum Peritonaeo, ad decimae & undecimae aut duodecimae costae sedem: Huic ligamento Omentum se inmittit: vidi etiam omnino ipsum Omentum, praetervectum Lienem, ad Peritonaicum

a) Stren. Anatom. §. 6.

b) Hanc venam, fere dimidiam, nuperrime in puella tres septimanas nata, apertam vidi, vasaque edentem ad hepatis utrumque magnum lobum: Hac observatione confirmatur, quod olim proposui, *Hist. foet. bicip.* V. not. b.

c) SPIGELIUS quando aquam hydropicam in Omenti cavitatem depluere posse ait (p. 223.) per lobulum nudum, Omento cavo comprehensum, omnino repetit fere eadem verba HIERONYMI FABRICII AB AQUAPENDEN-

TE de Oment. p. 101. edit. Batav. ut parum sit, quodcunque ad historiam hujus eminentiae addidit, cum olim etiam SYLVIVS ejusdem Lobuli non obscure meminerit *Isagog.* p. 71.

d) Quod a Peritonaeo ortum toti cavae longitudini transversali Lienis longe se inserit, & ultimo cum diaphragmate & Oesophago cohaeret, atque plerumque potius adhaesio est, quam ligamentum. Hoc WINSLOWUS describit §. 333. Ima vero ejus pars in hoc nostrum sustentatorium inseritur.

tonaeum conservata natura pingui pervenisse. *e*) Plerumque tamen album est, firmumque, & ab eo inprimis vinculo situs transversus Lienis *f*) oritur. Non videtur ab aliquo Anatomico dictum fuisse.

K Omentum majus, *f**) vulgare, *Gastrocolicum*. Hujus termini sunt; superior, & anterior ex curvatura ventriculi tota: Inferior & posterior ex majori parte Coli transversi: *g*) Limes inferior est, ubi anterior Gastrica lamina cum posteriori s. Colica convenit; hic in pueris fere ad Umbilicum est, in adultis longius descendit, quo quisque obesior est, trahente pondere, ad pubem usque. *h*) Sinisterior finis, tum lienis pars media, quae vasa recipit, tum ligamentum I, in quod degenerat Omentum, tum colon. Dexter finis, difficilior, exprimitur linea L. Nempe vel trans medium ventriculum, propius Pylorum, vel propius eundem, vel a pyloro, nunquam magis ad dextrum *i*) latus, desinit Omentum, & ab ipso accessu *k*) vasorum Gastroepiploicorum,

e) Adnasci aliquando costae spuriae omentum GALENUS reliquit *administr. anat.* VI. c. 5. & ex eo VALVERDUS p. 184.

f) Eum situm WINSLOWUS primus descripsit l. c. n. 330. deinde ex eo GARENGEOTUS *Splanchnol.* c. XI.

*f**) Minus hic pingitur, quod notius sit, & praetulerim partem omenti Colicam incognitam. Hanc solam partem fere descripserunt Anatomici ante WINSLOWUM.

g) CASSER L. VIII. T. IV. f. 2.

h) CASSER l. c. f. 1. l. l. l.

i) CASSER l. c. f. 2.

k) Omnino adeo dissentio fere ab omnibus Anatomicis: & ab omento removeo 1. Mesocolon transversum, quod, satis certe crasso errore, pene omnes pro Omenti lamina posteriori habuerunt. GALENUS enim *de us. part.* L. IV. c. XI. a spina ait oriri. VESALIUS posteriorem laminam omenti fuisse describit, Mesocolon nempe transversum p. 496. seqq. ed. 1543. FERNELIUS a spina deducit *part. descr.* c. 7. VALVERDUS eadem habet p. 184. & VIDUS VIDIUS p. 250. & HIERONYMUS ABAQUAPENDENTE *de oment.* p. 91. & LAURENTIUS, qui colo ait pro Mesenterio esse, L. VI. c. XI. & SPIGELIUS p. 220. & RIOLANUS, cui Mesocolon *tertia* pars est Omenti *Anthropogr.* p. 97. *Enchirid.* p. 100. & C. BAUHINUS *Theatr. Anat.* p. 44. & T. BARTHOLINUS *Anat. renov.* p. 61. & GLISSONIUS *de ventr. & intest.* p. 112. 113. & I. VAN HORNE, p. 55. ed. PAUL. & N. HIGHMORUS *disquis.* p. 16. Inter nuperiores vero DRAKE L. I. p. 32. DIONIS p. 178. RIVINUS *de*

Oment. p. 9. PALFYN, cujus monstrosa est descriptio *Anat. Chirurg.* p. 73. SENNAC (auctor comment. in HEIST. p. 104.) cum Pancreas in duplicatura aiat Omenti esse p. 104. BOERHAAVIUS eodem argumento §. 100. KAAUWIUS *de perspir.* §. 383. PATYN *diff. de inflam. Oment.* p. 13. Uno verbo omnes fere omnino. ARCHANGELUS tamen PICOLHOMINEUS a spina oriri negavit contra FERNELIUM *Praelect.* p. 81. Deinde p. a MARCHETTIS disertis verbis Mesocolon ab Omento distinguit. *Compend. anat.* p. 23. Tantum tamen consensum auctorum mireris, si Omentum tenuissimum, vasis praeditum exiguis, adipe tantum vasa sequente, glandulis inter areas destitutum, contuleris cum Mesocolo, cui omnia contraria sunt: deinde, si cogitaveris hac auctorum ratione interrumpi continuitatem Mesocoli, adeo evidentem, & sinistrum Mesocolon, a dextro, interposito separari Omento.

Verum 2. neque hanc scriptorum sententiam meae observationes admittunt, oriri nempe a Duodeno, aut a Pancreate Omentum, quorum neutrum contingit. Dissentio adeo a GALENO (*de us. part.* l. c.) & omnibus fere anatomicis, qui longo ordine eum virum exscripserunt, GLISSONIO etiam, p. 123. & nuperimo, caeterum accuratissimo, MONROO, quando aliquam partem duodeni ait in Omento contineri. *Edimb. essays.* IV. p. 66. 68. ic. 1. T. I. *g. h.* Membranam enim duodeni externam non Omentum dat, sed Mesocolon, ex eo angulo, inter duodenum & Colon comprehenso, ad quem Omentum nunquam pervenit.

rum, ante Mesocolon, cui innatat continuatum, incedit ad colon, linea vel recta descendente, vel oblique sinistrorsum inclinata, ibique faccus Omenti finitur. *l)*

L Linea separationis Omenti a Mesocolo. *m)*

M Origo Omenti Gastrocolici a Ventriculi curvatura anteriore, ex qua *lamina* prodit *anterior*. *n)*

N Glandulae conglobatae in hac linea, adjacentes origini Omenti. *o)*

O Linea originis Omenti magni ab intestino Colo: f. *lamina posterior*. *p)*

P Finis coecus Omenti sinister. *q)*

Q Omen-

l) Computatis experimentis, frequentius sinisterius, quam in pyloro, defuisse visum est Omentum, conf. RUYSCH. *Thes.* II. T. V. Quod autem lubricum, saepe flavum, hepatis vasa sustinet, deinde in fissuram transversam hepatis continuatur, transit autem ad Duodenum, ante portam Omenti, id omne Mesocolo est adnumerandum, & continuitas facile demonstratur.

m) Aliquando coeco sacco similis appendix, ab hac linea, quando a pyloro distat, ad pylorum visa est descendisse.

n) Quod CL. WINSLOWUS IV. §. 335. & CL. KAAUWIUS n. 586. duas utriusque laminae esse lamellas faciunt, id verissimum est, & facile demonstratur. Vasa nempe Gastrica inter muscularem & externam dividuntur, truncosque habent interpositos membranae extimae quasi hiatus, unde non una, sed duplex, lamina hinc & inde exeuns, Omentum facit, eadem ratione, qua ab intestinis duplex prodit Mesenterium. Alia, sed erronea ratione, duas principes SENNACUS laminae ait cellulosa tela conjungi, quod est contra omnia experimenta, in *comm.* ad HEISTERUM p. 104. neque enim quidquam de subtili illa duarum lamellarum distinctione praefatur.

o) Olim C. BAUHINUS multas esse dixerat glandulas, superioris folii Omenti, etiam plures, quam inferioris p. 45. contra certe fidem oculorum. Multas etiam glandulas tribuebat Omento VESLINGIUS *Syntagm.* p. 23. 24. Hunc refutat RIOLANUS p. 809. & recte negat glandulas divisioni vasorum adjici. T. WHARTONUS duas aut tres, p. 64. & paucas DIEMERBROECKIUS verius adfirmant; certum enim est, dari aliquas, ex lymphatico genere, in utraque curvatura Ventriculi. Perinde vero certum est, nullas dari in reliquo

pendulo Omento. Quas enim ex HILDANO *Centur.* III. *observ.* 63. & E. N. C. plurimas excitat RIVINUS l.c. p. 11. eae omnino morbosae sunt, & praeter Naturae consilium. Repugnat certe experimentum, neque ferendis est glandulis teneritas Omenti. Mesocolo toti plurimae sunt EUSTACH. T. X. f. 2. & ex Mesocolo videntur C. BAUHINI glandulae sumtae esse: eo enim tempore Mesocolon Omento accensebant omnes.

p) Mireris potuisse GALENUM *Adm. Anat.* VI. c. 5. & SPIGELIUM p. 220. & alios dixisse, paucis fibris Omentum cum Colo cohaerere, cum & vere toti transverso Colo inferatur, & praeterea Mesocolon, quod pro Omento ab his viris est habitum, adeo manifesto pro Colo sustinendo factum sit.

q) Conf. not. *d.* Inter Lienem ergo, & lineam L sub ventriculo, supra Mesocolon, retro omenti laminam anteriorem, ante spacia spinae dorfi proxima origini arteriae Mesentericae, & Coeliacae, cavitas est, quae in faccum ab Omento solo factum late patet, & praeterea retro ventriculum cum cavitate Omenti minoris, ex fine vero Colico lineae L. cum cavitate appendicis colicae continuatur. Facile demonstrat in pueris flatus; aquam vero, quam GALENUS proponit de *Admin. anat.* VI. c. 5. & SPIGELIUS p. 219. difficulter fert, neque aërem in adulto, quia spacia pinguedine libera crepant. Hic ponebant hydropis sedem VETERES, atramque bilem congeri vidisse voluit H. F. ab AQUAPENDENTE, pus autem RIOLANUS p. 98. 99. & aquam hydropicam ID. p. 97. ut non aliam sedem faceret soni, quem Engastromythi edunt. Sed recte GLISSONIUS p. 124. cavitatem necessitate mechanica factam esse, non ut aliquid reciperet. Et hydrops ita non replet Omentum, ut certo consumat.

Q *Omentum minus* WINSLOWI *r*), five membrana macilentior, quae ex fossa ductus venosi, initio facto ad transitum arteriae hepaticae, continua ibi membranis funiculi vasorum hepaticorum, quas dixi trans duodenum continuari Mesocolo, sine paulatim in ligamentum Hepatico - Oesophagaeum degenerante, trans lobum hepatis, se in curvaturam minorem Ventriculi inmittit. In cavitate lobulum habet, & nudas lumbales glandulas.

R *Omentum Colicum*, perpetua, quantum video, appendix Omenti magni, quae a fine colico lineae L ad finem usque transversi Mesocoli, & aliquando paulum ultra, ex Colo Intestino solo, intacto Ventriculo, duplici ex linea provenit, similis magno, pariter innatans intestinis, & lobulo exiguo elegante finita. Non videtur haec portio Omenti dicta esse, quae uti magno cedit, ita minori major est.

In porta Omenti *s*), quam icon nostra non admisit, aliqua etiam sunt addenda descriptioni WINSLOWIANAE.

Hiatus est, five intercapedo, quae angusto primum & longiusculo tractu, inter vasa biliaria, continuamque portarum venam, anterieus positam, & inter posteriorem hepatis depressum lobulum *t*) recipitur, quem vasa hepatica sibi excavant, & pro portarum dextra habuerunt Veteres.

Porro continuus huic viae est lunatus hiatus, a WINSLOWO inventus, per quem aer pariter potest inmitti cavitati minoris Omenti; Hunc finiunt hinc hepatis extrema, quam dixi, porta, ab opposita, inferiori parte proxima, sed distincta, ultima radix Mesocoli, quae trans Pancreas ad descendens Duodenum properat; anterieus vasorum hepaticorum fasciculus est, retro nudum peritoneum, leve, & aequale. Vena Cava paulo dexterior adjacet.

S Pars Mesocoli *u*) inter limitem dextrum Omenti magni, & conjunctionem Coli cum Duodeno.

r) Neque tamen diffitendum est, eos omnes Auctores vidisse hanc membranam, qui lobulum in cavitatem Omenti dixerunt se immittere, FABRICIUM nempe, SPIGELIUM, ROLLANUM, cui *tertia* est Omenti portio *Anthrop.* p. 97. & *Enchir.* p. 100. VESLINGIUM p. 23. P. de MARCHETTIS p. 14. GLISSON l. c. xv. PALFYN p. 73. & alios, ut de iis non dicam, forte non autoptis, qui magno numero cavo hepatis dixerunt adhaerere Omentum.


s) Nunquam vidi defuisse, quod HEISTERUS (comp. anat. not. 7. ed. ult.) sibi accidisse ait, & KULMUS in adultis frequens esse. *Tab. ed. ult.* p. 94. Sed occultata aliquando a ligamento non perpetuo, hepatico renali anteriori, hoc demum dissecto adparuit.

t) Comm. in BOERHAAV. III. p. 121.

u) De Mesocolo alias dicendi locus erit. Sufficit hic monuisse; Mesocolon dextrum a summo rene oblique paulum introrsum adscendere,

superare venae Cavae sedem, & duodeno primo, deinde Pancreati se admove, & antrorsum adurgere, a Pancreate ad idem iturum Duodenum, sicque pervenire ad portam Omenti, ubi ab Hepatis, quam dixi, fissura, cum vasis alia socia radix Mesocoli advenit, pariterque trans Duodenum adit Colon, & porro a pyloro, sub ventriculo, transversim, per totam latitudinem abdominis, ad lienem usque continua, manifestior, antrorsum emergens lamina sequitur: Huic inferior se adponit & similis transversa, libera ad emergens usque duodenum, tum continua orientis jejuni membranae externae, porro Mesenterio conjuncta. Inter has duas laminas Pancreas totum est, & Duodenum totum, evidentius vero pars inferior arteria porro Mesenterica, venaeque sociae & ductus bilarii. Inflata intercapedo aerem recipit, & in bullas turget, non dissimilis Omento. Vide interim WINSLOWUM.

TAB. I.



D. ALBERTVS HALLER

ANAT. P. P. O.

A N A T O M E N
F E M I N A E

INDICIT

ET STUDIOSES AD VISCERVM DISSECTIONEM

INVITAT

ET

O M E N T I

SECUNDAM ICONEM ADJICIT

AD DIEM VI. NOVEMBRIS MDCCXXXII.

D. ALBERTUS HALLER

AVASTA

ANATOMIE

FEMINAE

INDICIA

AT LUDWIGS-ACADEMIE ZU ERLANGEN

MDCCCLXX

OMNIT

SECUNDUM ICONEM ADIUNCT

PER LUDWIGS-ACADEMIAE MUSEUM

FIGURA II.

Priora omnia, sed omento majori utroque collapsio, & colo intestino paulum deorsum tracto, aditus ille celebris omenti adparet.

A A Hepatis pars cava, reclinata, ut ea, quae anteriora sunt, facta sint superiora. *a)*

B B Vesicula fellis.

C Vena Umbilicalis. *b)*

D Lobulus Spigelii per omentum minus perinde pellucens, ut in priori icone.

E E Ventriculus pene vacuus, cujus minorem curvaturam lobulus Spigelii ingreditur, planum vero anterius hepar sinistrum protegit.

G Pylorus, ex quo prima flexio Duodeni retrorsum adscendit.

K K Omentum Gastrocolicum collapsum. *c)*

O O Limes in colo, ex quo omentum Gastrocolicum, & Colicum, provenerunt.

Q Q Omentum minus.

S S Mesocoli partes. Ad sinisterius s. pellucet pars Duodeni transversae secundi.

T T T Variarum partium Coli.

V Duodeni flexus secundus pene transversus, *d)* cui vesicula fellis infidet.

X Duodeni flexus tertius, five pars descendens, in quam ductus choledochus se inmittit.

Y Li-

a) Inde sequitur, ut vesicula fellis naturaliter transversim ponatur, & fundo suo anterior, cervice sit posterior, contrario modo, quam fere vulgo describitur. Conf. not. *a.* ad CCCXLVI. INSTITUT. BOERHAAV.

b) Obiter hic addo, perpetuo in fetu multo majorem esse venam umbilicalem, quam ductus venosus, ut nuper rationem luminum invenirem 629. ad 100. Adeoque cum vena umbilicalis ramos multos det ad hepar not. *k.* ad INST. BOERH. CCCXLI. magna pars sanguinis Umbilicalis non per compendium ductus venosi, sed per ipsum hepar ad venam Cavam

fertur, quod quidem non lego esse animadvertum.

c) In eo adparet, oriri unice a ventriculo, neque toto, non adeoque a Duodeno, ut plerique auctores habent Progr. I. not. *l.* quam observationem ex nuperis experimentis confirmavi. Cl. MONROUS a parte aliqua Duodeni Omenti laminam anteriorem oriri dixerat, ad alias a meis observationes EDIMB. ESSAYS IV. p. 66. T. I. G. E.

d) Flexiones has Duodeni descripsi not. *i.* ad XCVI. INSTITUT. BOERHAAV.

- Y Ligamentum five Membranae *e*), quae a vesicula & continuo fulco transverso ad colon eunt, trans Duodenum, cui sunt pro externa membrana, & aliqua parte adhaerent.
- Z a Ligamentum hepatico-renale, five Peritonaei a Rene ad hepar adscendentis plica *f*) duplex.
- Z Limes finister.
- a Limes dexter hujus ligamenti.
- b b Ren dexter peritonaeo tectus.
- c Celebris ille WINSLOWI meatus, inter ligamentum hepatico-colicum, & hepatico-renale, tum inter hepatis lobum & duodenum proximumque pancreas interceptus, paulum distractus, ut lunatum *g*) esse adpareat, & circa hepar conflecti.
- d d Colon cum appendicibus pinguibus.
- e e e Intestina tenuia.
- f f Pars pancreatis, quae inter flexuras Duodeni se insinuat.

e) Has WINSLOWUS ab hepate & vesicula oriri, sed in duodeno terminari ait. IV. *tr. du bas ventre* n. 359. *Mem. de l' Acad.* 1715. p. 317. MONROUS vocat duplicaturam omenti l.c. G.H. Verum simplex ibi est, & flava, & lubrica membrana, continua capsulae GLISSONII & omento minori.


f) In etiam WINSLOW l.c. in *actis* vero *Parisinis* ligamentum Colico-Pancreaticum pro

altero pariete foraminis sui recenset. Id autem est radix ultima Mesocoli, quae Duodenum continet *not. R. Progr. I.*

g) Recte WINSLOW IV. n. 359. Verum porro continuari hunc hiatum, & inter hepar & ductus bilarios pergere non observavit. Rudem autem iconem dedit GARENGEOT *Splanchnol.* T. VI. f. 2. quam cum his nostris comparasse juvabit.



TAB. II.



C. J. Rollinus Med. Dr. Volin.

fec. G. D. Heuman Acad. Götting. Sculptor.

ALBERTVS HALLER D.

INDICIT

ANATOMEN FETVS

CRANII PARTE ET CEREBRO

DESTITVTI

CENTESIMVM NEMPE CADAVER

QVOD IN HOC THEATRO SECVIT.

AD D. XXVI. MART. MDCCXLIII.

Operae pretium duxi hanc dissectionem solenniori invitatione ornare. Rara enim felicitate mihi contigit, intra sextum annum centum cadavera humana, Theatro nostro illata, mea manu secare, praeter paucissima, quae infirma valetudo, aut urgens aliqua necessitas alienae industriae committere coegit. Ita cautum est porro occasionibus, ut in his scholis non solum anatomicum ex humanis corporibus discere possint Iuvenes, sed, quoties libuerit, propria manu secare. Thesaurum etiam praeparatarum partium orsus sum, qui cum quotidie crescat, brevi desinet parvus esse. Ut hanc ergo felicitatem meam, quae simul publica est, Programmata celebrarem, delegi perfectiorem inter meas icones, quam sculpendam darem. Nervorum & arteriarum oculi nullam videbatur iconem adhuc datam esse. Nam EUSTACHIANI & VIEUSSENIANI nervi extra situm viciniasque picti sunt CANTIANAE vero icones in T. II. impetuum ita rudes, ut pro nullis haberi queant. Sinuum, etsi nondum absolutissimam iconem trado, novas quasdam tradidi partes, & fidem meam liberaui, quam dedi n. 18. dissertationis de nervi intercostalis origine.

EXPLICATIO LITTERARVM.

A Tentorium Cerebelli. ¹

B Sinus *longitudinalis* ² durae matris, finis posterior bifur-
catus. ^{2*}

C Si-

¹ Pars anterior, quae ad processus clinoi-
deos anteriores usque venit, hic demolita est.

² Veteres quatuor omnino sinus cognitos
habuerunt, quintumque, uti notum est, VESA-
LIUS adjecit, quod minus mirum est, ante in-
ventam injectionem. Sed, post FALLOPII egre-
giam descriptionem, denuo ex hominum me-
moriam deleta FALLOPII inventa, sinuumque
numerum ad quatuor aut quinque reductum,
exiguum certe argumentum est industriae po-
sterioris aetatis. Causa vero negligentiae fuit
maxima, quod FALLOPIUS figuras non ha-
beat, & omnes fere certatim VESALIUM ex-
scribere sint soliti. Ita VALVERDVVS *anat.*
corp. hum. L. V. c. 1. & ARCHANGELVS PIC-
COLHOMINEVS *Prael. anat.* p. 245, 246. &
SALOMON ALBERTVS *hist. pler. part.* p. 6.
7. & PLATERVS L. X. c. 7. & SPIGELIUS *de*
corp. hum. fabr. p. 289. & RIOLANVS *Anthro-*
pol. p. 254. 255. & CASPAR BAVHINVS (qui
meliora meritum FALLOPIUM etiam carpit
ob inventa) *Theatr. anat.* p. 291. & VESLIN-
GIUS *syntagm.* p. 171. 172. & HIGHMORVS
T. XVIII. (cujus icon est fere clancularia imi-
tatio VESALIANAE) & MARCHETTE *Comp.*
anat. p. 216. 217. & MOLINETTVS *Diff. anat.*
Pathol. p. 184. & WILLISIUS *Cerebr. anat.* p.
44. & DIEMERBROECK *Op. omn.* p. 338. & COL-
LINS *Theatr.* p. 983. & ipse VERHEYENIUS
p. 214. ed. *Brussel.* Hi omnes partim quatuor,
partim quinque sinus numerant, & nihil post
VESALIUM addiderunt.

^{2*} Varia fabrica est celebris hujus concur-
sus quatuor sinuum, sive *Torcularis Herophili*,
uti recentioribus dictum est, nam GALENUM
intelligere non facile est. Verustiores anatomi-
ci solebant ita depingere, ut quatuor sinus in-
star crucis convenirent, angulosque aequales in-
terciperent concursu. Ita VESALIUS L. VII.
f. 7. Talem etiam crucem pingit CASSERIUS
in tabulis SPIGELIANIS L. X. T. 6. f. 1. O.
P. Q. R. T. XI. f. 1. & VESLINGIUS in *syn-*
tagm. c. XIV. T. I. f. 5. & LOWERVS *de cor-*
de T. 6. f. 1. & VIEVSSENIUS *neurogr.* T. I. &

ORTLOB *oeconom. part.* p. 155. f. 2. & CHESEL-
DENIUS in T. 16. compendii, edit. 1726. pa-
rumque diversa est icon SAL. ALBERTI L. C.
Deinde FRANCISCUS SYLVIVS observavit,
apud BARTHOLINVM p. 251. edit. 1641. non
semper aequalem esse transversorum sinuum
altitudinem, hancque adnotationem repetiit
DIEMERBROECKIUS p. 339. & rationem ad-
didit LOWERVS, hanc diversitatem nem-
pe variam esse, prouti quisque, dum vita-
lis erat, in hoc aut alterum latus magis so-
litus sit decumbere, *de corde* p. 159. Nihil
admodum ideo mutarunt recentiores, *findi* a-
junt longitudinalem in transversos (RIDLEY
of the brain. p. 41. la CHARRIERE *Anat. de*
la Tete p. 132.) Sed haec vox ambigua est.
Nam longitudinalis sinus aliquando in ipso ver-
tice, vix unam tertiam partem longitudinis
emenfus, in duos abit sinus, dextrum & fini-
strum, sibi accumbentes, ut in eo cadavere
fuit, ex quo icon desumpta est; Haec fabrica
a nemine memoratur anatomicorum quos le-
gi, praeter unicum IACOBVM BERENGARI-
VM *Carpensem* in MUNDINVM p. ccccxxv. A-
lias jam declivis *findi* incipit, & proximus tor-
culari. Sed MORGAGNVS accurate recens-
tis experimentorum vicibus, invenit omni-
no rarius *findi*, plerumque vero in dextrum
transversum degenerare, rarissime in sinistrum,
in utroque vero casu alterum transversum
continuationi sinus longitudinalis tamquam ra-
mum inferi *Advers. anat.* VI. p. 2. T. I. f. 1.
uno vel pluribus ostiis. Hanc descriptionem
suam fecit GARENGEOTVS *Hist. de l'Acad.*
des scienc. 1728. & in *splanchnol.* nov. ed. II. p.
219. 220. calculumque suum adponit Cl. NI-
COLAI *diff. de direct. vas.* p. 45. WINSLOWVS
totam rem incertam facit, ut sinum longi-
tudinalem bifurcari describat in fabrica com-
muniori, (*expos. anat.* IV. tr. *de la tete* n. 40.)
saepe tamen in alterutrum transversorum so-
lum continuari modo dextrum, modo fini-
strum, ut alter altero altior sit, aut major
n. 41. Fere eadem habet CHESELDENIUS
in nupera editione *anat. of the hum. bod.* 220.
& non recedit SANTORINIUS *obj. anat.* p. 51.
K 2

Con-

- C Sinus *Quartus* bifurcatus ³, & crure uno in dextrum transversum insertus, altero in sinistrum.
- D Falcis Cerebri reliquiae.
- E E Venae magnae Tentorii. ⁴
- F Venae Cerebri ⁵ insertae transversis sinubus, in ipso tentorio cerebelli, perpetuae.
- G Ostium sinus *Occipitalis posterioris*. ⁶

H H

Contraria vero observatione, quam qua usus est MORGAGNVS, uti olim in figura VESALIANA septima libri septimi, tum in BIDLOIANA T. VI. f. 2. & RIDLEYANA f. 4. videbatur, ita pro certo adfirmavit CANTIVS, lateralem sinum in sinistrum fieri p. 8. qui tamen descriptioni perfecte contrariam iconem dedit, ut in dextrum continueretur *Imp. Anat. T. II. f. 1. Cl. LIEVTAUD* eo videtur inclinare animum, cum dicat „ non raro sinistrum transversum majorem *Essays Anat. p. 385.* solet autem is major esse, in quem inseritur longitudinalis. Ego vero, si meum iudicium interponendum est, longe saepius reperio dextrum esse trunci continuationem, sinistrum vero ramum minorem, insertum dextro majori COMM. BOERH. II. p. 630. Inde fit, ut fossae jugulares aliquando in dextro latere duplo, quam in sinistro, majores sint HUNAVLD *Mem. de l'Acad. des sc. 1730.* Denique SYLVIVS olim l. c. & f. 4. deinde MORGAGNVS l. c. p. 3. & ILL. HEISTERVS *Compend. Anat. T. VII. f. 32.* crura fissi longitudinalis transverso ductu conjuncta fuisse videntur. In vitulo viderat RIVINVS de *dyspeps. cor. 3.* & transversalem RIVINI vocat WELSCH. *Tab. anat. 54.* SLEVOGTIVS eundem describit de *dura Matre* n. 44. Id etiam rarius est, quod habet LIEVTAUD l. c. alterum sinum lateralem defuisse.

³ Hoc rarissimum est: habet tamen WINSLOW IV. p. 374. Plerumque in sinistrum transversorum aperitur, quando dexter trunci est continuatio. WINSLOW. l. c. CHESELDEN. *anat. 1741.* p. 220. MORGAGNI *Adv. VI. p. 3.* GARENAGEOT l. c. p. 225. &c. Vidit etiam MORGAGNVS insertum fuisse in transversalem, communicantem inter longitudinales l. c. & in icone T. I. f. 2. pingit insertum dextro, cui ego ter in septem cadaveribus, aliquoties in sinistrum vidi inferi. Transverso insertum olim SYLVIVS vidit apud BARTHOLINVM l. c. Caeterum sinus Quartus non transversalis est, uti vulgo lego, sed inclinatus, ut non mediocriter descendat.

⁴ Magnae & variabiles, sed perpetuo aliquae reperiuntur. Eas VESALIVS pinxit L. VII. fig. 7. C. O. f. 8. V. V. f. 9. &c., sed parvas, & VIDVS VIDIVS *Anat. f. 4. y. y. f. 7. y.* & RIDLEYUS f. 4. L. Neque alii sunt sinus laterales novi SYLVII apud BARTHOLINVM l. c. p. 251. f. 5. & DIEMERBROECKII p. 339. & BOVRDONI *descr. anat. p. 195.* & TAUVRYI in *anat. ration. p. 257.* An *Intralaterales* NICHOLLSII *Comp. Anat. p. 40.*

⁵ Fasciculus est venarum, quae in medios fere transversos, pollicis & ultra distantia ab origine ex falciformi sinu, confertae & perpetuae inferuntur. Hae videntur venae esse, quas GALENVS ait „ superficialiter in torculari congregi, tenues, ut specillum non capiant *Administr. Anat. IX. c. 1.* & apud ORIBASIVM p. 5. edit. DVNDASSIANAE. Oriuntur autem a lobis cerebri posterioribus, & a cerebello, ac ex gyris quidem superficialibus. Venae enim profundae cerebri & cerebelli Quartum sinum adeunt.

⁶ DUVERNEYUS hunc sinum invenit, uti EXPALFYNIUS video, *Anatom. Chirurg. II. p. 13.* Nam TAUVRY l. c. & DIONIS *Cours d'Anat. p. 518.* & la CHARRIERE p. 133. qui eundem sinum describunt, neminem auctorem citant. Verum neglectum omnibus Cl. MORGAGNVS in solidum collavit *Advers. Anat. VI. p. 3.* pene perpetuum, ut etiam in craniis cristae cerebelli falcem sustentanti crena pro hoc sinu insculpta sit MONROO *of the bones p. 110.* Modo par est sinuum, MORGAGN. l. c. WINSLOW., modo unicus. Quando unus est, uti unum faciunt DUVERNEYUS, & qui eo utuntur, tum CANTIUS, MONROO, & CHESELDEN., in alterutro latere reponitur falcis cerebelli, & uti video, plerumque in dextro, cranio adplicatus, & a sede torcularis ad magnum foramen descendit, ibique, diductis cruribus, magnum occipitis foramen ambit, uti WINSLOWUS, qui pro

H H Sinus *occipitales posteriores*, dexter, & sinister, cum suis cruribus, insertis in fossas jugulares.

I Falx cerebelli.

K K Sinus *transversi magni*.

L L Fossae Jugulares. 7

M M Sinus *petrosi superiores* 8 his fossis inserti.

N N Sinus *petrosi superiores*. 9

O O Vena

pro duobus novis sinibus numerat, & SANTORINVS l. c. p. 51. qui vidit bifido sine cum transversis inferius coivisse: inseritur autem fossis jugularibus, vel vertebralibus, si recte PALFYNIUS, DUVERNEYI inventa recenset, vel petrosis inferioribus, ut de sinu suo septimo & octavo dicit GARENGEOT p. 229. ex WINSLOWO l. c. IV. p. 366. & semel vidi. Plerumque tamen in fossas jugulares terminantur, & raro defunt. Quando duo sinus sunt, tunc eadem ratione circulum circa magnum foramen absolvunt, uti in icone. Neque utiliter factum est, quod a DIONYSIO l. c. a la CHARRIERE l. c. CANTIO, & ipso ILL. MORGAGNO l. c. & CHESELDENIO *anat. of. hum. bod.* ed. 1741. p. 220. non ultra magnum foramen occipitis sint deducti, ubi nunquam eos terminari vidi. Superior vero insertio est vel unica, eaque modo in Quartum CANT. l. c. p. 8. T. 2. f. i. modo in lateralem dextrum MORGAGNI l. c. uti etiam vidi, modo in sinistrum, quod pariter mihi aliquoties obvenit. Quando duo sunt, tunc oculum unius in alterum aperiri visum est MORGAGNVS l. c. T. VI. f. i. Mihi etiam alter in sinum lateralem sinistrum, alter in Quartum, visus est inferi. Crura horum sinuum, magnum foramen amplexa, nomine *Lateralium inferiorum* videtur intellexisse VIEVSSENIUS *Neurograph.* p. 8. In sinus Occipitales venas a vertebrais adscendentes inferi vidi, quas etiam WINSLOWVS habet p. 367. tum venas a dura matre fossarum imarum cranii perpetuas.

7 In has fossas praeter sinus transversos, petrosos, & occipitales, solent inferi venae vertebrales, per peculiarem meatum ossis occipitis sinui magno jugulari inmissae, notissimae, tum venae aliquae a dura matre occipitali, & non raro mastoideae. Arteriam ab Occipitali per idem foramen infrequenter ad duram matrem venire video, quam etiam olim VESALIVS p. 496. edit. 1555. tum COWPERVS ap-

pend. f. 26. & amicissimus D. WHREDE *de cerebro* p. 44.

8 Sinus petrosi inferiores, a FALLOPIO primo loco dicti p. 219. b. picta VIDO VIDIO, T. XXIV. f. III. IV. & p. 118. nomine *Primi & Secundi*, breves sunt, lati, diffformes, a fossis juxta radicem ossis petrosi adscendunt, & in receptacula inferuntur binis locis: 1. cum nervo sexti paris canalis it, per duram matrem, qui utrumque sinum conjungit. 2. cum cavernoso, & unito cum cavernoso circulari (CHESELDEN l. c.) ante nervum sextum inter processum clinoidium posteriorem, & Quintum par in ambitu carotidis internae. Hanc communicationem olim FALLOPIVS vidit, & pinxit VIDVS l. c. tum inter recentiores VIEVSSENIUS, qui nomen inposuit, & pro novis describit, T. XVII. ubi nimis angusti pinguntur, & RIDLEYVS l. c. p. 44. (nempe cum circulari sub f. 2. e.) & LITTRIVS *Mem. de l' Acad.* 1707. p. 165. & BIANCHI apud MANGET in *Theatro* II. p. 347. Sed praeterea cum Occipitalibus anterioribus manifesto communicant, a quibus, quasi transverso canali uniuntur ORTLOBIO dicto not. 13. Hi sunt sinus inferiores sellae LITTRII p. 165. Venas aliquas ab ima medulla oblongata & spinali, recipiunt, quas etiam CHESELDENIVS pingit l. c. inter 8. & 14. Vidi cis fossas jugulares defuisse, absque ulla cum transversis communicatione, & hujus modi est icon ORTLOBII.

9 Hos idem dixit FALLOPIVS. Quorum prior & c. p. 219. b. Tertium & Quartum vocat VIDVS VIDIVS ex FALLOPIO p. 118. l. c. b. f. e. VIEVSSENS pro novis descripsit, nomenque inposuit, quod retinemus. Iconem etiam dedit ORTLOBIVS, & commodam RIDLEYVS f. 2. d. Perpetuo reperiuntur, ut male & hos, & priores neget adesse VESALIVS *exam. obs. fallop.* p. 167. Licet angusti sint, facile per transversos inflantur.

- O O *Vena cerebelli* his sinubus inserta. ¹⁰
- P P Sinus *occipitales anteriores, inferiores* ¹¹ non perpetui.
- Q Q Emissarium eorum cum nervo noni paris exeuns. ¹²
- R R Sinus *occipitalis anterior & superior*, ¹³ perpetuus.
- S S Ejus cum cavernosis receptaculis & sinu circulari anastomosis. ¹⁴
- T Ostium petrosi superioris, in cavernosum aperti. ¹⁵
- V V Receptacula, five *sinus cavernosi*. ¹⁶

X X Si-

¹⁰ Venae inter cerebellum & medullam oblongatam adrepunt notabiles, perpetuae, a medulla oblongata ortae, & cerebello, quas etiam habet Cl. LIEUTAUD p. 337. Has olim FALLOPIUS dixit a pia matre cerebri venire p. 219. b. & depinxit VIDVS VIDIVS l. c. f. 4. p. p. p. p. deinde CHESELDENIVS T. XVI. ad 11. Verum praeterea hic etiam sinus venas habet a tentorio, aliasque a dura matre fossam mediam cerebri investiente, quae aliquando majusculum truncum efficiunt, per angulum ossis petrosi, qui cum squamoso committitur, euntem, & insertum laterali, in angulum eundem, quem adit petrosus superior. Hi sunt *sinus petrosi anteriores* WINSLOWI & GARENGEOTI, sinus nomine, meo quidem judicio, indigni. Emissarium denique primum SANTORIN. not. 19. vidi non cavernoso, sed huic petroso superiori sinui insertum fuisse, cum super cavernosum durae matri instratum perrexisset.

¹¹ Exigua est horum memoria, quos hic latos vidi, & multum a petrosis diversos. Unum pingit ORTLOBIVS ad Ln. communica-ntem cum transverso n. 13. quod hic secus fuit, & cum occipitalibus posterioribus L. L. L. Eum *vertebralem* vocat, cum mihi primus circulus vertebralis diversus videatur, & infra cranii caveam positus: In eum vero vertebralem sinum, noster descendens terminatur. RIDLEYVS aliquid simile adumbrat ad e. m.

¹² His nempe sinubus inserta fuit vena vertebralis, quae in hoc subiecto, cum proprium foramen non naeta esset, infrequentiori fabrica cum nono pare per os occipitis ivit. Plerumque tamen proprium canalem naeta est, retro condylos occipitis, brevem, antrorsum euntem, terminatum in fossam jugularem, dictum FALLOPIO p. 219. 220. & non bene a CASPARO BAUHINO negatum *Theatr. Anat.*

p. 296. inpare certe censore FALLOPII. Caeterum cum nervo noni paris vidi arteriam a Carotide externa ad duram matrem venisse.

¹³ Hos nemini dictos ORTLOBIVS depinxit, ad N. N. N. & p. 156. deinde LITTRIUS nominavit, finum nempe durae matris retro processus clinoideos posteriores l. c. p. 163. *Transversum conciliatorem* vocavit ORTLOBIVS, sed ex fabrica non perpetua, idque nomen retinuit WELSCHIVS l. c. Nempe vidit, retro processus Clinoideos, trans processum ossis occipitis anteriorem, transverso ductu univisse petrosos inferiores. Hoc & BIANCHVS vidit apud MANGETVM f. 1. u. u. ego aliquoties. Frequentius tamen inordinati magis sinus perreptant duram matrem, ab ipsis clinoideis processibus, ad ossis occipitis magnum foramen. Ita aliquot truncos, & obliquos pingit CHESELDENIVS T. XVI. ante 13. conjungentes petrosos sinus inferiores. An *sinus transversalis superior* WINSLOWI, an *inferior*? an uterque?

¹⁴ Ad interiora carotidis inter hanc arteriam & processus clinoideos conjungitur cum circulari, ibidemque ad exteriora Carotidis cum sinu cavernoso. Haec conjunctio ipsi solet cum sinu petroso inferiori communis esse.

¹⁵ Perpetuo in receptacula hiat ibique cum inferiori petroso conjungitur. Ita recte olim FALLOPIUS, & in icone VIDVS VIDIVS, & VIEVSSENIVS intero & * l. c. & ORTLOB l. c. ad I. Locus insertionis est exterius quam processus, clinoideus posterior super finem itineris Quinti paris anteriorem. Quare ait raro inferi cavernosis Cl. LIEUTAUD p. 387.

¹⁶ Receptacula ita cognita habuit FALLOPIVS, ut minime ignoraret, petrosos utrosque prope

- X X Sinus *transversalis sellae equinae*. ¹⁷
 Y Y Sinus *circularis RIDLEYI*. ¹⁸
 Z Z Venae *cerebri anteriores*, insertae cavernosis, perpetuae. ¹⁹

a a Ar-

pe sellam equinam conjungi, & in eam conjunctionem Venas varias etiam ex orbita p. 219. convenire, quas rudiuscule expressit VIDVS l. c. Sed & LOWERO non ignota fuerunt receptacula, cum in brutis viderit, liquorem in venas jugulares impulsu, proxime glandulam pituitariam erumpere c. VI. de *catarrh.* p. m. 248. &c. VIEUSSENIUS restituit eadem, in eo solo minus laudabilis, quod tertium, quartumque par nervorum iis adtribuerit, cum ne Quintum quidem ad verum sinum pertineat. Vid. *diff. de nerv. interc. orig.* not. ppp. ORTLOBIUS *Polymorphos* dixit, (quod nomen retinuit WELSCHIVS l. c.) & figuram dedit (P. P. P.) omnino difformem, ut facile crediderim, emissarium secundum SANTORINI (not. 19.) ab ipso cum sinu numeratum fuisse. Nam & RIDLEYVS non alia receptacula adgnovit, praeter itinera varia nervorum suis tecta vaginis, p. 45. & carotidis canalem p. 43. & venam illam, quam SANTORINVS pro duobus emissariis numerat, insertam circulari sinui p. 46. Eadem ratione receptacula ad sinus petrosos inferiores retulit LITTRIVS l. c. p. 167. Sanguine vero non repleti, quod RIDLEYVS dixerat, ab omni experimento alienissimum est: neque unquam vidi, neque facile crediderim receptacula desiderari, quod sibi obvenisse ait SANTORINVS p. 72. non usus repletionibus. Communicant cum circulari, ad latera sellae, inter nervum III. superiorem, & sextum, ante processus clinoideos posteriores, super Carotidem, cum transverso sellae equinae, not. 17. ampliter, cum petrosi superioribus & inferioribus, cum occipitalibus anterioribus, venisque dictis not. 19. per quas plerumque inflari possunt.

17 Valens & multo circulari amplior, in lamina inferiori durae matris, sub glandula pituitaria mediam sellam transversus dividit, & cavernosos sinus conjungit. Hunc primus LITTRIVS describere videtur, sinumque vocat mediae sellae transversalem l. c. p. 163. & cum sinibus inferioribus durae matris communicare ait p. 165. atque sub glande Pituitaria esse p. 175. Idem est, quem inter glandulam & processus clinoideos posteriores BIANCHI vidit p. 343. & pro circulari habitum credit a RIDLEYO. WINSLOWVS videtur circula rem inferiorem vocare, l. c. p. 367.

NICHOLLS infracirculares p. 40. GAREN-GEOTVS pituitarium profundum, & nomine medii intelligit, vel hunc, vel sequentem, LIEVTAUD l. c. p. 386. in eo diversus a BIANCHO, quod ante glandulam pituitariam poni ajat. Verum NATURA in his varietatibus facilis est.

18 Sinus *circularis superior WINSLOWI* l. c. & GAREN-GEOTI, diversissimus a priori, in lamina durae matris interna, circa glandulam pituitariam, in superiori plano ponitur, & non raro eam totam ambit, anterieus latior, posterius perpetuo perangustus, & tunc quidem *circularis*, a RIDLEYO inpositum, nomen meretur, qui post BRUNNERVM descriptionem dedit p. 43. & iconem f. 2. 2. 2. Neque *Ovalem* male eum adpellavit LITTRIVS l. c. p. 163. 164. Communicat cum occipitali anteriori ad interiora Carotidis & supra eandem; cum receptaculis trans Carotidem inter nervum tertium & processus clinoideos; cum inserto ibi petroso inferiori ante nervum sextum, inter processus posteriores & par Quintum, paulo posterius & interius; cum superiore vero, retro eosdem processus, sub nervi tertii quartique itinere nonnunquam continuantur, & huc pertinet icon CHESELDENII. Dudum cum petrosi docuit convenire RIDLEYVS, tum CHESELDENIVS p. 220. & in icone, ubi receptacula non distinguit a sinu circulari & petrosi. Verum idem pene frequentius imperfectus est, circulo paulo minor, cum minus semicirculo segmentum retro glandulam pituitariam deficiat, deficere enim vidi, non solum exiguum esse, ut fatetur SANTORINVS *observ. anat.* p. 71. & MORGAGNVS *Adv.* VI. p. 25. dum tutantur RIDLEYVM contra BIANCHI objectiones. Hujusmodi bonam iconem dedit CHESELDEN. l. c. 10. Venulas accipit a sella equina, aliquando insignes, & non raro emissarium SANTORINI primum not. 19. ad hunc sinum properat, trans receptacula & Nervum Quintum. Id etiam RIDLEYVS vidit p. 46.

19 FALLOPIVS ab orbita ad conjunctionem sinuum petrosorum venas advenire docuit, & depinxit VIDVS l. c. f. 4. u. u. a cerebro vero sssss. Deleta fere harum rerum memoria
 L 2 RID-

- a a Arteria durae Matris praecipua. ²⁰
 b b Vena ejusdem comes. ²¹
 c Locus ubi peculiari foramine cranium pervoravit. ²²

d d Ar-

RIDLEYVS, duas venas descripsit, quae ad latera sellae equinae per duram matrem repant, eas conjungi, & uno trunco ad sinum circula-rem inferi dicit: aliam ab oculo aiebat venire, aliam a foramine Quinto cranii, quo nomine vult tertii rami Quinti Paris meatum p. 46. Haec ulterius rimatus SANTORINVS p. 73. tria reperit emissaria, quorum duo priora cum RIDLEYANIS venis conveniunt, tertium est vena, quae cum arteria & nervo obscurissimo loco super processus pterygoideos inferiores versus nares abit. WINSLOWVS in sinus inferiores cranii venas ex cerebro inferi recte monet l. c. n. 179. & easdem venas cum vena ophthalmica conjungi, pariter egregie docet LIEVTAUD p. 387. Venas autem ophthalmicas, adeo tenues, adeo a sinuum fabrica diversas, WINSLOWVS minus commode vocat sinus orbitarios, ut mirer non quidem GARENGETVM, qui omnia sua a WINSLOWO habet, sed NICHOLLIVM WINSLOWVM hic sequi l. c. clarissimum demum LIEVTAUD hunc sinum operose describere, & situm definire, inter par sextum & ophthalmicum nervum, insertionem vero in cavernosos sub processibus clinoidis anterioribus p. 387. Ego vero in sinus cavernosos totum fasciculum venarum video confluere, 1. Ophthalmicas, unam vel duas minime ignoratas, praeter FALLOPIVM, VESALIO L. I. c. 12. & INGRASSIAE p. 91. 2. Venas loborum anteriorum Cerebri, perpetuas, sed sinuum nomine minime dignas, incerto numero. Venas porro magis reconditas: Nempe 3. principem durae matris venam (not. 21.), quae cum nervo secundo Quinti paris ad plexum venarum pterygoideum subit. 4. Venam, quae ab INGRASSIA dicta p. 91. & a MONROO of the bones p. 127. secundi emissarii nomine vocata a SANTORINO cum tertio ramo Quinti ad eundem plexum descendit; 5. Venam comitem arteriae Carotidis, quam olim dixi COMM. BOERH. II. p. 343. & a Cl. WEISSIO in programmate Altorffii edito describi video. 6. Venam demum canalis, qui per crassitiam ossis multiformis, supra alas inferiores excavatus est. Haec vena mihi minus nota est quam nervus & arteria, INGRASSIAE dicta, & VESALIO. Quorum haec a nasali arteria, jamjam datura infraorbitalem, in fissura sphe-nomaxillari orta, retrorsum versus tubam EVSTACHII & Carotidis internae iter properat,

ille vero arteriam sequitur. Ductum hujus venae incognitum esse festinus dixerat SANTORINVS. Nam inter Veteres VESALIVS ostium interius habet L. I. c. 12. f. 3. 4. EVSTACHIVS T. XLVI. f. 13. VIDVS VIDIVS T. V. f. 9. O. Foramen exterius EVSTACHIVS l. c. f. 11. 13. VIDVS VIDIVS l. c. f. 8. 10. O. Integram vero descriptionem canalis VESALIVS dedit in explicatione p. 58. edit. 1543. & VALVERDVVS p. 11. & VIDVS VIDIVS p. 30. & INGRASSIAS p. 93. septimi foraminis nomine.

²⁰ Hanc venae nomine descripsit VESALIVS, L. III. c. 7. sulcosque in ossibus inscriptos huic falsae venae tribuit. FALLOPIVS veriora docuit, ut eo minus bene recentiores, & ipse SPIGELIVS errorem VESALII retinuerint p. 289.

²¹ Venae durae Matris passim in sinus inferuntur, non obscurissimae, ut mirum sit, sollicite de ipsis esse inquisitum. Multae superiores in longitudinalem sinum inferuntur, comites arteriarum, quae super sinum incedunt ramosae, ut jurares sinui inferi. Aliae, quas dixi, in transversos, occipitales, fossas jugulares abeunt. Haec vero vena ex praecipuis est, indivisa comes arteriarum, quae ex meningea majori per os parietale, & alas magnas, & partem ossis petrosi adscendunt.

²² Hoc emissarium, nemini dictum recentiorum, non absque errore VESALIO cognitum fuit, quando a vena (quae Carotidis est ramus meningeus) furculum per peculiare foramen cranium subire scribit p. 62. ad f. f. 2. 3. c. XII. L. II. & p. 496. L. III. edit. 1555. Post VESALIVM COLVMBVS habet l. c. p. 38. & pro octavo foramine INGRASSIAS p. 93. Eadem VIDIVS tradit p. 30. & foramen, sed absque nomine, pingit T. V. f. 7. inter I. & L. MARCHETTE de eodem dicere videtur, quando foramen Meningeae arteriae saepe duplex esse dicit, comp. anat. p. 174. edit. Bat. Inter recentiores foramen MVRALTVS habet Vadem. Anat. p. 181. 367. & PALFYNIUS, van de beenderen T. 2. f. 3. d. d. & BOETTICHER de ossib. cran. n. 23. Sed ex VESALIO & MVRALTVM

- d d Arteriae *Carotides* in receptaculo, ²³ finesque resecti, ubi cerebrum fubeunt.
- e e Arteriola in receptaculo orta, ad nervos Quinti paris. ²⁴
- f f Arteriae Ophthalmicae origo ex Carotide. ²⁵
- g g Processus clinoides posteriores, angulosi.
- h Crista Galli.
- i i Sinus Frontales.
- k k Nervus *Quinti* Paris duram matrem fubeuns.
- l Ejus ramus tertius. ²⁶
- m Ramus secundus.
- n Ramus primus f. *ophthalmicus*.
- o Nervus *Quarti* paris.
- p Nervi *Tertii* paris truncus.
- q Septimentum quo nervus Quinti paris a Sexto separatur. ²⁷
- r Nervus sexti paris.
- s Origo nervi intercostalis. ²⁸
- t t *Septimi* paris ingressus in duram matrem.
- u u *Octavi* primae radices. ^{28*}
- x x *Secunda* radix *Octavi*.

y y Ner-

TVM & BOTTICHERVM sua exscripsisse manifestum est. Non perpetuum est, a plerisque omittitur, & obiter dicitur a WINSLOWO l. n. 233. In hoc cadavere venam meningeam ad plexum pterygoideum duxit, & in siccis capitibus non multis reperitur, quae apud me sunt.

²³ Mirabili flexu, ex osseo canale antrorsum adscendit, tunc antrorsum transversa pergit, paulum deorsum, inde sub processu clinoides anteriori occulta, introrsum adscendit, ultimoque flexu sursum paulumque antrorsum.

²⁴ Hanc dixi de orig. nerv. Interc. n. XII, & ad BOERH. CCXXXI. not. p. Ludere vidi ortu, ut posterius orta, daret etiam processui occipitis anteriori, & glandulae pituitariae, diversa a minoribus, ad infundibulum, glandulamque ramulis.

²⁵ Hanc VESALIUS cognitam habuit, & INGRASSIAS, & omnis antiquitas.

²⁶ Situm nervorum, per receptaculum, aut supra idem euntium, adeo facilem, non observatum fuisse in iconibus BIANCHI & VESSENII miror. Ille quidem T. XVII. f. 1.

extimum facit quartum, etiam anteriorem Quinto. Melius certe in BERRETTINI icone exhibentur. T. XXI. f. 2. & apud RIDLEYVM f. 2. Perpetuo intus & supra receptaculum Tertius est, paulo exterior Quartus, inferior magis & exterior Quintus, multo inferior autem & in alio strato, idemque interior Quinto Sextus.

²⁷ Imperfectum est, ut non male BIANCHVS l. c. p. 346. & concedit MORGAGNVS l. c. p. 29. firmiter interius, & qua parte nervus intercostalis oritur. Quintum omnino a sanguineo lacu sive vero receptaculo separat, extrorsum eundo vero paulatim in cellulosa fabricam mutatur, quae Sextum cum Ophthalmico connectit Conf. COMM. BOERH. ll. p. 361.

²⁸ Non ignoro non recte depingi, quasi extrorsum decederet a trunco, sed ratio optica non aliter passa est, angulum pene rectum exprimi, quem cum Sexto facit, retrorsum descendendo, Conf. diff. de nerv. interc. n. X.

^{28*} Est ramus Octavi Pharyngeus aut Lingualis, qui adeo a reliquo trunco distinctus est, ut pro peculiari nervo haberi possit. WINSLOW: III. n. III. Duas etiam radices RVYSCH. Thes. I. p. 12.

y y Nervus *novus*.

z Foramen medullae spinalis.

In oculo dextro.

postquam orbitae lacunar & magna pars ossis malae demolita est.

1 1 Arteria *Ophthalmica*. ²⁹

2 2 Ejus ramus exterior sive lacrumalis, comes nervi cognominis.

3 3 Surculus interior, qui nares petit.

4 4 Rami ad scleroticam, quorum aliqui Uveam adeunt. ³⁰

5 5 Reliquiae musculorum Levatorum palpebrae & oculi.

6 Finis Levatoris palpebrae.

7 Glandula *lacrumalis*.

8 Nervus *opticus*. ³¹

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 uti in altero oculo.

In oculo sinistro.

9 *Trochlea*. ³²

10 Musculus *Patheticus*.

11 Musculus *Levator* oculi.

12 Musculus oculi *Internus*.

13 *Abductor*, resectus. ³³

14 Ramus *Tertii paris superior*, ³⁴ ad Levatores oculi & palpebrae.

15 Trun-

²⁹ Hanc arteriam cum ramis suis nullibi descriptam invenio, & optimus WINSLOWVS, non recte certe, ejus ramos arteriae infraorbitali adscribit. Caeterum furculi hujus arteriae, ex ramo quidem externo per os malae ad genam eunt cum nervulis not. 44. tum gracillimus aliquis, RIDLEYO dictus, ad duram matrem, per extremam fissuram orbitae. A ramo vero interno ad palpebras, sacrum lacrumalem, tum deorsum ad nasum nasique musculos alii satis longe descendunt, sursum vero ad frontis partem non minimam.

³⁰ Arteriolae ciliares COMM. BOERH. DXVI. not. m. Serpentinum etiam ductum harum arteriarum expressit RVYSCHIVS in *epistolis* T. XVI. f. 6. 8.

³¹ Inflexum pinxi, qualem reperio, & paulum conplanatum, teres enim figura a nervis aliena est.

³² Haec nuper accurate contemplatus, scutulum esse invenio cartilagineum, hinc convexum, inde contra os frontis excavatum, ut per eum fulcum tendo Pathetici musculi inflecti queat.

³³ Eum musculum medium discindere oportet, ut ganglion ophthalmicum rite conspici possit.

³⁴ Remota orbita equidem primus adparet interior Tertius, deinde altior Quartus & exterior, & adhuc exterior ophthalmicus Quinti, inferior demum pariter ac exterior Sextus. Nervus opticus imus est, quod omnino observandum est in iconibus EVSTACHII interpretandis. Caeterum primus idoneus auctor hic FALLOPIVS est. Hunc secuti sunt VIDVS VIDIVS, CASPAR BAVHINVS p. 340. & WILLISIVS, & TAVVRY p. 214. & alii. Icon EVSTACHIANA Quarta Tabulae XVIII. totum repraesentat. Nervus ergo Tertius, incumbens optico perpetuo

- 15 Truncus reliquus 35
- 16 Ramus ad Obliquum inferiorem, *extimus*. 36
- 17 Ramus ad Rectum inferiorem, *medius*. 37
- 18 Ramus ad Rectum internum, *intimus*. 38
- 19 Ramus *ad Ganglion* Ophthalmicum. 39
- 20 Primi rami Quinti Paris ramus *superior*. 40
- 21 Ejusdem furculus *exterior*. 41
- 22 Et *interior*. 42

23 Pri-

petuo primum ramum dat levatori oculi; qui cum eo musculo aliquamdiu progressus, furculum edit in palpebrae levatorem. Hic *primus* est FALLOPII p. 138. b. VIEVSSENII p. 167. & ab EVSTACHIO pingitur f. 4. a WILLISIO p. 302. f. 2. b. & a WINSLOWO describitur III. n. 19. ILL. HEISTERVS duos diversos pro his musculis ramos facit, ad observationes a meis diversas *Comp. anat.* p. 162. quales etiam WINSLOWO obvenerunt l. c. n. 20.

35 Interior trunculus exterior nervo optico adjacet EVST. l. c. f. 1. ibique ramos sub nervum opticum mittit, & vel in tres ramos finditur, uti EVSTACHIVS habet l. c. f. 4. & tres etiam ramos facit WINSLOWVS n. 21. vel ramo dato ad interiorem musculum, trunci divisio proxime sequitur, ut maneat inferiori unus ramus, alter longissime ad obliquum excurrat. Ita CANT. T. IV. f. 2. & VIEVSSENS p. 167. & olim EVST. T. XVIII. f. 1.

36 EVSTACH. f. 1. 3. 4. FALLOPII *tertius*, WILLIS. l. c. ad f. WINSLOW. n. 21.

37 EVST. l. c. FALLOPII *secundus*, WILLIS. ad d. WINSLOW. n. 21.

38 EVST. l. c. FALLOPII l. c. *unus quidem*, WILLIS ad c. VIEVSSENS utrumque pro uno ramo habet. WINSLOW. n. 21.

39 FALLOPIVS olim fibrillas viderat p. 139. & plexum facere dixerat VIEVSSENIVS p. 167. ipseque EVSTACHIVS videtur filamenta pingere f. 3. l. c. A superiori ramo deducit PETITVS *Mem. de l'Acad.* 1727. p. 13. WINSLOWVS a ramulo obliqui inferioris l. c. quod etiam fieri vidi. Sed frequentius a trunculo inferiori venit, uti MORGAGNVS *Epist.* XVI. n. 59. vel ante datam ramum interni musculi, ut VIEVSSENIVS, vel eo edito. Caeterum apud plerosque anatomicos vetustiores obscura est hujus nervi notitia. Post egregiam enim FALLOPII descriptionem, tamen fere plerique VESALIVM secuti sunt, qui & omnibus oculi musculis prospicere, & in temporalem musculum furculos emittere dixerat. L. III. c. 5. uti prius IACOBVS CARPENSIS dixerat ex or-

bita egredi CCCCLVI. b. Hunc errorem ARCHANGELVS PICCOLHOMINEVS erravit p. 263. & inter recentiores BARTHOLINVS, BOVRDON p. 382. & alii. Inter nuperiores etiam Cl. VALSALVA ramum a Tertio ad externum oculi musculum depingit *Diff. Anat.* T. II. f. 2. Cl. vero NICHOLLS ramum ad internum angulum oculi ire dicit p. 42. quae omnia valde a naturae norma remota sunt.

40 Hunc iterum optime pinxit EVSTACHIVS, descripsit FALLOPIVS p. 141. b. WILLISIVS brutis usus est. Porro VERHEYENIO nunquam visum fuisse, satis adparet ex descriptione p. 381. In ipso nempe receptaculo finditur Ophthalmicus WILLISII, in tres ramos, fere eodem loco prodeuntes, superiorem, inferiorem, exteriorem, WINSLOW. III. n. 34. Aliquando tamen aliquis eorum prius a trunco secedit, quam reliqui *Superior* & major sub periosteo orbitae proxime super levatores musculos ad anteriora exit, in tota longitudine fissus & duplex. Ita EVSTACHIVS T. XVIII. f. 3. 5. & in primis in f. 5. quam huic nervo destinavit. VIEVSSENII icon non optima est T. 22. d. cui est *minoris superioris primus* p. 170. Ad Levatorem palpebrae fibrillas dare vidit WINSLOWVS n. 35. mihi ignotas, idemque non bene unicum facit.

41 Ramus exterior, insignior altero, per foramen finumve in margine orbitae, adscendit ex orbita, & ad musculum corrugatorem ramulos dat, & per orbicularem transversim palpebras sequendo, demumque inter cutem & frontalem longius versus incipit retrorsum. Hunc EVSTACHIVS habet l. c. f. 3. 5. & T. XIX. VIEVSSENIVS pro trunculo rami d. describit, a quo perpetuo diversus est, uti contra WINSLOWVM monui.

42 Minor iste, etiam ex orbita brevior prodit, per alium sulcum ossis frontis, & aliquando per canalem FALLOP. p. 142. Tunc uno ramo in corrugatorem & frontalem, alio in orbicularem, & carunculam dividitur EVST. l. c. VIEVSSENS l. c. & iconem dat e, pro furculo rami d. M 2

- 23 Primi rami Quinti Paris ramus *Exterior*. 43
 24 Ramuli ad faciem exeuntes per foramina offis malae. 44
 25 Ramuli ad glandulam Lacrumalem. 45
 26 Primi rami Quinti Paris, ramus *inferior*. 46
 27 Ejusdem furculus *ad Ganglion*. 47
 28 Ramulus ad *Nares*. 48
 29 Trunculus antrorsum erepens. 49
 30 Ganglion *Ophthalmicum*. 50
 31 Nervuli *Ciliares*. 51
 7. 8. uti in dextro oculo.

43 Perpetuus est, sed difficilior. EVSTACHII & FALLOPII industriam fugit, a VIEVSSENIO additus, tertii nomine, minimus inter ramos. A Quinto, proxime sub periosteo orbitae, per ejus oram externam supra abducen-tem musculum antrorsum abit. VIEVSSENS p. 170. T. 22. p. WINSLOW. n. 42. qui varietates in origine refert.

44 Modo unum, modo duos ramos ad musculum temporalem & masseterem mittit. Hos, ignotos VIEVSSENIO, WINSLOWVS habet, n. 43.

45 Haec filamenta inter scleroticam & glandulam pergunt, & partim glandulae dant, partim in palpebram evanescunt. Valde metuo, ne hi ipsi nervuli a multis pro ductibus lacrumalibus sint habiti.

46 Hic vicinus & interior Tertio supra opticum nervum, sub musculis levatoribus & externo, oblique introrsum properat, accedit ad patheticum, tuncque finditur in ramum 28. & trunculum 29. ab EVSTACHIO pingitur f. 5. 3. & I. VIEVSSENIO *secundus ramulus* est p. 170. & I. c. f. tum *secundi propago crassior k.* Ramulum ad scleroticam describit idem, mihi ignotum.

47 Fibrillarum ad uveam nomine notus FALLOPIO p. 141. b. WILLISIO uveam etiam adire, VIEVSSENIO vero cum tertii ramulis in plexum abire dicitur *b.* inde ramos ad scleroticam dari, alias ad musculum internum & inferiorem p. 170. TAUVRYS VIEVSSENIVM sequitur p. 217. 218. Sed omnino ganglion adit, non ramosus & minutissimus, longe minor socio ramo Tertii. A ramo inferiori oritur, WINSLOW. n. 38. S. YVES *mal. des yeux* p. 21. MORGAGNO videtur ignotus fuisse ex *Epist.* VI. n. 59. WINSLOWVS vidit a trunco Ophthalmici oriri I. c. n. 38.


48 Hic sub pathetico transversus pergit introrsum & vel eodem, vel certe vicino ostio-
 lo, cum arteriola duram matrem subit, adparet in cranii cavea, sub dura matre, ad latus cristae galli, petit anteriora, & ad nares demum per

foraminum cribrosum aliquod ex postremis descendit. Haec egregie vidit FALLOPIVS p. 142. in eo vero erravit, quod utrumque ramum 28. & 29. nares adire putaverit. EVSTACHIVS eum inflexa figura expressit I. c. WILLISIVS pingit p. 302. f. 2. h. & describit, p. 154. VIEVSSENIVS *secundum ramulum propaginis interioris vocat*, ad M. CHESELDENIVS eundem nervum habet in ed. 1741. anatomes suae p. 232. & WINSLOWVS n. 41. & MORGAGNVS *Epist.* XVI. n. 56. 57.

49 Sequitur Patheticum, transit sub trochlea, abit ad palpebram superiorem, corrugatorem, carunculam, partesque vicinas nasi WINSLOW. n. 40. PALFYN. *Anat. Chir.* p. 329. S. YVES I. c. VIEVSSENIVS duos trunculos facit, p. 170. unum *tertium n.* ad adnatam & musculos palpebrarum, quartum *n.* ad palpebram & orbicularem o. Verum truncus longe unicus est, & versus trochleam demum rami oriuntur. EVSTACHIVS rectum pingit I. c. f. 5. 3. & 1.

50 Ganglion a WILLISIO *plexus rotundi* nomine dicitur, ex quo furculi ad nervum opticum eant, p. 302. f. 2. & p. 151. deinde a Cl. SCHACHERO *diff. de catar.* p. 9. breviter sed perspicue, & a PALFYNIO *Anat. Chir.* II. p. 328. & S. YVES I. c. & a PETITO dictum *Mem. de l'Acad.* a. 1727. Oblongum, ad exteriora nervi optici, sub musculo abductore, insidet divisioni ramorum inferiorum Tertii, uti recte WILLISIVS, perpetuum, ex Quinto & Tertio pare conjunctum & ab eo omnes ciliares nervuli oriuntur. MORGAGNVS I. c. & WILLISIVS hoc Ganglion unice Tertio pari adtribuunt. A sexto pare aliquid accedere ait PETITVS, quod quidem mihi nondum contigit videre.

51 Trunculi exigui, a Ganglio orri sub nervo optico & super eundem, pergunt absque ramis, ad scleroticam, EVSTACHIVS aliquos a Quinto exhibere videtur in f. 3. 5. WILLISIVS pingit ad g. sed Quinto tribuit idem, uti VIEVSSENIVS p. 270. T. 22. *b.* Meliora PETITVS habet & WINSLOWVS, & quos superius excitavi.



C. J. Rollius M.D. del: ad nat.

G. D. Heumann Grav. de la Cour de S. M. Brit: & 2^e Univ: de Göttingen.

ICONVM ANATOMICARVM
PARTIVM
CORPORIS HVMANI
FASCICVLVS II.

Arteria Maxillaris, Coeliacae T. I. & II.
Thyreoidea inferioris T. I. & II. Uterus,

AVCTORE

ALBERTO HALLER

PHIL. ET MED. D. MEDIC. ANAT. BOT. CHIR. P. P. O.

ARCHIATRO ET CONSIL. AVL. REGIO ET ELECTOR.

SOC. REGG. ANGL. ET SVEC. SOD.



G.D. Heumann Grav. de la Cour de S.M. Brit. et de l'Univ. de Göttingen

GOTTINGAE,
TYPIS ABRAMI VANDENHOECK, ACAD. TYPOGR.

MDCCXLV.

THE UNIVERSITY OF
THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 21, 1890
REPORT

OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
JANUARY 18, 1889

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO. PRINTERS.
1890.



NEW YORK:
J. B. LIPPINCOTT & CO. PRINTERS.
1890.

ILLUSTRI VIRO
MEDICO SAPIENTISSIMO ET FELICISSIMO
D. PAVLO GOTTLIEB
WERLHOF

R. M. BRIT. ET ELECT. BRUNSVIC. LUN. ARCHIATRO
SOCC. IMPER. ET BRIT. SOD.

D. D. D.

TYPOGRAPHVS.

Novam iconum anatomicarum collectionem celeberrimo Tuo nomini inscribere jubet, iusta, qua Tuas virtutes colo, veneratio. Ut enim simplicis vitae & literarum exfors homo sim, habent tamen animi Tui dotes eam vim, ut nemo sit, qui non eas sentiat, Teque aut amet, aut revereatur. Philanthropia Tua, & felicitatis alienae desiderium, & ingeniosa in publica & privata commoda humanitas, ita sunt notae omnibus, ita ex ipso vultu Tuo, exque singulis vocibus conspicuae elucent, ut non magis ingenii Tui summam vim & felicitatem admirari, quam excelsum, & beneficum animum amplecti, ut ea voce utar, & exosculari, suavi necessitate cogamur. Quare has schedas, in quibus ornandis nullas certe partes deserui, Nomini & illustri & amabili inscripturus, quodnam aliud potui praefigere quam WERLHOFII!

D. ALBERTI HALLER

ANAT. P. P. O.

ICON ARTERIAE
MAXILLARIS

LECTORI S.

Arteriam maxillarem internam primum ad ultimos surculos usque persecutus sum in cadavere militis, ultimo supplicio adfecti, anno 1738. Mense Februario. Ejusdem anni Martio mense Cl. I. G. GVNZIVS pro gradu, ut vocant, disputavit, inde in Galliam iter fecit, & apud solertissimum virum I. E. BERTINVM anatomen docentem, vidit accuratam dissectionem ejusdem arteriae. Hoc ita se habere, manifestissimis ipsius BERTINI testimoniis confirmare possum. Ego interim a. 1742. mense augusto descripsi ramos memoria dignos Maxillaris arteriae omnes, in commentario Boerhaviano, qui, ob gravissimum morbum meum, sequentis anni M. Martio ex prelo prodiit T. IV. p. 51. prius vero anno 1740. brevem enumerationem ramorum in hoc ipso commentario dederam (Tom. II. n. 231, not. h. Deinde aestate anni 1743. Cl. GVNZIVS suas & BERTINI observationes edidit. Neque enim docti viri nullas partes fuisse dixero, sed unice desidero, non satis manifesto eum agnovisse, quanta pars descriptionis ad BERTINVM, tunc toto orbe remotum, spectaret. Inde enata ae-

*

mu.

mulatione, cum frustra literis animum Cl. Viri inflectere tentassem, usus libertate anonymarum schedarum ea verba in me effudit IDEM, quae me tunc male habuerunt, cum primum legerem, nunc vero video ipsi Cl. GUNZIO non posse non etiam magis molesta esse, quam mihi unquam fuerunt. Talia enim scripsit, qualia ipse credere non potest. Ita omissam mihi exprobrat omenti a duodeno originem, quae nulla in corpore humano est; transpositum in sinistrum latus initium coli intestini, quod nullibi in icone mea vel adumbratur: male depictum iter nervi intercostalis, quod ipse in explicatione ejus iconis monueram non secundum naturam pictum esse, neque tamen ob rationes opticas aliter pingi potuisse. Sed post hanc acerbitatem eo magis mihi laborandum esse putavi, ne ullam mihi permitterem voculam, quae iras proderet, aut occasione uterer carpendi. Ita visum est demonstrare Claro Viro, quam immerentem provocaverit. Meas tamen observationes de eadem arteria edere non dubitavi, ut sentiret IPSE, non defuisse etiam mihi aut occasionem videndi, aut voluntatem. Publicae etiam utilitati credidi hanc aemulationem inservire posse, ea enim extra dubium vera visura esse omnibus, quae ab viris adeo non ex compacto scribentibus, consona dicerentur. Decerpsi adeo hanc partem angiologiae, in qua laboro, sumtam ex viginti quatuor cadaveribus sollicite dissectis. Iconem addidi, quae mihi non undique placeret, sed tamen sermonem utcunque dirigeret. Duas enim, & tres forte in tanta stratorum diversitate icones praestiterat parasse, & olim parabo. Sequentur reliqui arteriae carotidis rami, uti sensim mihi ipsi in eorum historia satisfecero. D. VIII. Febr. 1745.

EXPLICATIO LITERARVM.

- A. Aorta.
- B. Subclavia arteria dextra.
- C. C. Carotides.
- D. Carotis vulgo interna.
- E. Carotis vulgo externa. *a)*
- F. Thyreoidea superior *b)* loco mota, & deorsum tracta.

G. Ca.

a) Quoties aliqua Carotidis externae longitudo est inter suam & Thyreoideae superioris originem, toties Carotis externa magnitudine superat internam. Ita saepe, & repetito video. Perpetuo vero, quae externa dicitur, interna vere est, uti recte observat CANTIVS *Im- pet. Anat. T. I. f. 2.*

b) Hujus arteriae omnino addenda est descriptio, magnae certe, recte observante Cl. PETSCHÉ *obs. anat. syll. n. 39.* tum in fetu, tum in adultis cadaveribus, & saepe nihilo minoris, quam carotis interna, ut etiam majorem inveniam, quam Cl. GVNZIVS fecit p. 13. Haec ergo arteria a carotide externa, proxime ab ejus ortu, nonnunquam ita proxime oritur, ut tres rami Carotidis esse videri possit: confer Cl. GVNZIVM p. 12. qui similia vidit. Inde flexuose descendit trunco suo, ad superiorem, externamque partem cognominis glandulae, perque eam undique ramosa finitur. Solent autem trunci dexter & sinister ad se invicem se inclinare; saepe etiam alii superficiales reperiri, alii profundi, a quibus & oesophagus habet, & aspera arteria, deinde rami exigui cum Thyreoidea inferiori communicare. Rarius autem paulo furculi, qui appendici glandulae prospiciunt, coeunt cum hyoideo ramo arteriae Lingualis. Ramos ergo, praeter thyreoideae glandulae proprios, ad alias partes emittit, fere quos dicam. Primo loco superficiei furculum supra os hyoides, & ad musculum hyothyreoideum non raro euntem, qui arcum facit cum compare, & anastomoses etiam cum aliis ramis trunci habet. Alias etiam ad membranaeum spatium inter os hyoides, & scutiformem cartilaginem furculos dat. Alias ad cutem, musculumque cutaneum versus mentum ramos edit. Sed hic ramus non rarissime deficit. Alter ramus descendit ad Hyothyreoideum, conjunctus saepe intermedio ramo cum aliquo trunci ejusdem ramo inferius orto; idemque ad cutaneum colli furculum dat, alio vero ramo ad sternomastoideum descendit, alio ad imam cartilaginem thyreoideam ad hyo- & cricothyreoideos abit, conjunctus aliquando priori per ramum intermedium: aut cum socio transversum arcum super cricothyreoideum facit. Alias etiam ad sternothyreoideum, & azygon, & frequenter ad thyreopharyngaeum longus ramus abit, etiam Cl. GVNZIO visus p. 13. Vidi etiam ramum prae- longum cum jugulari vena ad claviculam descendisse, & ibi se inferuisse in inferioris thyreoideae ramo superficiali. Vidi, neque raro, notabilem ramum ad pharyngem descendisse. Sed tertius, perpetuus ramus Laryngeus est, qui cum nervo octavi paris, super originem musculi thyreopharyngaei, inter cartilagines cricoideam & thyreoideam se immergit: alias autem, sed rarius, per foramen cartilaginis thyreoideae subit. Descendit in hujus & anularis cartilaginis intervallum: & subito aliquot ramos emittit; unum adscendentem, in dorsum epiglottidis & vicinas membranas inter os hyoides & laryngem: alterum transversum in aryarytaenoides, & cricoarytaenoideum posteriorem, in quo musculo cum adscendentis thyreoideae ramulis frequentibus furculis inosculatur. Hic ultimus ramus alias distinctus est, ab eo, qui faciei posteriori guttatum cartilaginum & aryarytaenoideo musculo prospicit. Alium dat deorsum ad thyreoarytaenoideum & cricoarytaenoideum lateralem & posticum & cricothyreoideum, qui nonnunquam, cum eo musculo ad anteriora redit, & ante inum laryngem apparet. Truncus profundus, in ventriculum, super ligamentum inferius ramum dat, & ad faciem anteriorem laryngis in membranam muciferam. Haec tota Laryngea, nonnunquam supra Thyreoideam proprio trunco a carotide externa oritur. Reliquorum vero quos recensui, ramorum, aliqui nonnunquam desunt, plures non vidi. WINSLOWVS in L. III. *de Arteriis* n. 52. brevissime totam arteriam tradit. FALLOPIVS duplici trunco ortam describit *observ. p. 132.* CANTIVS originem bene expressit, nihil ultra T. I. f. 2. Cl. GVNZIVS brevius describit, tum alius, nuperus auctor.

- G. Carotidis internae flexiones extra cranium. *c)*
- H. Ejusdem curvatura intra os petrosum. *d)*
- I. Sectio ejus, ubi perforata dura membrana cerebrum adit.
- K. Arteria lingualis obiter indicata. *e)*
- L. Arteria facialis obiter expressa.
- M. Ramus ejus palatinus. *f)*
- N. Ramuli ad uvulam.
- O. Ramuli, non perpetui, ad postremam partem palati ossei.
- P. Rami superficialis linguae, qui ad mentum & labium inferius eunt.
- Q. Arteriae infraorbitalis anastomosis cum Alveolari a Maxillari interna. *g)*
- R. Arteria temporalis.
- S. Arteria occipitalis *h)*
- T. Auriculares.
- V. Arteriae temporalis ramus interior. *i)*
- Y. Ejusdem ramus exterior.
- Z. Ramus auricularis.
- a.* Ramus ad masseterem & temporalem musculos *k)*
- β.* Trun-

c) COWPER apud DRAKE T. XX. n. 13. 13. Caeterum modo acutioribus, modo amplioribus angulis flectitur.

d) Perpetua haec, & parum variabilis, primum sursum, tunc antrorsum migrat. In eo itinere tres vidiramulos dedisse carotidem, ad ductum pterygoideum & tubae cartilagineae, ad eandem cartilagineam, & in canalem nervi duri arteriolam, quae ex hiatu ossis petrosi ad duram matrem exivit. Hanc forte VALSALVA dixit, ut credo c. II. n. 22. sed non perpetua est. An aliquis horum ramorum forte est, quem pro ramo nervi Intercoastalis ad pharyngem eunte habuit D. LIEVTAUD p. 437?

e) Hanc, & angularem suo loco dicam, propriis expressas iconibus.

f) Pene perpetuus est, & major inter duos ramos, quos facialis arteria edit, dum secundum maxillae inferioris marginem, per glandulae maxillaris sulcum repit. Tonsillas & palatum mobile, & ipsam uvulam adit. Vidi palatinam seorsim, sed proximam, a trunco externae carotidis ortam fuisse. Vidi etiam, cum minor esset, pharyngeam adscendentem ejus locum obtinuisse.

g) Hanc anastomosin multiplicem reperi. Vidi ramum illum comitem buccinatoris (*s*), insigni anastomosi cum infraorbitalis ramulis convenisse; Vidi eandem communicasse mutuis ramis cum arteriae facialis furculis.

h) Vide hujus historiam breviter recensitam in descriptione Thyreoideae inferioris.

i) Quae in frontem exporrecta coit cum ophthalmicae ramis.

k) In hoc & in nupero cadavere hic ramus defuit, caeterum pene perpetuus, quem maxillaris interna arteria alias emittere solet, postquam ante pterygoideum externum, retro maxillam, transversa fere introrsum migravit, in angulo, ubi incipit adscendere. Alias exprimis ejus arteriae ramis est, ad latus externum Externi Pterygoidei, frequentius vero temporalis profundae primae. Transversa est, ante tendinem temporalis & processum coronoideum decurrit, Temporalis imo, tendini ejus, & proximo Masseteri interno prospicit, transversim inter duos masseteres delata, tum deorsum. Ramulos etiam cum temporali sursum emittit, & nonnunquam dat Pterygoideo externo ramum descendentem.

β. Truncus Maxillaris internae. l)

γ. Ramus Meningeus. m)

Ra-

l) WINSLOWI l.c. n. 58. tum D. LIEUTAUD, D. VERDIER, BOVDON in PALSINI anat. Chir. II. p. 242. (quorum corruptissima descriptio est, cum totidem truncos fere faciant, quot rami sunt), & Cl. GUNZII EVSTACHIO nota fuit, ut apparet ex resecta origine T. XXIV. inter 13. & n. edit. Albinianae, sed a nemine, nisi fallor, ante nostra tempora pro dignitate descripta. Haec arteria temporali plerumque major est, ut pro trunco habeat Cl. GUNZIVS p. 16. 17. cujus temporalis arteria ramus sit. Verum directio carotidis externae repugnat, continuata temporali. Oritur ex trunco carotidis externae super ligamentum descriptum a Cl. WEITBRECHT *syndesmol.* p. 82. T. 8. f. 32. lit. i. quod sub condylo maxillae incipit, & ad angulum usque descendit, supra & juxta pterygoideum internum, atque inferius, quam articulatio maxillae inseritur. Ergo ad mediam fere altitudinem rami maxillae inferioris, prodit nostra arteria, & introrsum, paulum deorsum, se recondit, pone maxillam, ante pterygoideum externum. Post sex lineas mutata directione adscendit, pene ad jugum usque. Tunc magis oblique sursum & antrorsum secundum alae externae medium fertur, donec ad oram ossis maxillae superioris veniat, ubi ima pars est fissurae sphenomaxillaris, & propria spinula ex osse sphenoides eminet. Inde miris saepe flexionibus adscendit antrorsum in fissura sphenomaxillari, eo magis semper abscondita, quo superior, ad usque fissurae orbitariae inferioris partem posteriorem. In origine vero infraorbitalis arteriae, quae origo est sub initio sulci hujus arteriae, maxillaris mutat directionem, & introrsum per semunciam flectitur, tunc vero subito in tres quatuorve ramos consumitur. Haec contuli cum Cl. GUNZII descriptione p. 18. & in universum convenire video. Quomodo vero Cl. LIEUTAUD hanc arteriam descendere viderit p. 479. ego non video. Nunc ramos quos vidi, enumero. Auricularem omitto sive temporalem posteriorem, quae solet propago esse temporalis arteriae, semel omnino visa a maxillari oriri. Hac omissa, ramus primus arteriae maxillaris, etiam non perpetuus, est auricularis profunda. Eam vidi contra ossa nuda adscendere ad posteriora meatus auditorii, inque ejus membranas & glandulas distribui. Alias a temporali venit. Alter, itidem ortus ex principio hujus arteriae, est *tympanica*, quae partim in pinguedinem distribuitur, quae ibi ad exteriora maxillae inferioris et plurima est, uno vero furculo per fissuram, quae inter articulationem maxillae inferioris meatus auditorium est, ad musculus anteriorem mallei subit. Nondum ausim perpetuum dicere, descripsi tamen qualem vidi. Tertius, sed frequens, est, qui parallelus fere & prior meningeo, sursum inter alam & musculus circumflexum rubae se abscondit, et furculum dat, qui secundum alam externam descendit, & utrique prospicit pterygoideo musculo, alium vero ad tubae musculos. Ipse trunculus, saepe non minimus, cum nervo tertio Quinti paris, & vena perpetua ad duram matrem venit, & receptaculum, innervum Quintum, duramque matrem absumpit. Vidi ramulum a Carotidis internae ramo, quem voco arteriam receptaculi *ic. bas. cran. e.* exiisse cum nervo tertio Quinti, inosculatum arteriolae ab hac, quam hic dicimus, arteria profectae. Caeterum arteriam a maxillari, quam descripsi, breviter habet WINSLOW l. c. n. 58. uberius Cl. GUNZ p. 23. in fine, & aliquando seorsim vidit ortam, uti & mihi contigit, Eadem a meningeae, fere ex dimidia longitudine, longe frequentius oritur.

m) Meningea, recte a FALLOPIO descripta & VIDEO p. 133. p. 137. obiter a COLUMBO p. 184. detertius a VESALIO, qui pro propagine internae carotidis descripsit L. III. p. 489. & venae, ni fallor nomine p. 467. & L. I. p. 64. constans & princeps arteria durae matris, ex maxillari adscendit, paucis post lineis, quam ipsa orta est, & nonnunquam ex ipso principio, ut a Temporalis orta videri possit, uti CANTIVS voluisse videtur l. c. & WINSLOW n. 64. & RAVIVS apud VALENTINUM *Zootom.* L. II. p. 102. *append.* & CHESELDEN p. 185. Eadem, prius quam cranium subeat, ambitur duobus ramis nervi tertii Quinti, qui iidem cum Duro communicant. Saepissime ramos, prius, quam cranium subeat, exhibet, qui repentes per partem sphenoidis ossis, commissam hinc squamoso ossi, inde alis vespertilionis, in musculus pterygoideum externum absumpit, ubi supra alas ab ossis cuneiformi modo dicta regione oritur, ramulos tamen aliquos dant, qui minutissimis foraminulis perforant os cuneiforme, duramque matrem numerosi adeunt. Eos dixisse videri potest DIEMERBROECKIUS *Anat.* L. VI. p. 477. cujus *interior ramus* maxillaris est. Plerumque meningea fere media ramum dedit supra notatum, ad l, a quo etiam tubae musculi habent, trunco parallelum: alias furculum in non perpetuos canales ossis multiformis versus alam externam misit. Vidi etiam meningeam nullum ramum dedisse prius, quam cranium subiret. Caeterum haec arteria, longe plerumque uno, aliquando tamen duobus, & vicinis foraminibus, quorum anterius minus est, cranium subit: ut olim vidit VESALIUS p. 64. Sed etiam D. de MAR-

- d. Ramus *Maxillaris inferior*. n)
- e. Ramus meningeae pterygoideus. o)
- f. Rami duo *pterygoidei* Maxillaris. p)
- g. Ramus *temporalis profundus exterior*. q)
- h. Ramus *temporalis profundus interior*. r)

θ. Ra-

CHETTIS p. 107. & PALFYN. *anat. Chir.* ed. nov. II. p. 57. duo foramina habent, & alii Vide etiam *expos. icon. bas. cran.* Inde, uti notissimum est, durae Matri cerebrum tegenti secundum convexitatem ejus ad sinum falciformem usque, undique prospicit, in cranii vero basi inprimis fossae mediae, tum anteriori cerebri. Vidi aliquoties ramum meningeae, vel duos, intra cranii ortos, per foramen alae magnae pterygoideae, duove foramina, proxime extremam alam parvam & glandulam lacrumalem subiisse, ossique praeterea dedisse malari, ubi crassissimum orbitam terminat. Hunc ramum describere videtur RAVIVS l. c. Venam vero durae matris comitem arteriae meningeae perpetuam reperio, quam etiam Cl. GVNZIVS habet p. 20. & dudum descripti in COMM. BOERH. T. II. Caeterum foramen, quod descripti in basi cranii ad lit. c. non quidem perpetuum, sed verum foramen, neque rimae simile est, ut visum Cl. GVNZIO p. 20. Denique ab eadem meningeae intra cranium oriuntur tum rami tres, quatuorve, qui per intervallum partis squamosae & petrosae in os petrosum descendunt dicti DUVVERNEYO de l'oreille p. 13. tum, continuo, quando in cranium prodiit, duae arteriae, quarum superior per fissuram propriam ingreditur aquaeductum, uti nunc coram video, & habet solertissimus CASSEBOHMIUS. n. 105. inferior musculum internum mallei & tympanum adit. Posteriori autem fossae cerebelli plerumque ramus ab occipitali, aut a pharyngea est, praeter minores eos, quos vertebralis & occipitalis per magnum foramen inmittunt, aliosque, quos per vaga foraminula ossis occipitis arteria hujus nominis durae matri dat.

n) *Maxillaris inferior* a COLVMBEO detecta p. 181. non maxima, FALLOPIO dicta p. 132. b. sex & octo lineis a trunci ortu egreditur. Descendit antrosum cum nervo, & furculo fat magno dato introrsum ad pterygoideum internum, quem comitatur nervus a linguali, dicto Cl. GVNZIO p. 25. tota in canalem osseum abit, plerumque communi cum nervo foramine, alias proprio. Hunc canalem in junioribus corporibus effregi, & reperi sublegisse dentium trium molarium radices, dedisse in singulos alveolos, dentiumque imperfectorum folliculos ramum unum, duosque, quorum postremus maximus est, omnes vero per folliculum dentis reti faciunt. Ad molarem primum finditur arteria, & ramo uno cum mentali nervo ad faciem exit (COLVMBEVS l. c. LIEVTAUD. p. 480.) sed perexiguus, inosculato ramulis facialis arteriae, uti recte habet WINSLOW n. 62. Altero ramulo porro sub radicibus dentium incisorum adscendit ad symphysem usque, datque & incisori- bus, & ad ipsam ossis diploen. Vena proprium canalem habet, inferiorem arterioso.

o) Modo descriptus in not. m.

p) Ramuli Pterygoideis musculis & maxime externo ex toto itinere transverso arteriae accedunt, superficiales alii, alii profundi. Magnum vidi introrsum descendisse ad utrumque musculum, vidi trans alam externam ad solum internum, alium parvum ad alam & musculum exteriores ivisse; alias exiguum ex principio arteriae venisse. Semper aliqui sunt, numerus & locus incertus est. Unum facit Cl. GVNZ. p. 26. & minores alios addit p. 30.

q) Hic & alter perpetui sunt. Oritur autem prior infra eam sedem, in qua arteria jugum contingit. Inde cum temporali musculo adscendens, ante pterygoideum externum, venit in temporum partem, in qua eminet margo ossis squamosi, conjuncti cum alis magnis ossis cuneiformis. Absumitur in carnem temporalis musculi, & pericranium, sed etiam masseteri dat, & fere semper Externo pterygoideo. Hoc fere loco etiam *superficialis* oriri solet, not. k. et ea non raro hujus temporalis ramus est. Vidi etiam tres fuisse temporales, medianque praeter eas, quas descripti, minorem.

r) Hic fere oritur absoluto transverso itinere ad eam sedem, ubi finui Highmori maxillaris arteria se adaptat. Parallela priori adscendit, tecta jugo, per fossam temporalem, quam facit os malae, commissum multiformi. Finis, qualis priori. Ab ea fere perpetuo ramulos vidi perforasse os malae, & adiisse periosteum & pinguedinem orbitae, & saepe lacrumalem glandulam. Caeterum duas etiam temporales habet EVSTACHIUS T. XXIV. XXV. & Cl. GVNZ. p. 27. & ramum, qui os jugi perforat p. 29.

- 0. Ramus *buccalis*, comes buccinatoris muscoli. s)
- 1. Ramus *alveolaris*. (t)
- 2. Ramus *infraorbitalis*. u)

μ. Ra.

s) Ex majoribus ramis, aut truncus ipse alveolaris est. Nonnunquam tamen proprio trunco provenit, alias a temporali profunda, aut ab infraorbitali oritur. Cum nervo erepit transversus, dat musculo buccinatori, & nonnunquam zygomatico, levatori proprio labii superioris, & levatori communi, oris demum membranae. Cl. GVNZIVS brevissime recenset p. 30.

t) Non minima, & maxillari inferiori aequalis, perpetua, eleganter fere semper serpentina, per gingivas, carnibusque nudas partes ossis maxillae superioris, repit in faciem, & buccinatorem imprimis, & pinguedinem, quae malae rotunditatem facit, & cavam partem ossis malae, hujusque periosteum, & gingivas, quibus frequentes ramulos edit. Dat etiam furculos, sed incredibili parvitate, subeuntes dentes incisivos. Vidi etiam per propria foraminula, in sceletis non rara, dedisse finui HIGHMORI ejusque membranae. Hic ramus nonnunquam ab infraorbitali oritur, & plerumque unus est hujus alveolaris & ejus arteriae truncus, quae buccinatorem comitatur not. s. Ab alveolari vero, in eo angulo obtuso, quem facit ossis maxillae maxima convexitas respondens finui, cum fossa temporali commissa, oritur arteria *dentalis maxillae superioris*. Eam dentalem in junioribus prosecutus sum. Reperi uno ramo magno in gingivas abiisse, alio subiisse fossam communem, quae in pueris tres dentes molares continet, his dedisse, tunc exiisse ex hac fossa, & per ipsam ossis crassitiem in proprio canali iter fecisse, ramulosque per subtiles dedisse incisforibus, anastomosi vero coivisse, ubi ex fovea molarium prodibat, cum ramulo arteriae palatinae. In adultioribus sulcum proprium habet, super radices dentium incisforiorum, sub sinu highmori transversim incedentem. Non raro idem truncus dentalis arteriae ramos dat Highmorianis finui. Caeterum dentalem breviter habet Cl. GVNZ. p. 31. & ibidem Highmorianas, alveolarem vero etiam COLVMBVS p. 184.

u) Perpetua eadem, oritur aliquando communi radice cum ramo Alveolari, sub parte postrema fossae orbitariae, & sub sulco, qui ducit in canalem infraorbitalem. Inde flexuosa per semicanalem ossis maxillaris repit, deinde per canalem integrum exit ad faciem non minima. Ibi prospicere solet levatori communi labiorum, levatori superioris labii, imaeque parti nasi, & anastomosi plerumque convenire & cum ophthalmicae ramo nasali, & cum magna faciali, & cum arteria comite buccinatoris. Vidi peculiari foramine alium ramulum infraorbitalis arteriae perforasse os maxillae superioris, superius & interius, & levatorem labii superioris adivisse. Ramulos autem, priusquam subeat orbitam, emittit constanter quidem aliquos ad duram matrem orbitae, & pinguedinem oculo circumpositam: ex ipso vero canalis introitu, vel ex canali, alium, cujus furculi extimi etiam ad orbicularem inferiorem veniunt, alii transversi obliquum inferiorem, faccumque nasalem & cum eo nares ipsas adeunt. In eodem angulo interno communicat idem cum ramo ophthalmicae. Alii, fere duo, rami infraorbitalis ex ipso canali ad sinum highmori per propria foramina descendunt, membranamque hujus sinus superiorem suis pingunt ramulis (WINSL. 612.). In hac arteria nobiscum consentit Cl. GVNZ. p. 32. Aliquando etiam infraorbitalis cum ramo secundo Quinti furculum dat retrorsum in duram Matrem replentem fissuram orbitariam inferiorem, & sphenomaxillarem, & in receptaculum, quem ramum vidi alias a trunco maxillaris super orbitalem prodiisse. Ita vicissim cum ramo secundo quinti ramum a Carotide interna, ejusque ramo, quem depinxi *ic. bas. cran. e.* vidi ex cranio venisse. Alicujus vero momenti arteriam duram matrem adiisse, nunquam vidi, qualem describit WINSLOW T. III. n. 60. T. IV. n. 26. & LIEVTAVD. p. 480. & SYLVA *de la saignée* p. 211. 343. & PALFYN *anat. Chir.* ed. ult. II. p. 57. & GARENGEOT. *splanchnol.* II. p. 216. & alii. Consentit vero mecum Cl. GVNZ. p. 31. 33. Quam autem VIEVSSENIUS arteriam eodem loco pingit p. 31. & T. XVII. *lit.* X. X. & repetit RIDLEY p. 21. fig. 2. *b. b.* eam Carotidi internae tribuunt, in foramine petroso haerenti. Sed ego RIDLEYVM ramum ab ophthalmicae nasali ramo pingere crediderim. VIEVSSENIUS autem aliquid peculiare vidit, majorem forte arteria receptaculi. Ita neque unquam hanc nostram infraorbitalem vidi dedisse arterias oculares, quod excidit WINSLOWO T. IV. *de la tete* n. 295. 296. & D. LIEVTAVD. p. 480. & primum observavi in BOERHAAVIUM T. IV. p. 95. deinde Cl. GVNZ. p. 33. Sed olim ophthalmicam verius notam habuit COLVMBVS p. 184.

- μ. Ramus *palatinus*. y)
- ν. Ramus *pharyngeus supremus*. z)
- ξ. Ramulus *ductus pterygoidei*. aa)
- ρ. *Nasales arteriae*.
- ς. Ramuli ad *periostea fissurae orbitariae*. bb)

τ. Ar-

y) *Palatina superior*, & ab ortu mihi dicta, & a coeli palatini altitudine, quo mobile palatum superat, vix nisi nominatur a COLVMBIO p. 134. Ea ex trunco provenit paulo inferius, quam is finitur. Simplici aliquando trunculo, sed cito fisso, alias & saepe duplici, alias triplici provenit. Inde per canalem pterygopalatinum descendit. Truncus posterior paulum retrorsum inclinatus, venit in partem ultimam palati ossei, & finitimam palati mobilis, glandulasque & membranas ejus. Plures etiam vidi fuisse, per plures canaliculos perforantes pyramidem ossis palati. Anterior, major, per foramen palatinum anterius in palatum osseum procedit, antrorsum migrat sub dentibus, mirumque facit rete sub osse maxillari, cui innumeros dat furculos, tum alios pulposae substantiae palati. Ab eo ramo oriri vidi arteriam exiguum, quae cum membranea propagine per ductum incisivum ad nares adscendit. Brevissime has palatinas memorat WINSLOW n. 59. uberius GUNZIUS p. 39.

z) Hic ramus, nisi minor esset, posset haberi pro ultima continuatione arteriae, quam descripsimus. Oritur ad supremam partem sinus highmori. Adscendit retrorsum retro sinus sphenoideos, in tensam & tendineam pharyngis sellae turcicae subtenfi substantiam, per quam, & in summo pharynge, & deorsum versus alas pterygoideas dividitur. Dat etiam furculos nutritios ossi, cui proxime subest, & aliquando canalem osseum proprium perforat, super alarum radicem, a Vidiano diversum, alias sub osse nudo repit. Dat autem perpetuum ramulum, in BOERHAAVII commentario a me descriptum T. IV. p. 51. in paradoxum illum pterygoideum ductum, qui cum nervo, & vena retrorsum transversus incedit, & plerumque anastomosi facta communicat cum ramo aut Carotidis internae, ut aliquoties manifestissime vidi, orto in ipso osseo sinu, aut pharyngeae adscendentis, & etiam Cl. GUNZIO observante p. 38. aut, quod saepius vidi, ramuli a meningea orti, qui in fissuram aquaeductus se insinuat, comitemque se addit nervo duro. Hic diversus est a stylo mastoidea, quae a temporali orta nervum durum comitatur, & ita parva est, ut proprium locum inter ramos carotidis externae accepisse vehementer mirer apud D. LIEUTAUD. Caeterum arteriola ductus Pterygoidei etiam proprio nonnunquam trunco a nasali oritur, sub Pharyngea suprema, & perpetuo inseritur in cartilaginem tubae, ad anteriora canalis carotici. Et ductum, & arteriolam habet MONROO *of the bones* p. 128. sed male nasalem ea via ducit, deinde Cl. GUNZIUS p. 39. Sed longe magis mirarer habere cum ductum veteres, ut VESALIUM p. 64. INGRASSIAM p. 93. PLATERVM p. 36. 118. VIDVM p. 30. nisi ita describerent, ut appareat, haec subtilia vasa ipsis satis non fuisse perspecta. Nervum comitem a secundo Quinti describit POVPART apud le CLERC. *Chir. compl.* p. 107. Venam nunc manifesto mihi visam SANTORINVS *Conf. expl. ic. bas. cran.*

aa) Nominata a FALLOPIO p. 133. obiter a WINSLOWO dicta est n. 59. melius vero a Cl. GUNZIO p. 36. Veteres & nuper CHESELDENIVS p. 185. male ab Interna Carotide deduxerunt. Unicus aliquando, plerumque duo rami, alias tres sunt, qui per intervallum duorum processuum ossis palati, supremae nares adeunt, ad radicem posteriorem superioris conchae. Ramos persecutus reperi, superiorem alium minoremque adscendere uno ramo ad cellulas ethmoideas posteriores, & sinum sphenoideum per orificium, quo in nares patet, parte altera postremam septi narium adire. Ramus vero major oblique antrorsum trans imum os spongiosum anterior descendit in fundum narium. Dat autem ossi spongioso vulgo superiori, tum inferiori, & ramos antrorsum euntes meatui narium medio, imo furculus forte ipsius est, neque enim satis certo vidi, qui per ductum incisivum ad palatum osseum descendit LIEUTAUD. p. 480. Alios ramulos in sinus HIGHMORI mediam & internam partem inmittit. Anterior vero pars septi narium & proximae cellulae ethmoideae furculos habent ab ophthalmicae ramo, qui cum nervo a Primi Quinti ramo inferiori transversus orbitam perforat, pictus in icone baseos cranii, deinde antrorsum, dura matre, tamquam tubo, vestitus, venit, & per foramina cribrosa descendit in septum cellulasque. Hic ramus ad duram matrem, cribroso ossi proximam, totamque fossam cerebri anteriorem dat furculos. Ramos ejus nasales jam DIONIS habet *cour d'anat.* p. 583. sed totis naribus non bene tribuit. Meningeos describit CHARRIERE *anat. de la tete* p. 110. & pingere videtur RIDLEYVS. Aliqua etiam pars supremarum narium furculos habet ab arteriola & venula, quae nasi os perforat. Eae ipsae etiam ophthalmicarum sunt propagines.

bb) Vide not u.

- τ. Arteria *Pharyngea adscendens*. *cc*)
- υ. Ramus ejus ad linguam.
- φ. Ramus ad musculos colli.
- χ. Ramulus ad ganglion cervicale superius.
- ψ. Rami pharyngei, & musculorum uvulae.
- α. Vena jugularis interna.
- a. Nervus durus Paris septimi.
- b. Ejus anastomosis cum nervo octavi paris *dd*)
- c. Nervus noni paris.
- d. Ejus ramus descendens ad colli musculos & nervum Phrenicum *ee*)
- e. Truncus nervi octavi paris.
- f. Nervus accessorius.
- g. Nervus ab Octavo ad basin linguae & plexum pharyngeum *ff*)

cc) Hanc arteriam, quod nondum satis descripta sit, hic visum est recensere, donec figuram addere liceat. Nomen dedi, quod sursum ad infundibulum Pharyngis imprimis adscendat, WINSLOWVS hanc videtur velle n. 54. sed ramos ipsi tribuit, mihi non visos, omittit vero eos, quos nunquam defuisse vidi. Ita neque quidquam observationes meae commune habent, cum iis quae habet CL. GUNZIVS p. 14. Sed neque arteriola est, ut alibi vocatur, neque tres tantum ramos habet, uti nuper imperfectissime descripta est. CL. LIEVTAVD eam omnino omittit. Ex carotide externa oritur, ex omnium primis, e regione fere lingualis arteriae, sed posterior, ut lateat tecta reliquis Carotidis ramis, caeterum minor omnibus, & fere lineae diametro. Adscendit trunco suo, quasi recta subitura foramen caroticum, adnexa pharyngis posteriori lateri, ubi hunc multa cellulosa fabrica cum musculo recto interno & longo connectit, retro musculum stylopharyngaeum, cui furculum dat Ramos autem soleo in externos & internos dividere. Internorum primus inflexus pharyngem adit, datque etiam interno pterygoideo. Vidi etiam primum ramum a pharyngea ad linguam venisse cum nervo linguali octavi paris, in postremam crassitiem hujus organi. Deinde Pharyngei incurvi rami non unus saepe, sed duo, & tres simillimi ex trunco veniunt. Alius ramus *palatinus*, incurvus, & pterygostaphylino tectus, in pharyngem & velum mobile palati descendit, & uvulam ipsam & pharyngopalatinum musculum, & tonsillam. Etiam iste duplici trunco saepe advenit. Tertius cum stylopharyngaeo, ad tubam usque adscendit, & reflexus duobus ramis iterum descendit cum levatore palati mobilis, cui, & circumflexo, furculos dat, aliquando etiam palato mobili. Truncus ipse pharyngeae adscendit, quasi penetraturus in cranium, sed dato ramo in pharyngem, in tubam cartilagineam abit, & ultimo per cartilaginem ossi petroso & occipitali intermediam, sub canalis carotidi parte interna antrorsum it in duram matrem usque. Externorum ramorum fere primus in periosteum vertebrarum, ganglion intercostale, nervum octavi paris, & mastoideum aliquando musculum abit. Sequi solent unus, duo, tresve trunci in musculos rectum, longum, rectum aliquando lateralem, periostea vertebrarum colli, glandulasque conglobatas colli. Hi fere adscendunt. Alius etiam sursum cum jugulari adscendit, sed in rectum lateralem & originem recti majoris absimitur: & idem dat pharyngis parti posteriori. Hujus furculus partim cum nervo octavi paris cranium subit, & per duram matrem, in facie interna ossis petrosi, in sinum usque cavernosum adscendit, cum nervo sexti paris, aliis vero furculis in venae jugularis membranas finitur, & in carotidis membranas. Caeterum aliquando duas pharyngeas adscendentes, sed proximas vidi ex carotide oriri.

dd) A duro nervo, continuo postquam ex foramine stylomastoideo exiit, ramus descendit trans biventrem musculum, iterumque ad superiora redux inseritur ramo pharyngeo Octavi, nemini, quantum novi, dictus.

ee) Ad hunc aliquoties vel in supremo, vel in imo thorace accessisse, & conjunctum fuisse vidi. Conf. *Diff. de orig. nerv. interc.*


ff) Hunc plexum hujusmodi nuper reperi. Lingualis nervus octavi paris descendit, cum stylopharyngaeo, cui & vicino pharyngi furculos impertit, abitque in linguae carnes proxime os

- h.i. Nervi intercostalis duae radices gg)
- k. Trunculus communis.
- l. Ganglion ejusdem magnum.
- m. Intercostalis vulgo dictus nervus
- n. Nervus Maxillaris inferior a Tertio Quinti
- p. Nervus Lingualis ab eodem.
- q. Nervus temporalis ejusdem.
- r. Nervus buccalis.
- s. Nervus infraorbitalis.
- t. Nervus Laryngeus.
- u. Nervus Palatinus.
- x. Nervus ab infraorbitali ad sinum Highmori.
- y. Nervus quarti paris
- z. Nervus sexti paris
- r. Nervus tertii paris
- Δ. Nervus opticus
- ⊙. Ductus super pterygoideas alas
- 1.2.3. Musculi a processu styloformi orti
- 1. Styloglossus
- 2. Stylohyoideus
- 3. Stylopharyngeus
- 4. Globus oculi
- 5. Trochlea
- 6. Musculus patheticus
- 7. Rectus superior
- 8. Elevator palpebrae superioris
- 9. Sinus Highmori pars
- 10. Stylus tubae inmissus.

hyoides, exterius quam arteria & vena lingualis, Nervus vero a suprema parte Lingualis nervi octavi paris ante carotidem internam descendit, ad crico- & thyreopharyngaeum musculos. Sed prius, plexum facit in intervallo carotidum, a quo ramuli varii ante lingualem arteriam conplexi, ad eam ipsam, alii ad temporalem, alii ad carotidem externam arteriam veniunt, in tunicis consumti. Ad eundem plexum ramos dat Laryngeus octavi paris ramus, cum intercostali variis anastomosibus junctus. Dat etiam Ganglion magnum intercostalis ramos, & pharyngeum, & laryngeum octavi paris varie conjunctos. Sub eo vero plexu, quem dixi pharyngeum, alius plexus est laryngeus, conjunctus ex furculis ganglii magni & ex Laryngeo octavi paris. Hujus plexus furculi abeunt in thyreopharyngeum, in musculos glandulae thyreoideae incumbentes, in cricopharyngeum, & alius deorsum ad glandulam, quam nominavi, qui duplici furculo cum recurrente nervo inosculatur. Haec obiter, neque collata cum scriptoribus, alias expediam. Monere autem interim visum est, plexum illum, qui carotidibus prospicit, primum a me descriptum *de orig. nerv. interc.* n. 17. ab anatomicis gallis etiam recentissime detectum esse, uti ex Cl. GUNZII opusculo video p. 4.

gg) Nempe modo duplici trunco nervus intercostalis oritur, modo simplici. Perpetuus est, qui anterior & exterior adjacet carotidi, ex meatu osseo ad processum clinoidium posteriorem adscendenti. Idem plerumque cito bifidus est. Alter non perpetuus & minimus, interior eidem carotidi adfidet & posterior.





D. ALBERTI HALLER
ANAT. P. P. O.
I C O N
A R T E R I A E
T H Y R E O I D E A E
I N F E R I O R I S

P R I M A
PROGRAMMATIS INVITATORII LOCO
AD DEMONSTRATIONES HYEMALES

MDCCXXXIII - MDCCXXXIII.

LECTURIS. S.

Arteriarum historia dudum mihi inventis fecunda visa est, quae a solo WINSLOWO, & nondum cum ea ubertate sit tradita, quam in ossium & musculorum historiis videmus. Ergo sumsi mihi hanc partem anatomes, quam ex abundantissima cadaverum obportunitate ornarem, daboque operam, ut iconibus, quae haëtenus fere nullae sunt, illustratam edam, quam primum partem aliquam ita, ut mihi utcunque satisfaciam, perspectam habebo. Hanc autem, de qua nunc ago, thyreoideam inferiorem olim a. 1735. M. Febr. doctissimi RITTERI, physici nunc Lauterbacensis in Hassia, penicillo primum adumbrari curavi, miratus magnitudinem ignoti fere vasis. Deinde a. 1737. M. Octobri pene totam persecutus sum, ramos certe adscendentem, oesopha-
*
geum,

geum, thoracicum, ramulosque ad medullae spinalis involucria primum vidi, & horum ramorum brevem historiam, quod mihi novi viderentur, dedi M. Aprili ejusdem anni 1738. in historia fetus bicipitis p. 20. Monui tunc virum, qui eo tempore ministri & amici loco mihi erat, ut hanc sibi sumeret spartam, eumque video nuper, multis a meo consilio annis, in epistola anatomica p. 26. descripsisse, aut certe nominasse, ramum Thyreoideae adscendentem, ramulos ad spinalis medullae involucria, ramos ad glandulas bronchiales, ramulos minores ex trunco arteriae thyreoideae ad duram matrem, arteriolam cervicalem posteriorem, uberiores denique de variis Thyroidibus tractationem promittere. Non ideo visum est non edere icones, quae mihi non displicerent, & descriptiones, quas edendas susceperam de arter. & venis bronch. p. 8. & de nerv. imper. p. 14. & in quibus nonnulla forent nondum ab eo auctore promissa, ut ramus scapularis thyreoideae, ramus cervicalis posterior, anastomoses cum vertebrali, rami bronchiales, oesophagei, thoracici, laryngei, arteria cervicalis superior, & infima, tum alia. Neque video damnum aliquid, quod in anatomen sit rediturum, si, quam maxime, praeter meam alia descriptio aliaque icon prodierit. Id unum addo, mire has arterias ludere, ut difficilis illa sectio osseorum processuum mihi minus molesta fuerit, quam mearum observationum ordinatio. Eas enim numerosissimas, & mirifice a se ipsis diversas habebam. D. XI. Febr. 1745.

EXPLICATIO FIGVRARVM

T. I.

- A. Cor obiter expreſſum , & reclinatum.
- B. Aorta descendens
- C. Oeſophagi pars.
- D.D. Aſpera arteria.
- E. Thyreoideae glandulae pars dextra.
- F. Larynx obiter indicatus.
- G. Vena Cava.
- H. Radix carotidis dextrae & ſubclaviae.
- I. Carotis dextra.
- K. Subclavia dextra.
- L. Vertebralis.
- M. Mammaria.
- z. Intercoſtalis ſuperior. a)
- π Ejus anastoſes cum inferiori.
- N. Subclaviae truncus.
- o. Cervicalis ſuperficialis. b)

z. Tho.

a) Perpetua arteria, uti dudum, contra GARENGEOTVM, adſerui *Comm. Boerb.* n. 308. not. d. egregie jam GALENO nota de venar. & arteriar. diſſect. c. 9.

b) Hujus, & duarum ſimilium arteriarum hiſtoria neceſſario cum thyreoideae hiſtoria conjungenda eſt, cum unius rami, alterius deficientes ramos ſaepe ſuppleant. Plerique omnes obiter recenſent. Ergo *Cervicalis ſuperior* five *ſuperficialis*, non penitus perpetua, oritur ex ſubclavia, ſecundum ambitum exteriorem muſculi ſcaleni primi, mediocriſ arteria, & multo minor, quam thyreoidea. Eam omittit WINSLOW, & qui alii de hiſ rebus ſcripſerunt, notaſſe videtur EVSTACHIVS T. XXV. ad β. & T. XXVI. ad 15. COWPERVS vero expreſſiſſe in *append.* T. III. ad 20. 20. huc enim; ob tranſverſum ſitum, mallem reſerre. Ex hac origine, tranſverſim fere proſecta, continua tegitur radicibus brachialium nervorum, ut totidem ſupra ſe, totidem fere infra habeat, deinde vero a ſcaleno laterali abſconditur. Dat ſcaleno anteriori, & laterali, & longo, ſurſum euntem ramum. Ibi fin- ditur & generat ramum dorſi ſcapulae, quem alias vidi ex Thyreoidea veniſſe, alias ex intercoſtali ſuperiori, alias ex cervicali profunda. Is cum nervo & vena descendit, venit in foſſam ſuperſpinalem ſcapulae, dat muſculo, qui eam replet, acromii perio- ſteo, cuti ſummi humeri, & nonnunquam deltoidi, & per hiatum inter radicem pro- ceſſus coracoidei, & coſtam ſuperiorem, ut ajunt, ſcapulae, descendit in muſculum infra- ſpinalem, inque eo terminatur. Hanc EVSTACHIVS habet T. XXIV. ad p. q. editionis ALBINIANAE. *Scapularis externa* eſt WINSLOWI n. 126. qui ad teretem uſque vidit descen- diſſe, & *Scapularis ſuperior* WALTHERI de vaſ. vertebr. p. 13. Hujus aliquando ramus eſt, alias cervicalis profundae ramus, quae ſecundum baſin, ſcapulae fere ad angulum ejus in- ferioſiorem, descendit, varie diſtributa in infraſcapularem, ſerratum poſterioſiorem ſuperiorem, & majorem alterum, rhomboidem, latiſſimum, trapezium, & hiſ muſculis perforatiſ in cu- tem ſummi dorſi & cerviciſ. Solet autem alio ramo inter ſerratum ſuperiorem minorem & rhomboideum repere, alio inter coſtas & ſerratum. Surſum ſaepe ramum edit in ſplenium capitiſ, ſplenium colli, tranſverſum colli, ſcalenos, levatorem ſcapulae, complexum, om- nes, vel tres prioſes. Satiſ conformem meiſ obſervationibuſ pingit EVSTACHIVS T. XXIV. & deſcribit, cum nomine *ſcapulariſ* & *colli poſterioriſ* ILL. WALTHERVS l. c. p. 11. 12.

- Σ. Thoracica externa.
P. Thyreoideae inferioris truncus c)
Q. Ramus transversus scapularis d)
Φ. Ejus finis in super-spinali musculo.

R. Ra-

Alter hujus arteriae cervicalis princeps ramus transversalis est, is levatore scapulae tegitur, dat huic, & deorsum nonnunquam latissimo, tunc finditur. Surculus superficialis est, qui Levatori, Trapezio, & cuti prospicit. Profundus alter ad splenium capitis, alterumque colli splenium, tectus trapezio, ramosus absumitur, maxime in splenium capitis. Hunc ramum profundum vidi a thyreoideae surculo suppletum fuisse. Eadem cervicalis aliquando, & quidem in corpore, unde icon prima desumpta est, legit profundo trunco processus transversos colli, & cum Thyreoideae ramo adscendente patulo ramo conjuncta est, sub atlante. Dedit eadem ad duram matrem medullae spinalis ramos, sub prima, secunda, tertia, quarta vertebra colli, qui singuli cum sibi vicinis arcus fecerunt. Hi vero rami ab adscendente ramo Thyreoideae venire solent.

Cervicalis alia minor, inferior visa est aliquoties orta a subclavia, prope thyreoideam, sed exterior, adscendere ad musculos profunde a processibus transversis ortos, spinalem, scalenum brevem, aliosque, & ad medullam spinalem dare, sub vertebra quinta, sextaque, aut, ut bis vidi, sub septima & octava. Trunculus ejus in levatorem, splenium colli, transversalem abibat, Alias a Thyreoidea oritur prope originem. Ea videtur esse, quam *aliam valde exiguum* vocat WALTHERVS l. c. p. 12.

Cervicalis vero profunda, perpetua, diversa a prioribus, & plerumque proprio trunco orta, venit ex subclavia, proxime Thyreoideam, alias ante eam, alias postquam ea jam nata est. Eam habet WINSLOW cum nomine *Cervicalis posterioris*, additque aliquando ex vertebrali oriri T. III. *des arter.* n. 93. Idem nomen habet VERDIER. Sed dudum, neque male, ut breviter descripsit VESALIVS p. 487. iconemque dedit in *tab. art.* repetiitque utcumque VIDVS p. 136. iisdemque cum VESALIO verbis VALVERDA p. 280. Musculam dixit C. BAVHINVS *theatr.* p. 239. T. XII. L. II. O. O. & SPIGELIVS p. 175. ex VESALIO uterque, unde etiam CASSERII icon sumpta est L. VI. T. II, inter d. & e. Idem nomen habet DIEMERBROECK p. 476. BARTHOLINVS p. 652. VERHEYEN T. XXXVIII. lit. k. HEISTERVS & plerique alii. Ex principio suo dat ramulos ante corpora vertebrarum imarum colli ludentes, aliosque scaleno brevi, laterali, longo: tunc tecta brevi scaleno, aliisque musculis colli ab his vertebris ortis, sub processu transverso quinto, sexto, aut septimo (WINSLOW.) adscendit introrsum, inter spinalem musculum & processus transversos, dat utrinque ramos varios, & terminatur fere in complexum, prope occiput, ibique ultimis ramulis exit in cutem. Ejus rami alii in strato eo sunt, quod inter spinalem & complexum est. Horum denuo alii interni sunt ad complexum, spinalem. Iidem passim in trapezium & cutem exeunt superficiales EVSTACH. T. XXIV. ad g. Alii vero extrorsum eunt ad complexi, trachelomastoidei, splenii capitis, splenii colli, transversalium origines. Horum ramorum aliquis ex supremis inosculatur ramo vertebralis arteriae, tectus obliquo inferiori, cui dat surculos, sub atlante, plusculi vero cum occipitalis ramulis continuantur. Utramque anastomosis etiam WINSLOWVS habet n. 94.

Infimae vero partis colli, sub quinta vertebra, carnes profundissimae peculiarem ramum accipiunt, ab intercostali suprema, ex ipso thorace sursum missum.

c) *Thyreoidea inferior* arteria, toto in pueris reliquo trunco subclaviae major, proxime exterius, quam vertebralis, oritur, eodem fore loco, quo mammaria, & intercostalis superior. Semel rarissimo exemplo, a carotide vidi natam. Eam WINSLOWVS *Cervicalem anteriorem* vocat, ejusque ramos anteriores & inferiores breviter recenset. WINSLOWVM fere imitatur BOVDON in PALFYN p. 241. & VERDIER. EVSTACHIVS eam adumbravit T. XXV. & XXVI. ubi tres rami habentur, thyreoideus, adscendens, cervicalis, & forte Laryngeus. Praestantissimus denique WALTHERVS vocat *arteriam juguli & scapulae communem*, eique etiam eos ramos adtribuit, quos cum nomine cervicalium descripsi, *de vas. vertebr.* p. 11. Veteres obiter, & vix nominarunt. Confer VIDI VIDII iconem T. XXVII. f. 1. f. ubi praeter omnem naturae morem parvam pinxit. Paulo majorem fecit COWPERVS *append.* T. III. 19. 19. sed minime perfectam dedit descriptionem. Obiter etiam recenset D. LIEVTAUD p. 481. Haec magna arteria ab origine in ramos tres vel quatuor finditur. Quatuor in eo corpusculo fuerunt, unde icon prima desumpta est.

d) Primus, perpetuus, GALENO forte dictus, ubi inter ramos subclaviae proximo vertebris loco ramum ad loca claviculae vicina nominat *de art. & ven. diff.* c. IX. Semel tamen vidi, a mammaria, & semel ab intercostali superiori ortum fuisse. Superficialis est, parallelus clavi-

- R. Ramus *transversus colli. e)*
- S. S. Ramus superficialis ad cutem pectoris.
- T. Ramus ad Levatorem, complexum, splenium.
- V. Ramus ad Trapezium.
- Y. Ramus descendens ad super- & infra-spinalem.
- Z. Ramus Thyreoideae *adscendens. f)*

a. Sur-

claviculae: Prope originem suam ramulum dat in mastoidei insertionem sternalem, & sternohyoideum, alium in coracohyoideum, alium ad cutem colli & summi pectoris; alios parvos in membranas cavae venae & subclaviae, alium tectum clavicula in subclavium, majusculum, alios in trapezium, uti fere aliquid habet simile EVSTACHIVS T. XXV. lat. fin. Trunco vero suo in fossa super-spinali cutaneus finitur, ramo ad humeri cutem ad exterius latus deltoidis aliquando emissio. Alias autem vidi cum levatore adscendisse, dedisse huic & trapezio, & inosculatam fuisse furculo cervicalis arteriae. Vidi etiam locum tenuisse rami scapularis cervicalis arteriae, & per hiatum costae scapulae ad infra-spinalem musculum venisse. Est ubi ramum ad infracapularem & serratum anteriorem majorem deorsum misit, quem solet dare descendens ramus Cervicalis arteriae.

e) Alius ramus, qui in icone prima pingitur, non raro subpletur a ramo cervicalis superioris. Transversus, autem datis ramis in mastoideum, cutem pectoris (ic. I.) collive, trapezium, splenium, levatorem scapulae, trunco suo adscendit inter levatorem & trapezium, in hunc, splenium, trachelomastoideum, Levatoremque scapulae absumta, communicans passim in splenio, & alibi, cum ramis occipitalis. Vidi hunc ramum, communi cum adscendente principio pariter ortum, (ut in ic. I.) dedisse toti cervici ad occiput usque, deorsum in complexum, sursum vero cum eodem in rectum usque majorem, tum trachelomastoideo &c. Idem dabat tres ramos medullae spinalis, quos alias Adscendens dat, ad tertium quartum & quintum par nervorum. Locum ergo occupabat trunci cervicalis superficialis not. b.

f) Tertius ramus Thyreoideae, *adscendens*, perpetuus fere est. Oritur aliquando solus, alias cum priori, vidi etiam seorsim venisse a subclavia, exterius, quam thyreoidea. Minor caeterum prioribus, adscendit secundum processus transversos colli, adjacens hinc scalenis, inde recto interno. Hinc *scalena* dicta est ILL. WALTHERO l. c. p. 12. ubi eam brevissime indicavit. Dat ramos variabiles, alios superficiales scaleno anteriori, & medio, etiam longo, & levatori scapulae, majoremque ex summa pene parte, trans scalenos, ad levatorem scapulae, cumque eo deorsum, tum splenio; alium recto interno, levatoris principio, mastoideo aliquando, & glandulis jugularibus, ubi definit nonnunquam, & alios varios ramos adscendentes, per vertebrarum faciem anteriorem ludentes. Vidi etiam dedisse praelongum furculum, qui sequebatur nervum octavi paris. Ultimo circa primam vertebra inosculari solet ramo descendenti pharyngeae, & datis ramis ad ganglion intercostale magnum, & glandulas jugulares, ibique terminari.

Profundi vero rami alii passim ad musculos cervicis intertransversales, scalenos posticos, splenios colli, transversales, ab iisdem ortos processibus, variis locis exeunt. Sed etiam cum nervis cervicalibus pene perpetuo ramos dat ad medullae spinalis involucra, quorum supremus longe plerumque, & pene semper, sub atlante in vertebralem arteriam patulo osculo inseritur. Numerus autem ramorum incertus est. Saepiuscule vidi dedisse ramos ad spinalem medullam, cum nervo secundo, tertio, quarto, quinto, sexto. Alias cum quarto, quinto & sexto nervo medullae dedisse; alias cum tertio, quarto, quinto, sexto, alias cum quinto, sexto. Vidi trunco majori sub quarta, & alias sub tertia vertebra se abscondisse, ut in ic. I. ubi numerosos furculos complexo & trachelomastoideo dedit, porroque ad cervicem sub secunda vertebra venit, inter splenium & complexum, dedit utrique, inosculata occipitali super processum transversum atlantis, profundeque ibi demersa communicavit, & cervicali & vertebrali arteriae, & cum ista conjunctim medullae spinalis involucro dedit. Vidi eodem loco, sub vertebra quarta, venisse profundum ramum in cervicem, & loco cervicalis arteriae profundae inter spinalem & complexum ivisse, dedisse trachelomastoideo, descendenti DIEMERBROECKII, spinali, complexo, multifido denique, & toti profundae cervici. In eodem cadavere ad medullam spinalem edidit cum quinto, quarto, tertio, secundoque nervorum cervicis, ultimo vero, uti fere solet, inosculata fuit in vertebralem, sub atlantis transverso processu.

In cadavere, unde Icon II. desumpta fuit, tres trunci fuerunt adscendentes. Eorum major, a thyreoidea ortus, dedit primo loco trans scalenum, levatori, tunc alium, in cutem, & trapezium, inosculatum ramulo rami transversi not. c.

Porro

- a. Surculus ad Scalenos.
- b. Surculus profundus, unde rami ad medullam.
- c. Ramus superficialis superior.
- d. Surculus ad scalenum anteriorem.
- e. Ad eundem et longum scalenum.
- f. Supremus ad scalenum musculus rectum.
- g. Surculi supremi ad glandulas jugulares ganglionque intercostale.
- h. Ramus Thyreoideae Thyreoideus g)
- i. Surculus in musculus scalenum & medullam b)
- k. Ramus ad asperam i)
- l. Ramus ad asperam qui cum furculo Bronchialis pe-
toralis communicat.
- l. Alius ramus ad asperam k)
- m. n. Rami ad oesophagum.

o. Trun-

porro trapezio, splenio colli, trachelomastoideo, glandulis jugularibus, levatori, ubi bis cum occipitali, & semel cum adscendente ramo secundo conjuncta fuit: alium ramum mittit trans levatorem scapulae, inosculatum & priori, & occipitalis ramo mastoideo, ad euntem glandulas jugulares, splenium colli, & transversalem. Alium vero sub secunda vertebra in complexum dedit & Levatorem, Truncus alium ramum vertebrali inseruit, sub secunda vertebra, cum pharyngeo ramo de more communicantem, idemque truncus transversali dedit, & splenio, & superficialis factus est. In musculos vero rectum & longum antius numerosos dedit furculos. Minor vero ramus ortus ex subclavia, sed simillimus fabrica sua ramo adscendenti thyreoideae, gracilis per intervallum recti & scaleni adscendit, dedit ramos in scalenum, in trapezium, in rectum, communicavit cum ramo occipitalis in recto ipso, & inserta est vertebrali, sub secunda vertebra. Minimus autem adscendit ex trunco thyreoideae, fere ex ortu, sub sexta vertebra, analogus imae cervicali, dedit vicinis musculis, adscendit ante processus transversos septimae & sextae vertebrae, concurrat, & super septimam, & super sextam, cum vertebrali, & cum sexto, septimoque pare dedit ramos ad duram matrem.

- g) His quatuor ramis datis, scapulari, cervicali, transverso, adscendente, thyreoideae truncus reliquus pergit serpentino itinere adire glandulam suam, & laryngem. Illam multis, magnisque ramis subit, qui cum superioris Thyreoideae ramis passim inosculantur. Ab his ramis ramuli ad carotidis membranas eunt, alii transversales priores duos anulos laryngis oberrant, alii adeunt thyreo- & cricopharyngaeum, saepe ad epiglottidem usque adscendunt, alii non raro Thymi cornua suprema subeunt. Unus vero nobilior *Laryngeus inferior*, perpetuus, dato ad oesophagum furculo, in laryngis posteriora venit, ad exteriora cricoarytaenoidei posterioris ad thyreoarytaenoideum, sed inprimis ad cricoarytaenoideum posteriorem totum abit, inque utriusque horum musculorum carne cum ramo superioris thyreoideae inosculatur. Alius, & quidem a transversali asperae ramo, furculus cum cricothyroideo subit, & huic & crico arytaenoideo posteriori prospicit.
- b) Sed ex thyreoidea propria ramuli oriuntur, alii introrsum deorsum euntes, alii sursum. Hi minores, unus vel duo, adscendunt ad musculus rectum, ganglion, cervicale medium & ramis suis pingunt anteriorem faciem corporum vertebrarum. Eorum imus etiam cum nervo septimo medullam spinale adire visus est.
- i) Qui introrsum eunt perpetui sunt, numerus variat. Tres saepe reperi, supremum ad asperam magnum, quideorsum ramulis suis cum sequentium ramis communicat.
- k) Duo vero ad glandulas bronchiales, pinguedinem, oesophagum & asperam cum priori, & cum sequente varie inosculantur, uterque multifidus.

- o. Trunculus thoracicus
- p. Ramus ejus trachealis.
- q. Ramus thoracicus.
- r. Anastomosis cum intercostalium suprema.
- s. Anastomosis cum bronchiali.
- t. Anastomoses trachealium.
- y. Bronchialis sinistra 1)
- z. Oesophagea sinistra superior.
- a. a. a. Aliae m)
- β. β. β. Intercostales aorticae.
- γ. Intercostalium inferiorum superior.
- δ. Inde orta Bronchialis dextra.
- ε. Bronchi.
- η. Carotis dextra.
- θ. Truncus cereбрalis.
- λ. Carotis externa.
- μ. Thyreoidea superior.
- ν. Rami in glandulam.
- ξ. Ramus ad cutem menti, & ad musculos laryngis.
- π. Arteria coronaria.
- ρ. Nervus Octavi paris.
- σ. Nervus Intercostalis.

T. T Duae

1) Ramus demum ultimus, *thoracicus*, plerumque reperitur, majusculus, qui tectus magnis vasis ad thoracem venit, ramulisque ad asperam, glandulas bronchiales, posterius mediastinum, longum muscolum, oesophagum, & membranas vertebrae incumbentes datis, varie inosculatur cum bronchiali, & intercostali superiori ex aorticis, & suprema lc. I. Vidi ortum fuisse a subclavia proprio trunculo, proxime thyreoideam, & cum hujus ramis trachealibus, & cum bronchialibus communicasse. Descripti in COMM. BOERH. T. III. p. 17. not. d.

m) Arteriarum bronchialium immensa varietas est. Earum addam eas, quas post editam de his ipsis vasis dissertationem videre contigit. Vidi a subclavia retro mammariam bronchiale arteriam ortam, adiisse asperam & oesophagum, quam forte arteriam intelligit Cl. D. HEBENSTREIT *de venar. & arter. confin.* p. VII. Vidi a mammaria bronchiale dextram descendisse, retro vasa cordis magna, cum praeterea alia dextra ex aorta veniret, communis cum sinistrae trunco & intercostali suprema sinistrarum. Alias tres ab aorta bronchiales vidi, quarum una dextra retro omnia vasa cordis migravit transversa, alias & bis quidem unica ad dextrum & sinistrum bronchum venit. Obiter etiam visum est monere, vascula superficialia pulmonis anteriora, quae membranam externam & cellulosas lineolas per repunt, a *Phrenica* illa *descendente* anteriori esse, quae nervum Phrenicum comitatur.


Venae bronchiales mihi occurrerunt dextra a trunco venae cavae, sinistra ex superiori intercostali dextra orta, & praeterea inferior ex azygae ramo prope decimam costam nata.

- τ. τ. Duae radices cervicales.
 υ. Ganglion cervicale medium *n)*
 φ. Ramus ejus profundus & ganglion cervicale imum.
 χ. Ramus superficialis, ansam faciens circa arteriam
 subclaviam. *o)*
 †. Rami cardiaci.
 ω. Ramus ad recurrentem.
 Γ. Nervus recurrens.
 Δ. Cardiacus nervus a Vago ortus.
 Θ. Rete oesophageum ab octavo pare.
 1. Rectus interior capitis.
 2. Scalenus primus.
 3. 4. Scaleni laterales.
 5. Levator scapulae
 6. Complexus.
 7. Splenius capitis.
 8. Superficialis.
 9. Longus colli.

n) Id ganglion modo supra, modo infra arteriam thyreoideam sedet *Comm. Boerh. 185. not. d.*

o) de nervorum imperio in arterias n. 17.





D. ALBERTI HALLER

ANAT. P. P. O.

I C O N

A R T E R I A E

T H Y R E O I D E A E

I N F E R I O R I S

S E C V N D A

PROGRAMMATIS INVITATORII LOCO

AD DEMONSTRATIONES HYEMALES

MDCCXXXIII MDCCXXXV.

EXPLICATIO LITERARVM.

- A. Subclavia arteria.
- B. Superfcapularis.
- C. Progreffus arteriae subclaviae.
- D. Thyreoidea ad glandulam euns.
- E. Thyreoidea adscendens.
- F.G.H. Rami adscendentis in descriptione dicti. a)
- г. Ramus ad rectum colli
- Δ. Ramus ad ganglion cervicale, inofculatus pharyngeae
supremae.
- I. Ejus anastomosis cum vertebrali.
- L. Carotis.
- M. Truncus ejus ad cerebrum euns.
- N. Carotis externa.
- O. Ramus ad Mafloideum.
- P. Thyreoidea fuperior.
- π. Lingualis.
- Q. Maxillaris.
- R. Occi-

a) not. f.

- R. Occipitalis. *b)*
 Σ. Ramus ejus meningeus.
 υ. Thyreoideae ramus vertebrali insertus.
 φ. Alter superficialis ad splenium.
 S. S. Vertebralis. *c)*

T. Ejus

b) Occipitalis COWPERI l. c. II. II. DRAKE T. XXII. II. WINSLOWI n. 66. BOVDON p. 24. LIEV-
 TAVD p. 478. etiam KVLMÖ dicta T. XVI. Est alter ille ramus, quem retro ferri diximus CO-
 LVMBI p. 131. Quinta FALLOPIO p. 132. Quartus ramus VERHEYENII p. 368. BOVR-
 DON p. 369. Ex Carotide externa prodit non minima, & Pharyngea major, e regione
 fere lingualis arteriae, vel etiam prior, continuo sub biventre, supra nervum noni
 paris. Transversum fere ante venam jugularem fertur, deinde super rectum lateralem &
 inter processum transversum atlantis, processumque mammillarem, porro adplicata ossi oc-
 cipitis, & primo tecta trachelomastoidei origine, deinde complexi, occiput circumlegit,
 donec inter complexos, in medio occipite, vel iis perforatis, ad occiput cutanea longe la-
 teque dividatur.

Rami alii majores sunt, minores alii. Primus gracilis ad biventrem & stylohyoideum it
 (WINSLOW. n. 67.) Alius, saepe multiplex, ad glandulas jugulares & mastoideum mu-
 sculum abit, & cum eo longe deorsum, inosculatus nonnunquam thyreoideae, aut cervi-
 cali. Tunc meningeus ramus nonnunquam provenit, qui cum vena jugulari cranium su-
 biit, deditque magnum ramum durae matri fossae cerebelli, parvum vero, qui solet a Pha-
 ryngea adscendente venire, cum nervo octavi paris, ad duram matrem, quae faciem inter-
 nam petrosi ossis vestit. Hic ramus alias parvulus est, alias subpletur a Pharyngea adscen-
 dente. A carotide ortum, comitemque venae Jugularis, olim dixit D. de MARCHETT.
comp. anat. p. 105. Post hunc ramum, retro aurem nonnunquam dat, ad lobulum inumque
 finem helices, a quo ramo etiam stylomastoideam vidi orta fuisse. Verum ea, etsi descripta a
 D. LIEVTAVD, saepe deest. Aliquando etiam temporalem posteriorem edidit, retro auriculam
 adscendentem, hinc occipitali, inde temporali varie inosculatam, a qua ad convexitatem conchae
 aliasque auriculae partes rami eunt: sed plerumque eum ramum dat temporalis. Inde occi-
 pitalis splenio colli, & trachelomastoideo ramum dat. Sequitur descendens ramus gracilis ad
 rectum lateralem, & nonnunquam ad obliquos, & alius, eo loco quo tegitur arteria a trache-
 lomastoideo, trans obliquum superiorem, in hunc, in trachelomastoideum, & colli sple-
 nium, et aliquando in transversalem, inosculatus alicui ramorum cervicalium. Hic ra-
 mus non perpetuus est, aut soli dat trachelomastoideo. Tunc inter trachelomastoideum et
 complexum ramus princeps cervicalis (WINSLOW l. c. n. 67. VERDIER.) ad anteriorem
 oram provenit complexi. Hujus alius superficialis ramus est, ad mediam saepe cervicem
 descendens, in splenium capitis et colli, et complexum, inosculatus etiam cum cervicali
 superiori, vel ramo thyreoideae. Etiam hic ramus nonnunquam multo brevior est, cae-
 terum vix deficit. Alter ramus trunculi, quem dixi, profundus, circa obliquum superio-
 rem musculus conflexus, dato ramo transversali, rectum majorem decussante, et datis rami
 ad obliquum utrumque et complexum, partim sursum, inter ossa et duos rectos adscendens
 finitur in utrumque rectum, et partim sub processu transverso atlantis non minimo fur-
 culo inferitur in vertebralem (l. c. II. lit. h. WINSLOW. n. 127. SYLVA *de la saign.* p. 211. et
 forte RAV l. c. p. 103. ubi vertebralem cum ramis muscularibus dicit communicare.) Ab
 eo ramo alias furculus non exiguus descendit in complexum, qui cum cervicali, aut ejus
 loco cum thyreoidea profunda communicavit, WINSLOW l. c. Sursum vero, dum truncus
 circumlegit occiput, minores occipitales ramos emittit, splenio, occipitali, pericranio.
 Eorum unus, exterius quam vena quae foramen mastoideum perforat, os bis perforasse vi-
 sus est, alius in ipsa sede crucis occipitis duram matrem per foramen proprium adiit: sed
 alius etiam ramus inter complexos exeuns, in duram matrem se demersit, super atlantem,
 & cum ea in cranium venit per magnum foramen, non tamen perpetuus.

c) Ad vertebrales arteriae historiam addo, oriri ex subclavia proxime interius, quam thyreoidea.
 Inde continuo adscendit, extrorsum ambita ramo intercostalis in ganglion cervicale inum
 redeunte *de nerv. imper.* p. 14. tunc subit processum transversum vertebrae plerumque sex-
 tae. Vidi tamen a trunco aortae in sinistro latere ortam, vidi quartae, ut EVSTACHIUS
 habet T. XXVI. aut tertiae vertebrae foramen subire. Per hos porro transversos processus
 adscendit alternis undulationibus, ad atlantem usque, anterieus quam nervorum ganglia:
 deinde infra ejus vertebrae praelongum processum transversum sursum extrorsum, tunc sur-
 sum iterumque introrsum retrorsum in sulco superno atlantis insignem flexionem facit, (WINS-
 LOW.

- T. Ejus arcus circa atlantem.
- X. Thyreoideae ramus ad vertebrae, five adscendens,
prima in descriptione. *e)*
- Y. Ejus ramus inferior.
- Z. Ramus cervicalis profundae ad vertebrae. *f)*
- Φ. Ejus ramus muscularis.
- Ψ. Ramus a Thyreoidea in vertebralem.
- a. Ramus rami inferioris adscendentis thyreoideae sub
sexta vertebra duram matrem adeuns.

b. Sub

LOW I. C. LIEV TAVD, COWPER *Append.* T. III. 15. 15. & magis adhuc curvam facit DRAKE I. C. RIDLEY T. I.) Inde continuo cranium subit, per foramen magnum, uti notum est. Recte ita se habere demonstravit COLUMBUS p. 182. contra VESALIUM, qui per foramen peculiare occipitis ossis dixerat subire. Ramos in itinere parvos ad musculos proxime ex vertebrae ortos hinc inde emittit, majusculum autem cum singulo nervorum pare ad medullam spinalem dat, ubique cum posteriori arteria spinali communicantem, inter nervea mistum filamenta: Unus autem & alter, longe major sociis, cum anteriori spinali arteria inosculatur, diverso trunco a posteriori ramo ejusdem paris. Id vidi cum quarto nervo contigisse. WILLISVS *de cerebro* T. XIII. & BLASIVS, cujus eadem icon est, *de medulla spinali* f. 1. & VIEVSSENIVS T. XVIII. f. 3. I. I. I. I. 2. 2. 2. 3. 3. 3. ramos habent, ad posteriorem arteriam spinalem inosculatos, non autem eos, qui adeunt anteriorem. Caeterum ramos intercostalium arteriarum ad medullam spinalem jam GALENVS habet *de ven. art. diff.* c. ult. a vertebrali vero recentiores omnes, ut VESALIUS L. III. p. m. 487. & in *exam. obs. Fall.* p. 93. VALVERDA, WINSLOW n. 95. LIEV TAVD p. 483. &c. Sed alii praeterea ad duram Matrem ramuli veniunt, qui medullam non subeunt, parvi, incumbentes gangliis, incerta origine. Ii, quando durum hoc involucrium adtigerunt, uno ramo ad id ipsum, altero ad pinguedinem mollem medullae circumpositam eunt, & quilibet semper cum vicinis suis anastomoses efficit. Intercostalium arteriarum medullares ramos hac fere ratione describit WALTHERVS I. C. p. 5. Hi rami, quos passim nominavi, incerta lege proveniunt, plerumque tamen vel ex vertebrali, vel ex thyreoideae aliquo adscendente ramo. VIEVSSENS vertebrali tribuit, eodemque facit trunco oriri cum ramo, qui spinali arteriae inferitur T. XVIII. f. 3. ad 3. 3. 3. id autem a meis observationibus abludit. Vidi sub sexta vertebra unice a vertebrali venisse, sub quinta, quarta, tertia ex ramo conjuncto thyreoideae & vertebralis, sub secunda ex ejusdem ramo & thyreoidea profunda, sub tertia a vertebrali, sub secunda a vertebrali ramo cum thyreoidea misto, sub prima & occipite a vertebrali venisse. Vidi ramum comitem nervi secundi, tertii, quarti, quinti, venisse a Thyreoideae ramo adscendentis, qui super atlantem demum in vertebralem infereretur, sexti vero & septimi socios in eo cadavere venisse ab intercostali superiori. Vidi tertium, quartum, quintum, sextum, ex eo trunco venisse. Vidi quartum, quintum, sextum, ab eodem adscendente ramo, septimum ab uno ramulorum anteriorum trunci Thyroidei venisse. Vidi tertium quartum & quintum prodiisse a ramo profundo secundi rami thyreoideae. Vidi cum secundo, tertio, quarto, quinto nervo ramos non a thyreoidea, sed a ramo cervicalis arteriae venisse. Sub atlante demum vertebralis magnum plerumque muscularem ramum dat, nonnunquam ad rectum superiorem, alias ad trachelomastoideum, complexum, & scapulae levatorem, inosculatum ramo cervicalis superioris, super atlantem vero non raro ad occiput dat ramulum ad involucria & orientem complexum WINSLOW n. 97. Alium denique super eam vertebra ad duram matrem medullae spinalis fere semper edit vertebralis, uno furculo transversim in duram membranam inter atlantem & occiput terminatum, alio adscendentem in cranium fossamque cerebelli, sed parvo, & qui vix mereatur inter durae matris arterias recenseri. Habet tamen VIEVSSENIVS depictum I. C. WINSLOW I. C. n. 103. SYLVA I. C. & valde insignem vocat VAVGVYON *th. des oper.* p. 317. Is autem, quem ego vidi, non per foramen condyloideum posterius transit, ut RIDLEYO visum p. 22. sed per magnum foramen occipitis.

e) Tab. Thyroid. I. not. f.

f) Cervicalis alia minor ib. not. b.

- b. Ramus sub quinta subeuns.
- c. Ramus sub quarta, a Thyreoidea adscendente
- d. Ramus sub tertia a vertebrali.
- e. Ramus sub secunda ab eadem cum thyreoidea in-
osculata.
- f. Ramus sub prima a vertebrali.
- g. Occipitalis trunculus in vertebralem insertus. g)
- h. Ramus arteriae vertebralis ad duram matrem super
Atlantem.
- i. Vertebralis arteriae rami profundi ad medullam
euntes.
- k. Eorum Quartus major h)
- 1.2.3.4. &c. Processus transversi cervicis. Arcus at-
lantis solus relictus est, cum reliquas vertebrae
demolirer.


g) Vide in not. b.

h) not. d.



GOTTINGAE,

APVD ABRAM VANDENHOECK, ACAD. TYPOGR.



D. ALBERTI HALLER

ANAT. P. P. O.

T A B V L A E

A R T E R I A E

C O E L I A C A E

P R I O R E T P O S T E R I O R.

L E C T U R I S S.

Nulla magna praefatione hic utendum duxi, qui satis manifestum esse persuasus sum, nullam haecenus tolerabilem iconem totius Coeliacae arteriae, adeo nobilis, datam esse, si ab EVSTACHIANA recesseris, cui viscerum, viciniarumque defectus obstat, ne perinde utilissima sit, uti est artificiosissima. Deinde ante paucos annos nulla pene hujus arteriae notitia fuit, antequam WALTHERVS & WINSLOWVS eam declararent. Sequebantur omnes VESALIUM, magnum virum, sed in vasorum corporis humanis cognitione non perinde perfectum, ut in ossibus musculisque describendis fuit. Ergo ex iconibus, quas multas perfectas habebam, duas sumsi, quae mihi videbantur sufficere explicandae descriptioni: hanc ex magno numero cadaverum brevem, quantum potui, & perspicuam concinnavi. D. 20. Febr. 1745.

ARTERIAE COELIACAE.

TABVLA I.

- A. B. C. D. Γ. Δ. Hepatis facies cava reclinata.
- A. Lobus dexter, ejusque facies cava respondens colo intestino. *a)*
- Γ. Fossa respondens reni.
- B. Lobulus anonymus, inter venam umbilicalem, & vesiculam fellis. *b)*
- C. Lobus sinister distractus, cujus figura paulum corrupta est.
- Δ. Fossa ad radicem lobuli, per quam meant magna vasa hepatis.
- D. Lobulus spigelii. *b*)*
- E. Vesicula fellis.
- F. Fossa umbilicalis.
- G. Pons pene perpetuus, qui partem hujus fossae tegit. *c)*
- H. Vena umbilicalis.
- I. Fossa ductus venosi.
- K. L. Ventriculus ex situ naturali reclinatus, & ab hepate remotus, ut pars aliqua pancreatis adpareat.
- K. Pars proxima oesophago.
- L. Pylorus.
- M. Curvatura duodeni ita reflexi, ut pars duodeni descendens & transversa posterior fiat anterior.
- Π. Lienis transversa *d)* apex.
- N. Pan-

a) COMM. BOERH. T. III. p. 113. In eo libro p. III. per incuriam l. 18. notarum pro *dextro* legitur *sinistro*.

b) Minime iniquum esset, licet forte micrologum, hunc quartum lobum hepatis definire, qui anterior obponitur Spigeliano, major, obtusus, circumscriptus ad dextra fossa vesiculae felleae, ad sinistra fossa umbilicali, ad posteriora fissura magna transversali. Ita VERHEYEN. p. 92.

b)* Eminentia nempe major, papillaris COMM. BOERH. III. p. 114.

c) EVSTACH T. XI. f. 4. Vidi tamen defuisse.

d) Ita plerumque reperio, & recte WINSLOW T. IV. n. 330.

- N. Pancreatis portio.
 O. Ren Dexter.
 P. Alia pars pancreatis, inter duodenum descendens & transversum.
 Q. Omentum gastrocolicum obiter exhibitum.
 Σ. Pars mesenterii.
 Φ. Pars peritonaei tegens vasa mesenterica
 R. Coeliacae truncus.
 S. Aortae truncus *e)*
 T. Appendix diaphragmatis dextra separans venam cavam ab aorta.
 V. Pars capsulae sinistrae.
 X. Phrenica dextra ex coeliaca *f)*

Y. Phre-

e) Aorta transit secundum latus dextrum oesophagi, ordientis curvaturam ventriculi minorem. Ab ea arteria inter lobuli partem sinistriorem, & ventriculi sedem, quae dilatatur ab oesophago, exit *coeliaca*, dextrorsum, antrorsum descendens: quam nunquam vidi eodem cum mesenterica trunco provenire, quod refert GALENUS *de art. & ven. diff.* c. IX. & RIOLANUS. Vidit tamen VESLINGIUS, in fetu, *epist. posthum.* XX.

f) Ex origine coeliaca continuo dat Phrenicas vel capsulares, illas satis frequenter, has ex trunco rarius: vidit tamen CL. PETSCHÉ *Jylog. observ.* n. 49. & ego ter vel quater. Phrenicae, quarum delineatio in alia tabula cum renalibus & spermaticis dabitur, una vel utraque, plerumque ex coeliaca venit, & frequentius quam ex aorta, per meas certe observationes & WINSLOWI *Expos.* III. n. 172. Ex aorta tamen prodeuntes pingit EVSTACHIUS T. XXV. & VESALIUS Tab. p. 484. descripsit GALENUS *diff.* c. IX. VALVERDUS, VIDVS, COLUMBUS, PLATERVS, DIEMERBROECK, KEILIVS & plerique anatomicorum. Vidi etiam unum truncum fuisse, cito bifidum, ut WALTHERVS l. c. KVLMS p. 83. ad D. Vidi tres fuisse, duas posteriores a trunco coeliacae, unam anteriorem a Coronaria sinistra. Vidit CL. WALTHERVS duas fuisse, ex coeliaca utramque, sed alteram ex angulo divisionis *de nerv. interc.* itemque HEBENSTREITIVS ex divisione coeliacae, tamquam quartum ramum ortam vidit phrenicam. Vidi quatuor arterias, duas ex coeliaca, ex aorta duas. Alias tres vidi, aorticas duas, unamque ex coronaria sinistra. Alias coeliaca unam dat, aorta alteram, tuncque frequentius dextra a coeliaca provenit, uti WINSLOW, COWPER app. T. III. 40. DRAKE T. XX. n. 176. LIEVTAUD, PALEYN II. p. 246. Sinistram tamen inde ortam, dextram ex aorta prodire vidit ILL. WALTHERVS *coeliac. tab.* & frequentius esse vult CHESOLDEN *anat. ed.* VI. p. 188. & ego alias vidi. Verum analogia situs pro WINSLOWO est.

Utraque Phrenica adscendit extrorsum, per anteriora appendicis septi, & dat capsulae renali WINSLOW l. c. ramum, quem vidi manifesto cum renalibus vasis communicasse. (WINSLOW l. c. n. 73.) Deinde in septum porro varie absumitur. Bis vidi dextram ramum dedisse ex sede appendicis versus cavae ostium. Is appendici furculum exhibuit, & trans eam ramum dedit tendini sinistro COWPER *Myot.* T. XXXV. N. *sinistri lat.* & medio, carnibusque sternalibus & costalibus, porroque ipse per carnem dextram, circumscribendo oram tendinis, ramosus evanuit. Hujus furculus est, qui ligamentum suspensorium & venam umbilicalem nonnunquam adit, dictus RVYSCHIO *Epist.* V. T. 5. f. 5. & *Epist.* IX. & HEBENSTREITIO *de arter. confin.* Truncus autem extrorsum ivit, & ad imum finem alae dextrae in superius stratum septi, inter tendines faciei thoracicae carnesque abdominales receptus est. Inde ramum ad sedem dexterem tendinis dedit, inter duo tendinis strata, trunco vero descendit in carnem sub ala, indeque dextrorsum abiit, iterumque superficialis facta, ramis alae tendinique dextro datis evanuit. Sinistra vero caetera similis, dat capsulares & appendicales, sed nonnunquam etiam coronariam ventriculi, peculiarem, dictam WINSLOWO n. 176. quae etiam dextrae dedit diaphragmatis appendici. Eadem phrenica furculos dat, qui cum ligamento hepatis

Y. Phrenica sinistra ex coronaria superiori.

- a. Coronaria superior arteria. g)
- b. Phrenica sinistra alia ex aorta.
- c. Coronariae ramus dexter. b)
- d. Alter posterior.

Δ. Ra-

patis sinistro hujus visceris superficiem adeunt. Inde Phrenica trans carnem finistram, accedit ad imum ejus lateris tendinem, dat carnibus infra tendinem positis, fertur trans ortum alae sinistrae, & finditur. Truncus unus sequitur oram alae sinistrae, longe in carnes costales absuntus. Alter tegitur musculo strato, & per ipsam pleuram exit ad extremas usque carnes, a costarum margine eminente circa nonam costam ortos. Ita inveni, perpetuo se habere non dixerim.

His phrenicis datis, ad finem lobuli finistrum, truncus coeliacae saepe tripes fit, in coronariam splenicam, & hepaticam secta, ut primus LOWERY p. 214. descripsit, tum WINSLOW n. 171. VERDIER, LIEVTAUD p. 488. pro ordinaria fabrica, & videtur pingere COWPERVS l. c. cujus tota coeliacae icon obscurior est: Vidit etiam WALTHERVS de ven. port. & ego frequenter. Plerumque tamen finistram coronariam prius edit, quam splenicam, atque adeo unice finditur. Ita EVSTACHIUS T. XXVII. f. 2. & WINSLOW n. 177. & WALTHERVS in ic. & de ven. port. & de nerv. interc. II. & PALFYN corrigé par BOYDON II. p. 246. Vidi duos tantum ramos fuisse coeliacae, nempe splenicam & hepaticocoronariam finistram, cum reliquos ramos coeliacae daret mesenterica. Vidi etiam satis frequenter tripedem fuisse coeliacam, cum edita prius coronaria esset ut WALTHER obs. 3. Tunc hepatica sinistra sive fossae venosae, & dextra, & splenica tripodem fecerunt. Vidi tantum duos ramos fuisse, & coronariam a splenica ortam, quale exemplum pingit etiam EVSTACHIUS T. XXVII. f. 4. & VESALIUS l. c. describunt sequaces omnes, C. BAVHINVS, BARTHOLINVS, D. de MARCHETTIS, I. VAN HORNE, KEIL, BLAS. miscell. p. 83. VERHEYEN T. XXXVIII. ad c. KVLMS T. XVI. HEISTERVS n. 293, & fere omnes anatomici, iis exceptis, quos citavi. Vidi coronariam finistram ex aorta supra coeliacam prodisse. Duos autem truncos coeliacae distinctos fuisse, quod VESALIUS se vidisse refert p. 484. id quidem nondum vidi.

g) Arteria paulo frequentius unice coronaria est, neque enim rarissime praeter ventriculū hepatis maximum ramum exhibet, mereturque nomen Gastrohepaticae sinistrae, impositum ab ILL. WALTHERO. Gastricam majorem dixit C. BAVHINVS p. 56. & DIEMERBROECK, & alii. Gastricam GLISSONIUS de ventric. & intest. p. 116. Gastricam finistram KEIL. abridgm. p. 342. KVLMS l. c. Epigastricam LOWER l. c. Gastricam superiorem WALTHERVS. Coronariam superiorem COWPER l. c. 39. qua voce alii pro unico ramo ipsius usi sunt. Quando soli ventriculo prospicit, tunc minor inter tres ramos coeliacae est. Fertur autem finistrorsum, antrorsum, & accedit ad summam partem curvaturae minoris ventriculi, sub latissima parte oesophagi. Ibi dividitur, hac fere ratione. Ramus superior omnium dividitur iterum. Surculus cum oesophago ascendit in thoracem, ibi consumtus, & inosculatus oesophageis thoracis: alter transversus circumlegit ad coronae modum oesophagi partem latissimam, ramisque suis ultimo in caeco fine ventriculi cum vasis brevibus inosculatur EVSTACH T. XXVII. f. 4. l. l. edit ALBIN. Hunc habet VESALIUS ic. p. 454. z. & L. V. f. 14. d. & f. 15. & f. 12. R. tum VERDIER, LIEVTAUD p. 488. & alii. Idem non raro diaphragmatis parti proximae ramulos exhibet, (WINSLOW n. 181). Vidi, ut in hoc cadavere, omnino phrenicam finistram inde ortam esse.

b) Ramus autem coronariae inferior, major, per curvaturam minorem versus pylorum flectitur: uti VESALIUS ic. p. 484. & L. V. f. XIV. l. EVSTACH. T. XXVII. f. 2. 4. WINSLOW n. 180. LIEVTAUD p. 488. & c. & furculos utrinque ad planum anterius & posterius ventriculi mittit, inosculata ramis Gastroepiploicarum. Haec Gastrica sinistra est C. BAVHINI p. 56. Saepe iste Coronariae ramus non simplex est, sed duplex, aut, ut in hoc cadavere, triplex. Medius anastomosis illam solitam fecit cum coronaria parva, laterales paulum ad utrumque planum divergendo recesserunt a medio. Anastomosis habet EVSTACHIUS T. XXVII. f. 2. LEONCENA Phil. trans. n. 280. WINSLOW n. 180. & alii.

Deinde in hoc cadavere & aliquot aliis, ramus princeps, trunci nomine dignus. Coronariae magnae, hepatis subiit, & hac ratione aliquoties vidi. Id pro perpetuo habet WINSLOW n. 181. vidit CL. PETSCHEN n. 50. & depingit etiam in tabula sua WALTHERVS, & pro frequenti narrat VERDIER; An eadem, quam pro secunda hepatica describit FANTO-

- z. Ramus coronae similis.
- e. Capsularis. *i)*
- f. Splenica peculiaris. *k)*
- g. Splenica. *l)*
- h. Pancreatica, inosculata duodenae.
- o. Coronaria dextra. *m)*
- i. Pyloricae superiores *n)*
- l. Hepatica dextra. *o)*

k. Duo-

nus *Anat. diff.* p. 108? Hic ramus in circuli pene modum conflexus circa lobulum spigelii, subiit fossam ductus venosi, cumque ea venit in fossam umbilicalem, uti ramus coeliacae dexter alioquin solet, datque nonnunquam diaphragmati, ut WINSLOWUS habet n. 181. Alias praeter coronariam, hepatica sinistra, ex trunco coronariae orta, secundum ad ventriculum ramum dedit, ex parte sinisterrima fossae ductus venosi. Alias non magnus truncus, sed rami tamen aliqui, a coronaria magna adeunt fossam ductus venosi.

i) Nempe utraque phrenica, quae ex coeliaca prodit, continuo capsulae fere trunco aequalem furculum exhibet.

k) Haec arteria satis rara est. In hoc cadavere, unde icon est, orta a trunco dextro coeliacae, per pancreatis partem anteriorem, cui dedit, apicem adiit lienis, huicque se immisit, & in ipso lienis sinu cum ramo lienalis vulgaris inosculata est.

l) Truncus dexter coeliacae plerumque splenicam non edit: quae deorsum solet ad pancreas pergere. Hic autem, rariori exemplo, eam produxit, postquam inde secesserat Coronarie. Caeterum splenica in adultis major est, in junioribus superat hepatica. Perpetuo vero hepatica sub lobuli spigelii papilla, & secundum oram curvaturae minoris, tendit antrorsum, & dextrorsum, ad sedem usque pylori, & vesiculae felleae cervicem. In eo itinere paucos ramos dat. Vidi tamen dedisse pancreaticas aliquas. Sed eadem coeliacae dextra propago dat etiam ramulos ad omentum minus, quorum aliquos vidi cum eo omento in fossam umbilicalem venisse, inosculatos ramis comitibus hujus venae.

m) Deinde ad sedem cervicis vesiculae, finemque dextrum lobuli, findi solet, in minorem *Pancreatico Duodenalem*, & majorem, *hepaticam* arteriam: & ea cervix angulum horum vasorum replet. Sed in hoc & frequentibus cadaveribus paulo prius, quam findatur, alias hanc coronariam ramus hepaticus inter dextros sinisterior dedit, alias duodenalis arteria, uti videtur velle EUSTACHIUS T. XXVII. f. 2. & LIEUTAUD p. 489. COWPERUS ex Gastroepiploica deducit l. c. n. 36. Haec arteria est *pylorica* GLISSONII l. c. COWPERI, WALTHERI *de ven. port.* WINSLOWI n. 183. LIEUTAUD l. c. VERDIER, ROYDON l. c. *Gastrica dextra* VERHEYENII p. 570. DIEMERBROECKII p. 478. C. BAVHINI p. 56. D. de MARCHETTIS p. 37. KEILII. Haec etiam VESALIUS ic. p. 484. *p.* Relegit oram ventriculi, quae curvaturam minorem constituit, minor minusque ramosa, & inosculatur coronariae sinistrae, majori WINSLOW n. 183. Deorsum etiam missis ramis cum Gastroepiploica dextra varie conjungitur WINSLOW l. c. Surculos dat omento minori, ductibusque bilariis, communicantes cum arteriis a cystica venientibus, etiam Cl. HEBENSTREITIO observante l. c. sed eos surculos alias Duodena prima edit. Semel minimam vidi, ut tota curvatura minor a sola superiori Coronaria ramos haberet, omnino uti EUSTACHIUS pingit T. XXVII. f. 2.

n) *Pylorica superior* parva, *Gastrica dextra minor* WALTHERI *de coel.* k. una (vel plures) descendens per faciem anteriorem pylori, alias ex duodenali oritur, alias ex Coronaria parva, alias ex hepaticarum aliqua NICOLAI *de direct. vas.* p. 64. Cum coronaria parva exiguos circellos insulasque facit WINSLOW l. c. deorsum vero eundo alios cum pylorica inferiori, alios secundum duodenum cum Duodenali prima, quos Gastricae dextrae tribuit Cl. HEBENSTREITIVS.

o) *Hepatica dextra* arteria est continuatio trunci dextri coeliacae, splenica in pueris major, etiam quando edidit Pancreaticoduodenalem. Plerumque ex origine finditur, in ramum ad-

k. Duodena prima f. superior. p)

adscendentem, five sinistrum, & in ramum transversum, dextrum COMM. BOERH. III. p. 36. Duos etiam habet EVSTACH. T. IX. f. 2. Nonnunquam aliqua sinisterior hepatica prior abscedit, quam duodena orta sit. Ita WALTHERVS *de nerv. interc.* II. Hepatica adeo ante truncum venae portarum (EVSTACH. IX. f. 2. & T. XXVII. f. 1, 2. 4.) pergit, & ei fere parallela, deinde duobus fere truncis, ut EVSTACHIVS ubique pingit, alias tamen tribus & quatuor hepati inseritur, ad fossam umbilicalem, & fossam ductus venosi divisus. Hi rami inde porro ad lobulum, lobum sinistrum, lobumque anonymum dividuntur. Vidi etiam aberrantem inde ramum lobum sinistrum adiisse, qui in propria portione omenti parvi equitabat. A ramo fossae umbilicalis oriuntur surculi ad ligamentum teres & suspensorium euntes. Hi antierius cum ramis epigastricae, adeuntibus venae umbilicalis involucra, (MORGAGNO etiam observante *epist.* I. f. 4.), posterius cum ramis phrenicae aut mammariae arteriae communicant, qui suspensorium ligamentum adeunt. Habet ramulum, sed alieno loco BIANCHI l. c. ab U ad C. Porro in hoc cadavere & alias non raro nullus adfuit ramus in fossam ductus venosi, nisi parvum ramum velis, ab hepatico trunco cum vena portarum in fissuram transversalem missum. Neque defuerunt cadavera in quibus praeter dextram, hepatica sinisterior, & magis superficialis, communi trunco cum duodenali nata est, ut apud WALTHERVM *de coel.*

Dexter vero ramus hepaticae magis perpetuus, tectus vasis omnibus bilariis, profundior in fissurae transversalis finem, caudamque migrat notatam in COMM. BOERH. III. p. 113. Haec est *biliaria* WINSLOWI n. 187. & a WALTHERO pingitur ad c. Dat lobo dextro & spigellii lobulo. Ab eo trunco in hoc cadavere, & alias frequentissime, nonnunquam tamen ab aliqua sinisteriorum, ubi alterutra cervicem vesiculae adigit, *Cystica* arteria oritur, longe plerumque unica, etsi duas numeret WINSLOW 187. VESALIUS p. 490. & ic. p. 484. C. BAVHINVS, HEISTER, KVLMS, & nonnunquam duas esse viderit LIEVTAUD. Ea dextrorsum ad cervicem vesiculae exit, duobusque ramis eam amplectitur, anteriori evidente, & inferiori profundo. Una etiam est ORIBASIO *anat.* p. 122. PECHLINO *obs.* 59. Cent. I. WALTHERO *de coel. & ven. port.* LIEVTAUD. p. 490. VESALIO L. V. f. 25. p. 623. SPIGELIO L. VIII. T. VIII. f. 1. RVYSCHIO *Epist.* V. T. 5. f. 4. COWPERO l. c. 34. BIANCHO *hist. hep.* T. II. ab u. ad i. HEBENSTREITIO *de arter. confn.* & accuratioribus anatomicis. Uterque ramus in nerveam tunicam vesiculae ramos dat, sed trunco suo in hepatis sede proxima finitur. RVYSCH l. c. uti vicissim ab arteria majuscula, replente fossam vesiculae, ut nunc video, vel a vicinis hepaticis, ut alias vidi, & RVYSCHIVS habet l. c. g. ramuli ad vesiculam veniunt, visi etiam HEBENSTREITIO l. c. Eadem etiam cystica ex principio suo surculos dat ad bilarios poros, communicantes cum duodenali prima, & simillimi etiam ex hepatica eo veniunt. Bis vidi omnino, duas cysticas fuisse, vidi unam, & natam a ramo hepaticae cum mesenterica communicante. Vidi duas, unam a dextra hepatica ortam, alteram a sinisteriore, & ita vidit ILL. WALTHERUS *de ven. port.* Vidi in hoc ipso cadavere, secundam cysticam posteriorem & reconditam, vesiculae partem cervici proximam adiisse, ex cysticae trunco ortam. Verum non ea haec est, quam gemellarum alteram vocant auctores.

Caeterum quinquies vidi arteriam hepaticam dextram, quae tecta vena portarum, & vasis bilariis, adiit hepatis magnam fossam, a mesenterica venisse, ex dexterrima sede pancreatis ortam. Sed alias cum ea hepaticae aliae a coeliaca dexteriores adfuerunt, ut etiam Cl. PETSCH vidit n. 51. & WALTHERVS: tunc hepatica a mesenterica respondet dextro recondito ramo coeliaco. Alias omnino nullae praeter eam, quam generat coronaria, fuerunt hepaticae, uti in observatione etiam Cl. PETSCH fuit. Quoties adest, generat cysticam, & aliquando pyloricam, & duodenalem, WALTHER *obs.* 3. Hanc hepaticam habent D. de MARCHETTIS *comp. anat.* p. 27. WALTHER in progr. ad diff. de *intest. angust.* *obs.* 3. NICOLAI *Comm. Lit. nor.* 1732. heb. 33. KRÜGER *anat. rheodid.* p. 10. CHESELDEN. *anat.* T. XX. f. 7. edit. III. & ed. VI. p. 188. PETSCH l. c. n. 49. 51. HENSING *de perit.* n. 41. WINSLOW n. 189. MOSEDER *diff. de vesic. fell.* p. 8. Alias hepaticas minutas a phrenica dixi. Addo nunc mammarias, non solum ex ipso recto musculo dare surculos in venam umbilicalem, communicantes cum hepaticis, sed me semel vidisse mediastinam illam vulgo dictam, vel phrenicam supremam, & semel ramum mammariae internae, ad quartam costam ortum, per foramen septi, inter laminas mediastini, ad diaphragmatis tendinem venisse: & utramque observationem reperire apud Egregium virum D. HENSING *de periton.* n. 41. Hae in meo exemplo & diaphragmatis parti sinistrae & convexa hepati late inservierunt. Denique vidi a renali dextra arteria ramum superficiale ad lobum dextrum hepatis venisse, uti reni proximus est, longe per hepar distributum.

p) Pancreatico duodenalis arteria, five trunci dextri coeliacae ramus descendens, retro pylorum descendit,

- l. Ramus ad cystidem.
- m. Pancreatico duodenalis. *q*)
- n. Gastroepiploica dextra. *r*)

n. Du-

scendit, (EVST. T. XXVII. f. 2. 4.) in icone altera porro adparitura. Habet etim VESALIVS p. 484. Prius tamen, quam se abscondat, dat, sed rarius, hepaticam parvam in fossam umbilicalem euntem, quae alias ex trunco prodit: perpetuo vero *duodenam superiorem, dextram*, unam, ut in hac icone, aut duas. Vidi tamen eam ab hepatica aliqua venisse. Vidi tres fuisse trunculos, a Duodenali omnes. Haec arteria dextrorsum relegit duodeni partem transversalem, tum partem descendentem, transeundo ad dexteriora ductus choledochi, quem decussat, adposita dexterior, & ad dexteriora & posteriora pancreatis, dat huic & duodeno, ultimo vero in parte posteriori pancreatis, in ima parte descendentis sedis duodeni, sinistrorsum recurvata inosculatur ramo duodenali Mesentericae, ut EVSTACHIVS habet T. XXVII. f. 2. & 4. & WALTHERVS *de coel.* Quando duae sunt, tum inferior eademque longior, hanc facit anastomosis. In principio suo etiam anastomoses habet cum Pylorica superiori. Dat non raro ductibus bilariis. In hoc cadavere cum peculiari ramo pancreatico mesentericae inosculata est. Sed in eo cadavere & in aliis plussculis, Duodena superior brevis fuit, dimidioque duodeno descendenti unice prospexit, reliqua pars omnis hujus intestini; quam solet occupare, habuit arteriam a mesenterica superiori. An hanc vult WINSLOW n. 186? Ea arteria statim sub pyloro, retro pancreas, demersa, divisa est in tres ramos. Sinister ad duodeni partem ultimam abiit, quae sinistrorsum adjacet Mesentericis vasis. Medius in ipso pancreate descendente inosculatus est, & Pancreaticae, & secundae duodenali a Mesenterica ortae. Dexter autem ramus, sive is, de quo agitur, retro pancreas erepsit, conscendit duodenum, prospexit ejus partis descendentis faciei posteriori, tum partis transversae alterius, fursum cum Duodena dextra.

q) Porro *Pancreatico Duodenalis*, dum retro duodeni principium, ante pancreas descendit, dat ramos ipsi duodeno, alios parvos, alios longiores, ad flexionem transversam primam: Ubi autem finem inferiorem est emensa duodeni, vel paulo supra, dat ramum *Pancreaticum transversum*, quem alias mesenterica producit. Is sinistrorsum per faciem posteriorem & carnem pancreatis longe, & pene ad duas tertias hujus glandulae sinistram ramosus exit. Vidi eum dedisse fere in principio *epiploicam posteriorem* ex majoribus, ad partem dextrissimam omenti Gastrocolici, ipsumque colon. Hic ramus alias seorsim venit a Pancreaticoduodenali, alias & plerumque, a gastroepiploica dextra, ut WALTHER *de coeliac.* f. Nostro vero modo vidit LIEVTAUD, cui est *Epiploica dextra* p. 489. In eodem etiam retro duodenum transitu, minutis ad pancreas editis ramulis, cum aliis exiguis furculis transversis trunci mesenterici communicat. Sub duodeno vero primo loco Pancreaticoduodenalis ad dextra dat *Pyloricam inferiorem*, ad ventriculi partem inter curvaturas mediam, & proximum duodenum. Ea & cum ramis Pyloricae superioris perpendicularibus, & cum ramis Gastroepiploicae dextrae, & cum Pancreatico Duodenali insulas facit.

r) Ad sinistra vero educiteadem Pancreaticoduodenalis, ad rectum angulum, magnam *Gastroepiploicam dextram* C. BAVHINI, D. de MARCHETT., DIEMERBROECKII p. 478. GLISSONII, HEISTERI & plerorumque: *Gastricam dextram* WINSLOW n. 184. LIEVTAUD p. 489. KVLMI l. c. BOVDON: *Gastricam majorem* SPIGELII L. IV. T. VIII. f. 1. 2. *Coronariam inferiorem* COWPERI n. 35. VESALIO pingitur ic. p. 484. *r.* & L. IV. f. 14. 15. c. f. 2. h. f. 4. o. o. Ea cum omento, secundum curvaturam ventriculi majorem, distans a ventriculo, natansque in omento, fertur ad sinistra, ramis tum ad utrumque planum ventriculi, tum deorsum vel antrorsum ad omentum datis EVSTACH. T. IX. f. 2. VESAL. L. V. f. 4. 9. f. 3. a. b. Earum aliqua dexterior est *Epiploica minor* LIEVTAUD p. 489. *dextra* VERHEYENII, BOVDON, DIEMERBROECK, KEILII, KVLMI & aliorum. Eae epiploicae ad colon delatae, varie, sed parvis ramis, cum arteria colica media inosculantur WINSLOW n. 185. Vidi etiam ramulos inde ad vesiculam bilis una cum membranis omento minori continuis venisse. Sed Gastroepiploica, omentalibus datis & ventricularibus, & furculis numerosis ad glandulas, quae in ea curvatura jacent, absuntis, ultimo occurrit ramo dextrissimo Gastroepiploicae sinistrae, & cum ea continuatur EVST. T. IX. f. 2. T. XXVII. f. 2. WINSLOW n. 185. LIEVT. LEONCENA in *Phil. trans.* n. 280. (cujus icon caeterum multis modis vitiosa est). Alias non trunco, uti neque EVSTACHIVS T. XXVII. f. 4. neque VESALIVS habet, sed ramo aliquo haec communicatio perficitur: uti obscuram vidit hanc communionem Cl. HEBENSTREITIVS. Sed anastomosis frequentior, est

Trun-

- n. Ductus cystici alia arteria.
- o. Cystica.
- p. Cystica alia.
- q. Hepatica sinistra.
- r. Arteria ligamenti suspensorii.
- s. Ductus cysticus.
- t. Ductus hepaticus.
- v. Ductus choledochus.
- u. Epiploica dextra arteria s)
- y. Rami omentales.
- z. Colica media. t)
- a. Arteriae mesentericae.
- β. Ileocolica.
- γ. Vena Cava.
- δ. Vena Portarum.
- ε. Vena emulgens sinistra.
- ζ. Arteriae renales.
- η. Spermatica vasa,
- θ. Ligamentum finistrum hepatis.

Truncus autem *Pancreaticoduodenalis*, *Duodena* WINSLOW n. 186. LIEVT. p. 489. ROVR-
DON, KVLMS, HEIS TER &c. dicta VESALIO p. 490. *Intestinalis* C. BAVHINI, DIE-
MERBROECK p. 478. KEILII, aliorum, in semicirculi fere speciem cavae curvaturae duo-
deni parallelus circumit, ante pancreas, ubi crassissimum est, dat huic glandulae, &
duodeni transversi primi, descendenti, & transversi secundi faciei anteriori, ultimoque
inofculatur ramo mesentericae superioris, vel qualem descripsi ex hoc cadavere, vel alte-
ri, simili, inferiori, in ea sede pancreatis ortae, quae proxime dexterior est magnis
vasis mesentericis. Is in dextrum & finistrum trunculum findi solet. Sinister adit o-
riens jejunum & duodeni partem maxime finistram. Dexter vero supra duodenum trans-
versum secundum & Pancreatico Duodenali trunco, & Duodenae primae inofculatur, illi
ante pancreas, huic pone idem, totidem ramis suis: Ita voluisse EVSTACHIUM manife-
stum est ex utraque icone T. XXVII. Hic caeterum ramus mesentericae pancreaticus
inferior, idemque intestinalium primus, alias supra colicam mediam arteriam, ut in hoc
cadavere, alias infra eam ortus est, alias vidi duodenalem ramum mesentericae ab eo ramo
venisse, quem mesenterica dabat hepati.

t) De his vasis proprio loco dicetur.

E X P L I C A T I O.

T A B V L A E II.

- A. B. Hepatis dextrorsum reclinati dexter lobus.
r. Lobus sinister.
Δ. Lobulus SPIGELII.
C. Vesicula fellis.
D. Ren dexter.
E. Ventriculus ita directus, ut orificium utrumque retrorsum spectet, fere uti in summa plenitate.
F. Oesophagus.
⊙. Omenti gastrocolici portio.
G. Pylorus
H. Duodeni portio descendens.
I. Duodeni portio transversa altera.
K. Ejusdem pars sinistra & oriens mesenterium.
L. Ren sinister.
M. Lien in situ naturali.
N. Pancreatis planum anterius.
O. Pancreatis planum posterius extroversum.
P. Arteria mesenterica transeuns retro duodenum, & ante pancreas.
Q. Arteria colica media.
R. Truncus coeliacae.
S. Arteria coronaria superior.
Φ. Φ. Venae portarum rami mesenterici.
T. Vena portarum paulum dextrorsum revulsa.
U. Arteriae coeliacae ramus dexter.
X. Ejus truncus hepaticus.
Y. Duodenalis.
Z. Arteria gastroepiploica dextra, curvaturam majorem ventriculi relegens.
a. a. Arteriae pyloricae inferiores duae a)
b. Arteria Pancreaticoduodenalis magna, relegens curvaturae cavam partem.

c. Rami

a) Vide T. I.

- c. Rami ad duodenum. γ . ad pancreas. ϵ . anastomoses cum pyloricis parvis.
- d. Pancreatica longe sinistrorsum transversim exeuns b)
- e. Insectio arteriae a splenica in Pancreaticoduodenalem. c)
- f. Ramus arteriae a mesenterica in eandem inosculatus. d)
- g. Locus insectionis duodenae primae.
- h. Arteria splenica e)

i. Rami

- b) Haec eadem modo a mesenterica provenit, modo a splenica: semper autem ex ora inferiori pancreatis exit, & exiguis ramis adit Mesocolon transversum, inter magni arcus intestinalis crura, perque hoc mesocolon spargitur, passim inosculata ramis Colicae mediae. Arteriae vero, quas ex dextro & sinistro trunco coeliacae VESALIUS deducit ad colon, vel inferiorem omenti membranam, variis locis, (ut L. III. p. 484. ϕ . B. L. V. f. 4. x. nunquam ita reperiuntur, & unice a magno viro depictae sunt, quod iis in locis venae revera a gastroepiploica, & a splenica ad colon transversum emittantur. Sed harum venarum comites arteriae sunt a mesenterica superiori, uti notissimum est, & icone proxime exprimitur. Easdem arterias repetit VALVERDVS, cujus fere omnes descriptiones arteriarum ex VESALIO sunt, & VIDVS VIDIVS L. III. c. 17. p. 138. & PLATERVS p. 117. & ROLFINK. *diff. anat.* p. 1154. & BAVHINVS qui Epiploidem dextram, & Epiploidem positicam vocat, p. 56. & RIOLANVS p. 114. cujus pessima descriptio est, l. c. & DIEMERBROECK & GLISSON. Unum enim VESALIVM plerique anatomicorum exscribunt.
- c) Hic ramus *splenicae* primus *Pancreatica suprema*, satis frequens est, & ex ortu fere dextrorsum ante pancreas, retro sedem pylori fertur, modoque duodeno faciei posteriori statim sub pyloro, modo pancreatis capiti infumitur. Inosculari vidi Pyloricae inferiori, in loco adhuc a duodeno tecto, hic autem Pancreatico duodenali ultimae. Eundem ramum vidi venisse a trunco coeliacae supra tripodem, ut in hoc ipso cadavere. Vidi etiam ex aorta prodiisse, supra coeliacam, communi trunco cum coronaria sinistra COMM. BOERH. III. p. 34. Venam sociam videtur describere C. BAVHINVS p. 50. Vidi ejus locum tenuisse arteriam ex mesenterica, omnium primam ortam, quae retro pancreas divisa, hinc ad dextra, inde ad sinistra, ad mesocolon transversum venit, inque colon est terminata; Communicabat autem cum Gastroepiploicis.
- d) Nempe Mesentericae arteriae rami duodenales vario modo se habent. In cadavere, cujus prima icon est, duae erant, earumque & superiori & inferiori inosculabatur Pancreatico duodenalis. In eo, cujus haec secunda icon est, unica fuit, bifida, eaque non egressa limites duodeni transversi secundi, & inosculata tum Pancreaticoduodenalis trunco, tum duodenae superiori sive dextrae. Hujusmodi arteriam habet WINSLOW n. 197. Uterque casus frequens est. Hi rami vero diversi sunt a minimis furculis, qui cum Pancreatico duodenali, retro duodenum, per pancreas transversi communicant.
- e) *Splenica*, plerumque tertius ramus coeliacae, idemque in adultis hepatica major est, secundum observationes ILL. WALTHERI *de coel.* BOYDON I. c. olimque VESALII p. 490. BARTHOLINI & aliorum. In cadavere nostro rami dextri propago fuit, nunquam autem ex aorta prodeuntem vidi, quod olim DRELINCORTIUS descripsit, & alii, & ex iis TILINGIUS *de vas. brev.* p. 95. Descendit ad pancreas, oram legit supernam hujus glandulae, descendit iterum ad finem ejus, & denuo fit transversa, sic serpentinis alternationibus ad cavum lienem venit ARANTIO observante *obs. anat.* c. 35. & SPIGELIO L. VIII. T. 9. f. 1. 4. DIEMERBROECKO p. 478. RVYSCHIO *epist.* III. T. 4. WINSLOWO n. 194. DRAKE I. c. 41. BIDLOO T. 36. f. 1. WALTHERO *de ven. port.* Non optime ergo rectam pingit EVSTACHIVS. Denique lienis finem relegit multis, octo etiam & decem, ramis ipsi immerfa. Ex postremis vero ramis splenicis, cum omento, furculi tres fere quatuorve cum nomine *vasorum brevium* ad caecum saccum Ventriculi veniunt EVSTACH. T. XXVII. f. 2. 4. WINSLOW n. 194. VESAL. p. 484. ζ . L. V. f. 14. 15. g. Eorum supremus sub ligamento ab apice lienis ad ventriculum eunte proxima est. Ramuli a splenica alii ad diaphragma, dicti sunt RVYSCH. *Epist.* IX. p. 11. Ex ipso denique liene non raro furculi a splenicis ramis in pancreas remittuntur.

- i. Rami pancreatici *e**)
- k. Rami Gastrici posteriores *f*)
- l.l. Rami splenici
- m. Arteria Gastroepiploica sinistra *g*)
- n. Ejus anastomoses cum dextra
- o.o. Vasa brevia


*e**) Splenicæ arteriæ rami sunt *Pancreatica* descendens not. *c.* quæ tamen alias nullam cum duodenali communionem habuit, sed ex imo pancreate ad mesocolon exiit, not. *b.* Deinde *Pancreaticæ parvæ* quæ ex tota longitudine splenicæ numerosæ descendunt. EVSTACH. T. XXVII. f. 2. 4. &c.


f) Hujusmodi rami splenicæ arteriæ minime infrequentes sunt, adeuntque ex ipsa superiori & fere medio ora pancreatis, ventriculi tuber sinistrum, sub oesophago, in facie dexteriori, eoqne cum omento delati veniunt EVSTACHIVS T. XXIV. f. 2. 4. absque literis: CASSERIUS L. V. T. I. WALTHER *obs.* 3. *de ven. port.* p. XI. Hæ videntur esse *Gastricæ sinistræ* VERHEYENI, BOVDON aliorum.

g) Tum, ad finem pancreatis sinistrum, aut ad duas tertias pancreatis exit ex splenica *Gastroepiploica sinistra* C. BAVHINI, D. de MARCHETTIS, GLISSONI, DIEMERBROECKII; *Gastrica sinistra* WINSLOW n. 191. LIEVTAUD p. 490. dicta VESALIO p. 491. & ic. p. 484. *e.* L. V. f. 14. 15. ad k. f. 3. d. f. 4. *ζ.* Ea arteria antrorsum emergit & deorsum, magnoque ambitu ventriculum, a quo remota est, longis tribus quatuorve posteriori omenti faciei innatantibus flexuosis ramis adit, neque unum plerumque truncum habet, parallelum ventriculo, uti dextra solet *Gastroepiploica*. Alias, ut in hac icone, eadem verus truncus est splenicæ, tuncque lienales ipsi pro ramis sunt. Surculi hujus arteriæ perpetui, primi, Pancreas adeunt, WINSLOW n. 192. LIEVTAUD p. 491. Sequentes, dexteriores, omentum & colon, WINSLOW n. 192. Ventriculares vero rami in utroque plano cum Coronariarum ramis descendentibus inosculantur. Ramorum, qui ultimus est trunci nomine venit, & ventriculum propius originem omenti circumlegens inosculatur ultimo fini *Gastroepiploicæ dextræ* EVST. T. XXVII. f. 4. Alias in medio fere pancreate finditur splenica: Ramus superficialis *Gastroepiploica* est, a qua unus & alter ramus ad summum lienem venit, profundus splenicæ truncum continuat. Ita coram video, & habet LOWERVS p. 214.

Rami vero *gastroepiploicæ omentales* varii sunt, alias parvi omnes, alias unus reliquis major, qui meretur *Epiploicæ sinistræ* nomine distingui. Id nomen C. BAVHINVS p. 56. & WINSLOWVS habet n. 194. & LIEVTAUD p. 490. & D. de MARCHETT. & DIEMERBROECK p. 479. & VERHEYEN. p. 370. & KEIL. & KVLMS. Habet etiam VESALIUS p. 491. & ic. p. 484. ad *γ.* & *e.* L. V. f. 3. sub d. f. 4. prope *ζ.* Eorum ramorum aliqui dant ligamento suspensorio lienis, & cum eo, vicino colo.









LECTORI S.

ALBERTVS HALLER.

Cum in ea turba cadaverum, quam nobis munificentia Maecenatum subpeditat, non possimus non varia videre uberius, constitueram sensim anatomicas parare icones vasorum, & viscerum, prouti aliquam partem corporis minus accurate expositam viderem. Aderat rara opportunitas egregii delineatoris & Prosectoris solertissimi, D. CHRISTIANI IEREMIAE ROLLINI, amici & contubernalis mei, qui patientia laboris, & fida umbrarum expressione, & indefesso perfectionis amore plerosque pictores superaret. Hi enim homines, ut exercitati sint in arte delineandi, nescio quam tamen elegantiam, & semiveram pulchritudinem iconibus adfingunt: parci-que temporis, compendia laboris sequuntur. Maluissem equidem premere diutius icones, nonoque repolire anno, imitatus ALBINI sapientem tarditatem. Semper enim superest, quod lima deterat, quod recentior in-

*industria effingat felicius. Sed hoc consilium cessit ur-
gentis bibliopolae spei & desiderio: eoque faciliorem
me praebui, quo manifestiora exempla adsunt docto-
rum virorum, quos in expoliendis laboribus aeternum
occupatos, suique calumniantes, dies oppressit ultima,
& ea omnia delevit, quae potuissent, etiam imperfe-
ctiora, publice profuisse. Ergo subinde, prouti favebit
ocasio & ocium, iterare iconum anatomicarum fascicu-
los visum est, nullo certo quidem fine circumscriptos,
vasis tamen corporis humani inprimis destinatos. Re-
cipe ergo, quae praesto fuerant, LECTOR BENE-
VOLE. Narium autem internarum icones, dudum
sculptas, & arteriae mesentericae, & minorum ar-
teriarum systematis renalis & spermatici, & pelvis
arterias, et carotidis reliquos ramos expecta: ea-
rum enim figurarum aliquae pene absolutae, omnes
autem adfectae sunt. Vale. D. 4. Mart. 1745.*



D. A. L.

D. ALBERTI HALLER
ANAT. P. P. O.
I C O N E S
V T E R I H V M A N I.
L E C T U R I S S.

In priori fasciculo icon uteri exstat Cl. HUBERI, qui ex theatro anatomico, cujus cura mihi mandata erat, Cassellas vocatus, ibi Professoris et Medici Aulici dignitate auctus est. Plurima etiam eorum, quae de columnis, lacunis, & carunculis dicenda habebam, vir Cl. occupavit, & ita proposuit, ut cum ipso omnino sentiam. Non ideo tamen visum est omittere novas meas icones, novasque observationes. Illas dedi, quod mihi vehementer placeant, ut quae summa fide, & artificio non vulgari, a Cl. ROLLINO, D. HUBERI successore, delineatae, & satis, si ita definire licet, feliciter sculptae sint, & passim a prioribus differant: Istas nolui premere, quod & consensu suo, & dissensu non inutiles esse videantur: & ea enim firmiora fore putavi, quae nobis similiter visa essent; & nova aliqua, aut aliter a me reperta, hanc historiam uberiores redditura esse, deque dubiis lectorem monitura. Scriptores ex integro contuli, & aliter forte eorum monumentis sum usus: certe eorum memoriam, qui ante me aliquid invenissent, nullo modo credidi praetermitti posse, etiam si ab alio prius fuerint adlegati. Cum mea HUBERIANAM descriptionem comparavi: cum vero fusa sit, & multo quam mea longior, omnia excitare, aut ad amissum conferre non potui. Candidi tamen hominis duxi indicare, prae oculis mihi fuisse veteris discipuli & convictoris opusculum. Dabam D. 27. Febr. 1745.

E X P L I C A T I O.

F I G V R A E I.

- A. Uterus.
- B. Craffities uteri.
- C. Cervix a latere aperta.
- D. Tumor eminens oris uteri
- E. Valvulae cervicis, in hoc cadavere confusiores. *a)*
- F. Ovula Nabothi.
- G. Ligamentum teres.
- H. Tuba lateris dextri.
- I. Lacinae in quas expanditur.
- K. Ovarium in situ.
- L.L. Ovula varia integra & dissecta. *b)*
- M. Vasa alarum vespertilionis.
- N. Ovarium finistrum, rimosum *c)*

O. Pars

a) In plusculis nuper cadaveribus non bene se habuerunt, ut oportuerit iconem dare ex cervice puellae recens natae, cui pulcherrimae fuerunt. Rudes enim fere erant, quas apud auctores vidi, cervicis icones. Haec autem mihi fabrica constantior, etsi non perpetua visa est, ut duae columnae sint, & arborum quasi trunci, anterior & posterior, uterque non strato, quasi verrucoso, ut in vagina, factus, sed simplici, callosa magis eminentia, acuto dorso eminet. Ab utroque trunco exeunt valvulae sursum tendentes, extrorsum, ad vaginam cavae (MORG. *adv.* I. n. 14.) in aciem extenuatae MORG. *ib.* sibi ab anteriori & posteriori columna occurrunt, in arcum flexae brevem, parum cavum. A qualibet valvula, quae in arcum flexa est, numerosae membranulae breves, quasi pectinis figura, ad proximam aliam valvulam, aut descendunt, aut transversae exeunt, interque has membranulas sinus sunt mucosi, quem mucum in recens natis copiosissimum, lactis colore & consistentia puris, video vaginam, & uterum replere. Caeterum hanc meam descriptionem, repetito factam, confer cum *Comm. Boerb.* V. P. II. p. 209. & adde, saepe confusam fabricam esse, & inordinatas valvulas, nobiscum tamen WINSLOWVM fere sentire T. IV. n. 598. & SANTORINVM p. 214. Sed MORGAGNI etiam cervicem duos truncos habere crediderim, etsi paulo incommutius sculptos repraesentaverit *Adv.* I. T. III. f. 1. Neque de TREWIANIS iconibus dubito, etsi unicum truncum nominet Vir ILL. *Commerc. Lit.* Nor. 1731. *spec.* 7. p. 52. & pingat 1736. T. 2. f. 5. ad *hebd.* 32. 1735. *hebd.* 39. T. IV. f. II. Nam unam anatomicus fere destruit, dum cervicem aperit. Morbus harum valvularum est, quem nuper vidi. Appendix nempe fuit, uvulae prolapsae similis, pendula in ostium, & nonnunquam ovis NOUVESIANIS distincta, qualem etiam RIOLANVS vidit p. 197. & NICOLAI *Comm. Lit.* 1732. *hebd.* 32. Nuper etiam in femina matura pene nullas valvulas vidi, nullasque vesiculas.

b) Inter haec ovula unum fuit, in hoc ipso corpore, sed in altero ovario, avellanae mole, liquore turbido & sordido plenum.

c) Uti solet, maxime in vetustioribus corporibus.

- O. Pars Peritonaei servata, vasa habent a spermaticis
- P. Arteria spermatica.
- Q. Venae truncus.
- R. Venae minores.
- S. Corpus pampiniforme.
- T. Vasa ovario inserta
- U. Alia vasa ad uterum descendunt.
- X. Tuba sinistra vasculosa.
- Y. Ligamentum sive ala vesperilionis.
- Z. Lacinae tubae vasculosae.
- a. a. Ureteres.
- b. Arteriae ureteris ab hypogastricis
- c. Arteriarum uteri & vaginae plexus *d)*
- d. Vesica reclinata.
- e. Vagina
- f. Pars posterior, in qua leves rugae fere transversae *e)*
- g. Maculae in vagina frequentes *f)*
- h. i. Trunci rugarum vaginae
- h. Rugarum truncus anterior *g)*

i. Alter

d) Vide vasa uteri & ovariorum in *Comm. Boerh. Tom. V. P. I. ad num. 656.*

e) Haec pars vaginae non raro omnino levis est *GRAAF de mul. org. 79.* dimidia (*MORGAGNO observante advers. l. p. 10.*), & nonnunquam major, certe in adultis. Nam in junioribus ita vidi valvulosam & papillosam, ut etiam asperior esset, quam in vaginae aditu, & ipsa denique uteri cervix exterius asperis lineis percurreretur. Sed contra integram vaginam, nonnunquam obscure valvulosam vidi, detritis rugis omnibus, ut etiam superior columna, adeo elegans, aegre vestigia sui relinqueret. Haec tenus ergo recte *LINDEN. phys. p. 316. GRAAFIUS p. 80. PLAZZONVS p. 114. 115. LAMY des sens p. 151. MORGAGNVS adv. l. p. 10. HYBERVS, & alii, qui rugas vaginae per aetatem aut venerem deleri dixerunt.*

f) Hujusmodi nigricantes, leves, planas, maculas frequenter vidi, neque, quid sint, possum haec tenus definire. An fontes mensium? quia similes maculis uteri? Sed menses ex vagina fluere non probabile fit *COMM. BOERH. V. P. II. n. 665. not. m.*

g) Celebres illae carunculae, a *PINAEO* hymeni subrogatae, duorum ordinum sunt, & duplicis generis. Primum genus, quod in incorruptis virginibus retro hymenem adparet, sunt omnino apices carnosus, verrucosi, tumidi, obtusi, columnarum, quae proxime describuntur. Eae sunt carunculae, retro hymenem posita *SCHRADERI obs. anat. 7. Dec. I. Eadem descripsit MORGAGNVS Adv. IV. n. 23. 24. & HYBERVS p. 44. 45.* Harum numerus binarium naturaliter non excedit, uti duas etiam carunculas facit *VIGIER Enchir. Chirurg. p. 58.* Si plures adsunt, tunc omnino bifidae columnae, sed maxime anterioris, cui frequentius id contingit, alter apex secundae carunculae intermediae nomen gerit. Tres carunculas adeo non raro vidi, & *D. de MARCHETTIS p. 30.* Haec nunc carunculae nihil cum hymene aut virginitate commune habent, neque adeo absque discrimine oportuerat dixisse *GARENGEOTVM*, deflorationis testes esse, & nullas in virginibus reperiri *II. p. 52.* *PINAEVM* autem utcumque excuso, qui virginitatis notam posuit

fuit in quatuor carunculis, membrana connexis *de not. virgin.* p. 66. eumque secutos fere omnes eius aevi anatomicos, ut LAVRENTIVM L. VII. c. 12. SPIGELIVM *hist. an.* p. 256. PLAZZONVM p. 112. D. de MARCHETTIS p. 50. READ *abridgm.* p. 122. C. BARTHOLINVM *inst.* p. 166. TH. BARTHOLINVM *anat. renov.* p. 290. MAVRICEAV *malad des femm. gross.* p. 31. VENETTE *art.* III. DIONIS *des acouch.* p. 53. aliosve. Excusationis ratio est, quod omnino columnarum apices hymeni innascantur. Male tamen hi viri, & princeps PINAEVS, deflorationem in eo poluerunt, ut prima caruncula anterior rumperetur. deinde posterior, ultimo reliquae p. 69. 70. cui commento vix explicatio invenitur. Neque magis placet PINAEVS, quando tunc virgines esse declarabat puellas, quando quatuor hae carunculae integrae essent p. 73. quem sequuntur DEVAUX *art de faire les rapports* p. 430. DIONIS *cours d'anat.* p. 300. aliique. Neque ullo modo confirmo SCHELLHAMMERI in *Franc. satur.* p. 16. aut PASCOLI *de homine* III. p. 58. 59. aut VENETTI, aut aliorum innumerorum opinionem, hymenem ab incorrupta virgine abesse, ejusque loco adesse carunculas. Gratus adeo adgnosco RIOLANI merita, qui fictitias carunculas refutavit, hymenemque restituit p. 187. ut, quae adeo perpetua, & certa particula sit in fetu, infante, puella, virgine.

Alterum genus caruncularum ante priorem ordinem, in feminis virum passis conspicitur, ut tamen etiam columnarum apices videam nonnunquam protuberare ex pudendo, moleque sua has anteriores carunculas obscurare. Hae nunc conicae callosaeque cristae vulgo ad hymenis destructi reliquias referri solent. Ita MVNNIK *de re anat.* p. 54. RAV apud VALENTINVM p. 95. FANTONVS p. 183. WELSCHIVS *tab anat.* LII. MORGAGNVS *advers. anat.* I. p. 33. GARENGEOT. *splanchnol.* II. p. 52. WINSLOW n. 654. HVBERSVS p. 46. Sed MORGAGNVS in *Quartis Adversariis* mollit sententiam I. c. & partitas laceri hymenis, & columnarum, in carunculis faciendis vices admittit: HVBERSVS autem manifesto utrumque genus distinguit. Ego vero timidius ita definio. Certe, si hymenis essent reliquiae, oporteret maximam esse in sede ani, minimam sub urethra, quod illic maxima hymenis latitudo, hic minima sit; oporteret etiam eas repetito concubitu, per multam venerem, & iterata puerperia minui, & deleri. Verum ego non video aut illam rationem unquam sequi, aut deleri, per istas causas. Quare eo animus meus inclinatur, quo MERCVRIALIS, apud MORGAGNVM *adv.* I. n. 29. hymenem nempe saepe omnino obliterari potius, quam rumpi: Carunculas vero anteriores refero ad valvulas illas pronai incrassatas, quae puellis teneris membranae, feminis crassae sunt fungosaeque, posteriores autem ad valvulas, quae comprehendunt lacunas BARTHOLINI, & video eo etiam inclinare HVBERSVM p. 47. etsi aliam videatur profiteri sententiam. Sed non oportet excludere cristas verrucosas, alioquin circa has partes frequentes, ferratas, passim efflorescentes. Quare nunc etiam quinque coram video in muliebri corpore carunculas, praeter tres columnarum apices.

Facile nunc sequitur, incertum caruncularum numerum esse, neque ullo modo ad quaternarium reduci posse, quem fixit PINAEVS, & plurimi, ut fieri solet, ab eo receperunt, ut WHARTONVS *adenogr.* p. 234. SPIGELIVS *de form. fet. f.* ult. MOLINETTVS p. 326. PLEMPIVS, LINDENIVS *phys. reform.* p. 321. MAVRICEAV *ic.* p. 6. DIONIS *Cours d'Anat.* p. 300. & ipse nuper Cl. HVBERSVS p. 44. Ego vero utriusque seriei incertum numerum invenio, & conjunctim facile quaternarium superare, separatim autem ad eum internam seriem non pervenire, externam facile superare. Accederem adeo potius HEISTERO, qui a duabus ad quatuor numerat carunculas p. 101. aut D. NICHOLLS, qui incertum numerum, aut MAVRICEAV *ic.* p. 27. & 32. aut GARENGEOTO I. c. qui nonnunquam quinas viderunt, si hi viri duos earum ordines distinxissent: quam eandem distinctionem neque PINAEVS proposuit, neque qui eum sunt secuti, ex descriptione tamen apices columnarum videntur intellexisse. Cl. GRAAFII autem sententia, qui carunculas nunquam deleri scribit, aut COLLINSII exscriptoris p. 562. a mea remota est, & accedo potius PINAEVO, qui carunculas deleri negat p. 72. aut RIOLANO, qui in puerperio quidem obliterari, sed renasci ait p. 187. Nam & apices columnarum, & valvularum degenerationes in aetate etiam decrepita perpetuas reperio.

Nunc, ut columnas propius describam, ita eas fere reperio, quales hic pinguntur, nempe constanter duas, uti inter paucos video tenuisse SANTORINVM *obs. anat.* p. 122. tum certius WINSLOWVM n. 649. qui situm etiam definit, ad superiora & inferiora, & GARENGEOTVM, qui cum ligamenti colli minus bene comparat I. c. p. 58. Earum anterior, maxima & sola perpetua, observante etiam RIOLANO p. 184. & DIEMERBROECKIO p. 150. saepe ex pudendo aliquantum eminet, uncia longior: haec adeo est illa particula cervicis uteri, quae excrescit ad insertionem urethrae, & in cavitatem propendit VESALII p. 654. Haec ab EVSTACHIO pingi videtur T. XIV. f. 3. Eadem est illa bifida amplior sub vesica caruncula RIOLANI p. 187. Hic est turbo membranoso carnosus, rugosus, in ingressu sinus muliebris, basi ipsi cohaerens, apice libero foras super cutem labiorum propendens, uvulae similis, quem columellam oportet vocare LINDENII *physiol. reform.* p. 322. nam hujusmodi tumorem ipse vidi. Haec maxima anterior caruncula WHARTONI *adenogr.* p. 234. caruncula major bifida MYRAETI *vadem. anat.* p. 421. Ea-

- i. Alter posterior & minor *b)*
- k. Pars strata papillis dense confertis *i)*
- l. Pars valvulis facta *k)*
- m. Rugae intermediae transversae *l)*
- n. n. Ambitus pudendi externi.
- o. Urethrae osculum.
- p. Majores lacunae, five uretericae. *m)*

q. Val-

Eadem est crista a vagina subtenfa meatui urinario FANTONI p. 182. A CL. DOVGLASSIO etiam pingitur *Phil. trans. abr. by Motte* IV. T. VI. f. 2. 88. sed ruditer, CHESELDENIUS etiam bifidam pingit Ed. III. T. 29. Saepe enim bifida est, & duas habet partes *stratas*, quae mediis rugis transversis conjunguntur. Aliquando hi duo trunci verrucis strati ita remoti sunt, ut pro duabus superioribus columnis haberi possint. Tunc carunculae tres sunt, ut MORGAGNUS nonnunquam vidit *adv.* IV. n. 23. Caeterum superius plures vaginae rugas esse dudum monuerunt COWPERUS T. LI. f. 3. FANTONUS p. 183. PINAEVS l. c. p. 99. VERHEYEN p. 146. GRAAF p. 79. & alii. Adde nunc historiam supernae columnae HYBERIANAM p. 22. 23. & confer minutius utramque descriptionem.

- b)* Posterior, aliquando aequalis priori, plerumque minor, caetera similis, sed minus perpetua, & vitio aetatis, nonnunquam nulla est. Describitur a CL. HYBERO n. 18. Enormem pingit SPIGELIUS ic. cit. In hymenem & ipsa, & anterior, sed magis posterior, inserit valvulas in arcum flexas, membranaceas, tenues, reticulatas, quae solae inter extremum anteriorum columnarum, & hymenem supersunt HYBER. Hanc conjunctionem valvularum cum hymene MORGAGNUS vidit *advers.* IV. n. 23. & eo refero eminentias, quibus hymenem dixit exasperari, & plures sub urethra lamellas EIVSD. *Adv.* I. n. 29. anulum vero ab interiori tunica vaginae in valvularum speciem factum ad rugas circulares, quae inter imas columnas & hymenem esse solent.

De utilitate harum columnarum nondum definio. Voluptati inservire MORGAGNUS credidit *advers.* I. p. 10. & alii p. 25. qui praeterea papillas veras esse crediderunt, quas ego verrucas callosas voco, a papillis simplicibus, mollissimis, aegre visibilibus, diversissimas. Verum obstat credituro analogia uteri, cujus cervix, nulli unquam veneri inservitura, satis adfines rugas habet. Numerum binarium retineo. Quatuor nunquam vidi, & qui tot recenset CL. HYBERUS, duas tamen columnas laterales minores esse fatetur p. 21.

- i)* Solidior & continua pars eminentis trunci, fit stipatis corpusculis, ovalibus, quadratis, rotundis, duris, linea depressa circumscriptis, quae stratas urbis plateas referunt. Papillas non voco, verrucas fere vellem.
- k)* Sed pars proxima his stratis, & nonnunquam in eadem columna interposita, semper autem conjungens duas vicinas columnas, valvulosa est, cervici uteri analoga, valvulis brevibus, extrorsum versus pudendum cavis, inclinatis SANTORIN p. 122. acie crenata terminatis MORGAGN. *Adv.* I. p. 10. varie interruptis & reticulatim confluentibus. Hae durae sunt, callosae haecenus, brevesque. Sensim autem degenerant in molliores rugas.
- l)* Rugae transversae simili adparatu verrucarum constant SANTORIN l. c. quae tamen & minores sunt, & paulo longius distant, neque crenatae sunt, neque adeo inclinatae ad exteriora, neque perinde eminent. Directio varia est, extrorsum, sursum, deorsum, varia lege, & modo evanescunt, ubi oporteret concurrere, modo se adtingunt & ramulis emissis inosculantur, modo omnino in veram retis speciem intrlicantur, interruptis quadratis areolis. Hujusmodi etiam sunt eae minutiores valvulae, quae a fine columnarum ad uteri osculum fere circulariter oberrant, & quae inter easdem columnas & hymenem positae, paucae, in anulos obeunt, sed hae tamen magis verrucosae esse solent. VERHEYENI icon (T. XVII.) quam MORGAGNUS carpsit *Adv.* IV. n. 24. non ita mala, & inter meliores est, quas vidi, & videtur exprimere duas columnas ad N. P. & ad O. tum intermedias rugas minores.
- m)* Lacunae GRAAFII huc pertinent, sed distinctius proponendae. Sinus sunt inflabiles, rotundo, aut lunato ostiolo, lineae aliquando diametro, stylum ad aliquot lineas admittentes. Hujusmodi sinus in ipsa urethra alias raros, unum duos tres, reperi, sed nuper in puella pulcherrimos. Urethra intus semper percurritur lineis, longitudinem sequentibus; sed in eo corpusculo hae lineae sex fere fuerunt, & in ipso osculo urethrae circumductae curvisque unitae

- q. Valvulae superiores *n*)
 r. Earum sinus, superni *o*)
 s. Sinus inferni *p*)

t. t. Ma-

unitae finibus, convexae respexerunt vaginam. Inter lineas autem totidem fuerunt sinuum series, parallelae, singula quinque vel sex sinuum, ut omnium numerus super triginta esset, et masculos superaret. In urethra muliebri tubulos & ostia describit GRAAFIUS, tum LIEVTAUD p. 357. NICHOLLS p. 45. FANTONVS p. 182. & TERRANEVS de gland. c. 2. brevissime, & WINSLOW n. 643. Lacunas etiam urethrae WALTHERVS habet in *suffoc. hist.* & fuse describit eos sinulos MORGAGNVS *advers.* IV. p. 45.

Alii sinus perpetuo conspicui, in tumido ostio urethrae, superius aut lateraliter maximi esse solent, tum ad latus utrumque urethrae, utrinque duo, vel unus, aliquando praemagnus. Circa ostium urethrae sinus pinxit GRAAF T.V. f. 1. D. D. T. VI. f. 9. T. VII. 5. tubulosque addit ramosos & descripsit p. 66. Sinus eos etiam VERHEYEN habet V. XVII. f. 2. H. H. & MORGAGNVS *adv.* I. T. III. ad f. & plerique GRAAFIO posteriores, ut DIEMERBROECK p. 153. LAMY des sens p. 171. Cl. HUBERVS pauciores invenit, ego frequenter uti GRAAFIUS, & concedit IDEM p. 33.

Alii sinus in vicinia, maxime versus vaginam, tres quatuor visi sunt, totidem in eminentibus papillis. Hujusmodi ductus, ex substantia glandosa urethrae ortos describit FANTONVS p. 182. GRAAF p. 80. & alii, qui minus distinxerunt a prioribus. Circa orificium vaginae tantos vidit RVYSCHIVS, ut pro urethrae osculo haberi posse monuerit, in gravida apud ERNDL. *It. angl. bat.* p. 90. Unum alterumve infra urethrae orificium describit Cl. HUBERVS p. 9.

Fundunt omnes album liquorem FANTON *diff. anat.* p. 188. qualem etiam in utero secretum video. Origo horum ductuum est in spongiosa carne urethrae, uti in viris, quam glandulam, & prostatam ex analogia vocabit GRAAFIUS de mulier. org. c. 6. p. 67. ed. 1672. pinxitque T. VI. f. 9. & ad hoc ipsum corpus revocavit prostatam, quam mulieribus tribuit GALENVS de util. part. L. XIV. c. XI. Hunc secuti sunt plerique, ut DIEMERBROECKIUS l.c. SCHELHAMMERUS *progr. val.* n. 31. BERGER. de natur. hum. p. 456. VERHEYENIUS p. 138. DIONIS. p. 291. BOURDON. *descr. anat.* p. 118. Cl. GERIKE de generat. n. 50. Alii prostatam muliebrem omnino veram glandulam fecerunt, ut WELSCH *Tab. anat.* 52. aut plures glandulas disgregatas urethrae, ut FANTONVS p. 182. Sed ego, sollicite aperta carne urethrae, nihil glandulosi reperio, spongiosam autem fabricam video, neque distinguo sinus istos a reliquis mucosis sinibus, quorum magna cum virilibus urethrae sinibus similitudo est. Ita dudum femininas prostatas negavit VESALIUS de chin. rad. p. 124. & de fabric. corp. hum. p. 668.

- n*) Latera tumentia urethrae, cum vaginae initio triangulare fere spatium efficiunt, quod urethra perforat. Haec latera tument, & saepe carnosam papillam utrinque emittunt, ut duorum cornuum modo ex urethra protuberent. Hae videntur carunculae mori similes prope urethram DOUGLASSII *Phil. trans. abr. by Morté* IV. P. II. p. 117. & corpus glandosum, quod in vaginam protuberat MORGAGNI *Adv. anat.* I. p. 10. & HUBERVS habet p. 7. Verum non glandula est, ut video depingi, sed ipsius urethrae tumida productio.
- o*) Ab ea nunc utrinque eminentia continuatur valvula, unica, simillima orae ovalis foraminis, quae isthmus dicitur. Ea arcu convexo versus vaginam flexa, redit sursum, & plus quam semicirculari circuitu facto, evanescit in pronai membranam. Pronaum vero vel atrium cum PINAEO vocamus, omnem illam partem pudendi, quae labiis interior, ostio vero vaginae exterior est. Vidi has valvulas duplices fuisse, ut ex medio semicirculo ruga ascendens spatium bipertiret. Has parvas rugas & quasi opercula lacunarum ad latera vestibuli pudoris PLAZZONI dixit LINDENIUS in *physiol.* p. 321. & iisdem pene verbis ROLFINKIUS *meth. genital.* p. 192. Cl. HUBERVS ventriculos vocavit p. 6. 8. f. 1. F. tum f. 4. 6. Nunc haec valvula, quam descripsi, utrinque una, comprehendit quemdam cum carne pronai sinum, parum profundum, parabolicum, plerumque simplicem, alias semiduplicem, deorsum cavum, superne apertum.
- p*) Alterum vero par *valvularum*, sive *inferius*, in medio spatium est, inter anum & urethram, fere e regione termini imi nympharum. Similes sunt prioribus, similesque intercipiunt fossas. Non raro incipiunt a valvulis superioribus, alias ab atrii carne membranosa proxime valvulas descendunt. Hae nymphae secundae sunt, MORGAGNO nonnunquam visae *advers.* IV. p. 42. In adultioribus saepe in modum conicarum papillarum eminent, & faciunt carunculas laterales, alias omnino nullae adsunt.

- t. t. Magnae lacunae finuum superiorum *q*)
 u. u. Lacunae finuum inferiorum *r*)
 x. x. Glandulae sebaceae ibidem dispositae
 y. Clitoris.
 z. Ejus praeputium.
 α. Linea cava, quae medio corpori *s*) clitoridis respondet.

β. La-

q) Hae lacunae, binae fere, in uno latere, aut singulares, aut ternatae, perpetuae fere sunt, stylumque ad aliquot lineas admittunt. Dixi ad BOERH. V. P. II. p. 73. Simples describit PLAZZONVS L. II. c. 6. p. m. 123. & aegre nisi in vivis adparere, fundere vero lascivum humorem in venere: RHODIVS stylo inserto demonstrasse eas inventorem testatur *maniff. anat.* n. 53. EX PLAZZONO repetit, iisdem fere verbis, SPIGELIVS p. 257. & RIO-LANVS p. 198. sed iste breviter. Similia habet LINDENIVS l. c. situm tamen adit, & perpetuas esse observat p. 322. tum imitatus ipsum ROLFINKIVS *ord. part. genit.* p. 192. & T. BARTHOLINVS in *inst. anat.* p. 166. *anat. renov.* p. 287. Hanc etiam ASTRUCII prostatam esse necesse est *de morb. ven.* p. 153. cum duobus ostiis ajat aperiri, & a cellulis urethrae distinguat. MORGAGNVS autem, etsi non omnia explicat, pingit tamen tria ad minimum & quatuor (*adv. l. T. III.*) in uno latere finuum oscula, quorum, quae intima sunt, & urethrae proxima, huc videntur pertinere. Huc etiam duo illa oscula refero, a BIANCHO descripta *Theatr. anat.* II. p. 76. Unam vel duas lacunas habet Cl. HUBERVS p. 8. tum in iconibus.

r) Has ego lacunas, in fossa valvularum inferiorum positas, perpetuo aliquas reperio, ita saepe profundas, ut pene ad anum descendant, semuncem longae in tenera puella. Alias unica est, alias duae sunt, ut etiam C. BARTHOLINVS habet p. 25. Hae sunt BARTHOLINI *prostatas muliebres*, quas ipse IOSEPHO DUVERNEYO tribuit, inventas in vaccis, glandulae nempe conglomeratae, ductum emittentes, qui in latere paulum posteriori vaginae in papilla pateat &c. *de diaphr.* c. III. f. 5. p. 107. & *de ovar. mul.* p. 21. IDEM in femina sibi visas esse testatur p. 24. descriptionem vero obscuriorem dat, nec locum definit, & satis demonstrat, glandulam sibi non visam esse, cum ajat simili substantia esse toti ductui vaginae, quem perreptant GRAAFIANI ductus l. c. p. 25. Sed chirurgus DUVERNEYVS easdem inter vaginae introitum nymphasque in femina hiantes glandulas descripsit ZOD. GALL. *ann.* II. p. 72. & DUVERNEYO, sed in brutis inventas tribuit TAUVRY *anat. raisonn.* p. 183. & PEYERVS in *exercit. anat.* p. 97. 148. WINSLOWVS duas glandulas, in crassitie alarum positas, totidemque ductus, ad latus vaginae patentes, descripsit l. c. n. 128. GARENGEOTVS easdem ait, sub plexu retiformi vaginae & clitoride poni, ad latus inferius vaginae, septem, & ultra, lineas longas, ductu in medio ostii vaginae patente l. c. p. 57. Similia sunt, quae habet VERDIER. COWPERVS autem pro novis descripsit magnas, duas, glandulas, in ima parte pudendi positas ad anum, ductubus apertas ad radicem caruncularum myrtiformium, semen edentes muliebri T. LI. KEILIVS lacunas exiguas describit in inferiori parte pudendi inter sphincterem & vaginam *abridgm.* p. 99. & denuo tres quatuorve glandulas prope rectum intestinum mucum salacem fundentes p. 100. utrobique vero has ipsa *prostatas* intelligit. Easdem nunc glandulas in variis brutis invenerunt PARISINI, ut in hystrice, tigride, civetta, gazella, leaena, iidemque etiam feminae tribuunt (*in anat. tigrid.*). In mure vidit VALISNERI *della gener.* L. II. c. 5. n. 72. Porro SANTORINVS duas sub plexu clitoridis glandulas, a prostratis BARTHOLINI distinctas, describit *obs. anat.* c. XI. n. 7. an diversas? NICHOLLSIVS, procul dubio ex COWPERO, glandulas sphincteri vaginae suppositas nominat p. 46. Verum etiam MORGAGNVS Bartholini glandulam se invenisse testatur, *adv. anat.* I. p. 36. non quidem perpetuo *Adv. IV.* p. 63. ductusque pingit T. III. H. & *. *. Observandum tamen est, extimos tubulos, qualis ad G pingitur, nostris lacunis similiore esse. ASTRUCIVS nomine Glandularum COWPERI easdem intelligere videtur p. 153. Cl. HUBERVS describit lacunas, unam duasve. Ego vero glandulas non vidi, sinus vero

- ρ. Lacuna in ea linea s)
 γ. Lacunae ad ejus lineae latust)
 δ. Nymphae crenatae.
 ε. ε. Glandulae sebaceae nympharum. u)

vero perpetuos, alias breves, alias unciali longitudine, muciferos, quales dixi: neque obscure dubito, an omnino glandulae verae, certe constantes, adsint, exemplo motus finium urethrae utriusque sexus, adeo similitum, meoque experimento. Aliae minores lacunae in parvis eminentiis columnarum, nondum satis a me demonstratae, sunt vaginae glandulae & pori, quos dixi COMM. BOERH. V. P. II.

s) An expressa fuerit nescio. Linea est cavula, inter duas eminentias a clitoride descendentes.

t) In ea linea lacunae sunt, parvae, brevesque, pene perpetuae. Eas vidi quatuor fuisse, in eadem linea dispositas, quam dixi, secundum perpendicularum a clitoride ad ostium urethrae descendere: vidi duas, vidi in eadem linea paucas, sed plusculas ad latus, ut in prima icona. Aliquid simile pinxit GRAAFIUS T. VII. S. unumque sub clitoride ductum vidit MORGAGNUS *advers.* I. p. 36. unum alterumve Cl. HUBERUS p. 9.

u) MORGAGNUS valde distinctas depinxit *adv.* I. T. III. ad c. e. & foraminulum, filumque eminens descripsit n. XI. additque *adv.* IV. p. 62. se ex ipsis ceram expressisse. BIANCHIVS in animadversionibus apud MANGETVM *Theatr. anat.* II. p. 76. nimis magnas & nimis conspicuas pingi exprobravit neque ego tantas aut tam manifestas depinxi. Habet etiam WINSLOW n. 640. Huc forte pori labiorum duorum generum RYSCII *Thes.* V. n. 70.



FIGURAE II.

Sectio uteri & vaginae puellae paucarum septimanarum.

- A. Uterus per posteriorem faciem apertus.
- B. Ovaria & tubae.
- C. Vagina aperta per anteriora.
- Γ. Ejus membrana interior, nervea, rugosa.
- Δ. Ejus caro exterior, fibrosa.
- D. Hymenis dissecti circellus.
- E. Orificium uteri crenatum & asperum.
- F. Septum uteri ex tribus jugis conpositum *a)*
- G. Columna cervicis uteri anterior. *b)*
- H. Posterior.
- I. Valvulae exiguae cervicis uteri.
- K. Valvulosa pars vaginae utero proxima.
- L. Columna vaginae anterior & major.
- M. Columna posterior & minor.
- N. Caruncula intermedia.
- O. Pars hymeni proxima, ex valvulis circularibus conposita.

a) Hujus modi septum uteri in ipso corpore hactenus nondum videram, & excuso adeo veteres, qui, magno consensu, uterum femininum bifidum, inque duos sinus divisum fecerunt.
Conf. COMM. BOERH. V. P. II. p. 42.

b) Haec, & reliqua, vide in prioris tabulae explicatione.

F I N I S.

E R R A T A.

In praef. ad Tabulas arteriae thyreoideae pro variis I. vasis.
in explicatione tabulae ejusdem arteriae prioris adde.

Ψ Nervus diaphragmaticus.

Ω Nervus noni paris.

In tabula coeliacae Prima deleatur litera n. & linea ultima T. I. cum in hac figura lien non
adpareat.



ICONUM ANATOMICARUM
PARTIUM
CORPORIS HUMANI
FASCICULUS III.

Arteriae Capitis, Mesenterii,
Thoracis, Renum.

AUCTORE
ALBERTO HALLER

PH. ET M. D. MED. ANAT. BOT. CHIR. P. P. O. ARCHIATRO ET CONSIL. AULIC.
SUPREMI SENATUS BERNENSIS DUCENTUMVIRO SOC. REG. ANGL. SVEC. SOD.



GOTTINGAE,
APUD ABRAM VANDENHOECK, ACAD. TYPOGR.
MDCCXXXVII.

ICONUM ANATOMICARUM

TAFELN

CORPORIS HUMANI

ASSICUATA

ALBERTO HALLER

MDCCCLXXXIII

GENEVE

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

ALBERTO HALLER

LECTORI S.

ALBERTUS HALLER

Arterias corporis humani haec nostra fere aetas primum in aliquam lucem constituit. Seculo XVI. in musculis fere & ossibus explicandis laboraverunt Anatomici. Non quidem ignoraverunt artem injiciendi, imo tenuerunt ante ipsa I. SYLVII tempora 1). Sed spreverunt plerique, & ipse SYLVIVS. Verum absque ea arte nihil quidquam in hac anatomes adeo nobili parte potest effici. Seculo XVII. viscerum fere fabricas & in vivis animalibus experimenta sibi proposuerunt Anatomici, ab humana anatome in universum justo remotiores. Nostris denique temporibus, cum vulgatissima nunc sit ars injiciendi, etiam angiologia ab infinitis erroribus repurgata, & maximis accessionibus aucta est. RUYSCHIUS equidem, cum tam magnus esset artifex, parum auxit hanc vasorum historiam, quae ab aorta, tamquam trunco, ramos majores persequitur per membra musculosque. Videtur obfuisse studium revellendi, & resecandi de sua in toto corpore sede partes, quibus repletet lagenas, asseresve exornaret. Itaque arteriarum quosdam elegantes fines, & retia, & penicillos, artificiose expressit. Bronchiales vero arterias neque invenit, neque pro dignitate descripsit, ut alibi demonstravi 2); alias, alicujus momenti, vix invenit arterias. WINSLOWIUS fere primus, & adeo nuper fregit hanc adeo fran-

1) Potes vasorum distributionem inflando per tubulos explorare, quod probo magis, quam humorem crocatum, vel aliter coloratum in sanguinis jam effusi locum per tubulos inmit-

tere (Isag. Anat. L. III. c. 23. p. 68. editionis Parisinae a. 1561.

2) De art. bronchial. & Oesoph.

*frangibilem glaciem, neque tamen tentatam. Hujus
insistere vestigiis visum est, & quae IPSE in com-
pendio arctius & brevius exhibuit, ea uberius & per
minutiora ex magna illa in cadaveribus humanis op-
portunitate persequi, qua instructi sumus. Non ig-
noro, quid soleat huic nostro studio objici. Varias
esse arteriarum origines, progressiones, divisiones,
nihil certi posse statui. Verum ea lex, si valeret, nos
omnino & ab arteriarum, & a nervorum cognitione,
& ab ipsis minutioribus musculis excluderet, nam &
in iis rebus vix duo corpora sibi per omnia similia in-
venias. Deinde haec varietas in venis quidem infini-
ta, in arteriis fere modica est. Ut eam coerceas &
circumscribas finibus, sufficit iterasse experimenta,
& per ipsam crebritatem dissecandi explorasse, quid
perpetuum, solitum, frequens, rarum, insolens de-
mum sit in arteriarum fabrica. Hoc ergo institutum
tenui, ut de nulla arteria scriberem, nisi saepissime
inquisivissem. Id ideo scripsi, ne forte aliquis, qui
non continuo eum vasorum ordinem numerumve inve-
nerit, quem ego describo, culpam in descriptionibus
meis quaerat. Poterit alia dissectio ipsi ostendere,
quae semel inquirendo non repererit. Ego vero, ex
cadaveribus comparatis, studui, ut quam uberrimam
historiam colligerem, neque facile ramum aliquem o-
mitterem, qui alicujus esset molis aut constantiae, ne-
que credo ullo modo me admittere potuisse, ut aliquid
aut non verum, aut non frequens, aut non perpetuum,
pro vero, frequente, perpetuo describerem. Eam-
dem sequendam rationem mihi proposui in iis iconi-
bus, quas nondum satis perfectas, maturas aliquan-
do edam, arteriarum pelvis, cerebri, artuum, dorsi.
Die 3 Aprilis MDCCXXXVII.*

ARTERIAE CAROTIDIS EXTERNAE

TABVLA SECVND A

ARTERIAE PHARYNGEAE.

Arteriae Carotidis externae descriptionem promissi a) IOSEPHVS EXVPERIVS BERTINVS, sed eam felicitatem nescio quod fatum nobis videtur invidere, cum & diu abfuerit in ultima orientali Europa BERTINVS, & nunc aliis laboribus implicetur. Quare interim non inutilem fore operam ratus sum, quam impendi huic inprimis arteriae. Non permittit institutum suum WINSLOWO, ut in uberiores historiam se diffunderet. Praeter WINSLOWVM vix ullus auctor exstat, quem possis consulere. Ergo, cum abundarem cadaveribus, & puerilibus plurimum, ad injectionem cerae peridoneis, magnam vim capitum dissecai, ut ignotas undique arterias in lucem protraherem, notas confirmarem. Micrologiam forte nonnulli criminabuntur. Sed arduum est limites definire, ubi desi-

a) Librum ejus Viri de Carotide Externa suppressatur legi potest in COMMERC. LITER. lucem nondum vidisse, & verendum esse ne NOR. 1743. p. 285.

defināt curiositas utilitatem habere. Musculorum vidi circum-
scriptiones & offium, quibus infiguntur sedes, incredibili in-
dustria & laboris patientia definivisse ALBINVM. Quis in ar-
teriis, in nervis, simile aut minutius studium reprehendet? &
si in aliis anatomes partibus plena & perfecta descriptio lau-
dem meritam est consecuta, quis aequus rerum aestimator stu-
dium & sollicitudinem carpat in arteriis? Nova nomina alii vi-
tio vertent. Sed novis rebus, aut anonymis nomina impone-
re jubet publica utilitas. Ita sermo facilis fit, & memoriae
subvenitur. Notum est, quantum confusionis apud eos vetu-
stos auctores myologicos sit, qui ante nomina imposita scri-
pserunt. Praeterea nomina facilia, & ex proximo petita im-
posui. Icones demum ex adultis corporibus adjeci. Sed eo
parciores fuerunt rami, quos pictor exprimeret. Neque id
magnum vitium fore putavi, cum ipsa abundantia pariat ob-
scuritatem: neque situs ratio patiatur plenam vasorum copiam,
&, quae icon non exprimit, vocibus fere melius possint ex-
poni. In teneris vasa facilius replentur, sed muscoli obscuris-
simi sunt, & fere inextricabiles. Deinde in nostris iconibus,
ad adulta corpora factis, ALBINIANVM studium in musculis
ne requirat velim, aequus lector. Sufficere mihi credidi, si
sedes vasorum & limites definirem, ne errarent per innane al-
bum, ut solent, exemtorem vasorum nervorumque ichnogra-
phiae, quarum equidem utilitas mihi perexigua esse videtur.
Carotidis internae fines in cerebrum divisos in alio fasciculo ex-
hibebo. Haec icon picta est Decembri mense MDCCXLV.

CAROTIDIS EXTERNAE

TABULA II. ICON ARTERIAE PHARYNGEAE.

Effractum est jugum, & late patefacta, quae inter maxillam superiorem & processum mastoideum posita sunt.

- A Margo cartilaginis thyreoideae inferior.
- B Margo superior.
- C Os hyoides.
- D Glandula Whartoni
- E et sublingualis ¹⁾
- F Maxillae inferioris, cujus ramus ablatus est, extremitas.
- G Ala pterygoidea externa.
- H Iugi pars exterior defracta.
- I interior
- K Meatus auditorius.
- L Processus mamillaris.
- M Foramen tertii rami Quinti paris.
- N Foramen principis arteriae meningae.
- O Sedes processus transversi Atlantis.
- Ω Processus styloformis

P Ster-

¹⁾ Continua semper priori, & eadem, si naturam potius, quam morem consulas. Ita recte egregius WALTHERVS *de lingua*; & olim WHARTONVS *Adenograph.* p. 129.

P Sternothyreoideus musculus

Q Coracohyoideus

RR Sternohyoidei.

S Mylohyoideus obiter indicatus. ²⁾

T Pars Basiloglossi, cujus major portio destructa est.

V Pharynx ab unco pterygoideo descendens.

X Styloglossus musculus.

Y Stylopharyngeus

Z Levator palati mobilis.

a Circumflexus palati mobilis.

b Obliquus capitis superior.

c Obliquus inferior.

Δ Levator scapulae.

d Complexus.

e Nervus octavi paris.

f f Arteria vertebralis, quae nuda primo adparet inter rectum majorem & obliquos, iterumque inter obliquum inferiorem & levatorem scapulae.

g Ramus ejus muscularis ad obliquos, rectum majorem, complexum, rectum minorem. ³⁾

h Carotis communis.

i i Truncus Cerebralis hic parum flexus. ⁴⁾

I Ca-

2) Musculi hujus fibras non secundum naturam depictas esse satis novi. Sed sedes tantum musculorum definire volui, non fabricam.

3) Vide in arteriae thyreoideae inferioris historia not. d. sub Atlante demum &c.

4) Cum Carotidis rami perpetuo duo sint, eorum vero, qui cerebrum adit, exterior sit, aut certe posterior, & quem externum vocant, is vere sit interior, aut anterior nonnunquam, nisi micrologum videtur, adparet nomina mutanda esse *Comm. Boerb.* II. n. 231. not. b. Confirmo vero, quoties thyreoideae arteriae origo super divisionem est, externae truncum infra thyreoideam internam diametro superare. Caeterum arteriae Carotidis truncus profundus, hic parum vel nihil flexus pictus est, neque flexus fuit, neque aliter in multis, adultorum imprimis cadaveribus reperitur. Minime vero ignoro, frequen-

tem fatis esse flexionem illam, quae sub foramine in hac Carotide reperitur, & quam *COOPERVS* depinxit, tum in *Phil. Trans.* n. 280. tum in Appendice operis *BIDLOIANI*, tum in *DRAKII* illa celebri tabula (*Anthropogr.* II. T. XX.) *LANCISIUS* etiam in T. VI. f. 1. novae edit. L. de corde & aneurism. sive in tabula dissertationi de gangliis addita expressit. Videtur mihi in junioribus plerumque adesse, & ab injectione non parum augeri, uti in universum repletio ceracea multum valet in augendis flexionibus serpentinis arteriarum, dum terminatas arterias dilatat, exque brevissima linea recta in longiorem inflexam urget. Addo ex hac arteria rarissime ramum aliquem nasci. Nuper tamen, sed semel omnino, occipitalem arteriam ex hoc cerebri trunco vidi produsse. Veteres hoc vulgo ignorarunt, variosque internae ramos tribuerunt.

1 Carotis *superficialis* f. externa. ⁵⁾

Ar-

5) Ordo ramorum, qui ex hac arteria exeunt, hic expressus est, uti plerumque obtinet. Nempe thyreoidea superior prima oritur (vid. not. 6.) deinde lingualis, & posterius proxima Pharyngea, indelabialis, & extrorsum occipitalis, vel eo loco, vel utique aliquanto interius, super eam vero plerumque auricularis externa. Denique truncus, data pro ramo Temporalis, inflexus in Maxillarem internam abit. Minores in universum furculi plures paucioresve inter divisionem Carotidis & Parotidem glandulam intercedunt, qui vel extrorsum ad mastoideum musculum, ganglion magnum collive musculos & cutem, vel antrorsum ad biventrem, stylohyoideum, vel introrsum ad pterygoideum internum, stylopharyngeum, pharyngem ipsum, masseterem denique, eunt. Sed & hyoideus ramus lingualis, & dorsalis linguae, & quinque in quinquaginta fere cadaveribus Laryngea ex trunco prodire visae sunt. Verum haec rara illae minores arteriolae, etsi semper aliquae, & ipsae tamen inconstantes, neque una nisi paucae in eodem subjecto, nec unquam omnes adsunt. In eo vero hoc corpus, quod hic depictum exstat, a solito more differt, quod omnes arteriae paulum sursum tractae sint, quod in abscisso capite vix evitari potest. Caeterum hic ordo quem descripsi, ab adeo paucis anatomicis haecenus est recte propositus, ut sit, quod valde mireris. Veteres fere ita male descriperunt, ut non sit necesse redarguere, Princeps VESALIUS & internae ramos tribuit, & venas arteriasque varie commiscuit & denique internam, cui ramos adsignat, qui debentur maxillari internae, principe ramo una cum jugulari vena dixit cranium penetrare. (L. II. c. 12. fin.) Eum, ut solent, secuti sunt VALVERDVS L. VI. c. XI. PLATERVS p. 118. & alii, & CASSERIUS L. VI. c. 2 & clanculum imitatus NATHANAEL HIGHMOR. *disquis. anat.* p. 246. & BOVRDONVS *Tab. Anat.* VII. f. 2. ejusdem cul-pae reus. EVSTACHIUS nihil praeter verum pinxit, ejus autem icones T. XXV. fere a venis ita tectas habent arterias, ut minus sint utiles. COLUMBUS emendavit aliqua, & addidit arterias maxillae inferioris & ophthalmicas. GABRIEL FALLOPIUS pleraque quidem errata VESALII correxit, expunxit illas confusiones arteriarum & venarum, delevit ramum majorem carotidis, per Jugularis foramen deductum. Ad ejus descriptionem VIDVS VIDIVS (T. 27. f. 1.) potius quam ad cadaver, iconem finxit. Thyreoideas duas vidit FALLOPIUS ex Carotide prodire, hinc Externam Carotidem pro tertio ramo recensuit. Ejus deinde ramos primos sollicite satis descripsit, non ita qui minores inde prodeunt. (*Obs. Anat.* p. 132.) Addidit tamen aliquos, quos non oportuisset inter pri-

mos numerare, ut *quartam* p. 132. b.) SPIGELIUS equidem VESALIUM secutus, distinctius paulo quam FALLOPIUS, Carotidem internam ab externa separavit, caeterum varia abnormia admiscuit, ut VESALII potius & COLUMBI descriptiones, quam naturam videatur imitatus. Iisdem verbis continetur CASPARI BAVHINI descriptio (*theatr. anat.* p. 367.) LAURENTII L. IV. c. 10. p. 145. ed. Paris. & RIOLANI brevissima verba nihil lucis adferunt, neque THOMAS BARTHOLINVS, qui SPIGELIUM fere exscripsit *Anat. renov.* p. 672. neque DIEMERBROECKIUS L. VI. c. 4. p. m. 477. qui easdem etiam fere voces habet SPIGELII, & tribuit internae ramos, qui maxillari debentur. Quatuor ramos habet BOVRDON *expos. anat.* p. 369. lingualem, angularem, temporalem & occipitalem, easdemque KEILIVS *abridgm.* p. 340. & VERHEYENIVS. COWPERVS in celebri illa tabula, quae & in *Phil. Trans.* n. 280. & in appendice BIDLOIANA T. III. & apud DRAKIVM T. XX. tres tantum ramos pingit, eosque confertim ex Carotide externa ortos, temporalem, Angularem a qua Maxillaris interna (10. 10.) & occipitalem. Ut omnino haec, passim celebris tabula, in Capitis vasis inutilis sit. In LEONCENAE iconibus, quae in *Phil. Trans.* l. c. exstant, eadem fere, quae COWPERI sunt vitia, & occipitalis perinde pro trunco Carotidis externae datur, angularis vero omnino omittitur. RAVII descriptio apud VALENTINUM (*Zootom. append.* p. 102.), ditior est prioribus, & Thyreoideam, eo seculo vulgo omissam repetit, in ramis vero minoribus passim aberrat. CANTII icon, etsi minime perfecta, multo melior est (*Inpet. Anat.* T. I. f. 2.) & ramos Externae ordine naturali habet, etsi minime ad finem perductos. CHESLEDENII descriptionem etiam in novissima editione, parcius laudo (p. 185.) WINSLOWVS multo omnibus prioribus melior, expunxit ramos spurios, addidit denuo thyreoideam, auricularem, maxillarem internam primus ornatus descripsit: a meis fere in eo recedit, quod pharyngeam aut non habeat, aut certe sub nomine *Maxillaris inferioris* (*Tr. des arter.* n. 54.) non satis perfecte describat, neque enim hic de minoribus furculis inquiri. D. LIEVTAUD, qui stylomastoideam ramis magnis Arteriae Carotidis externae adnumerat, eandem Pharyngeam omittit (*Essays anatom.* p. 477.) Eandem neque KVLMS habet (*Tab. anat.* p. 80.) cujus caeterum bona est descriptio. VERDIER (*Abregé Anat.* T. II. p. 374. & BOVRDON (apud PALFYN. *Anat. Chir.* II. p. 241) fere WINSLOWVM exscribunt. GRAMBSIVS in *angiologia* thyreoideam habet, & Maxillarem, & sublingualem, & Temporalem cui maxillarem internam

- m Arteria Thyreoidea superior. 6)
- n Ramus ad hyothyreoideum ceratoglossum, sternohyoideum.
- o Ad musculos sternohyoideos ramus.
- p Ad Coracohyoideum longe secundum cutem descendit
- n Ad Cricothyreoideum & glandulam thyroideam.
- q Ex Arteria Pharyngea 7)

r Ra-

nam accenset & Occipitalem T. V. LE CATI icon multa bona habet, ordinemque ramorum majorum naturalem, Pharyngeae vero loco unicum ramum, eumque Carotidis internae in foramine suo comitem pingit (*des sens* Tab. ad p. 299.) Eum vero ramum nunquam vidi, neque tere persuadeor, ut credam adfuisse.

6) Recentiores observationes de hac arteria cum prioribus meis consentiunt. Rarissimum est, per foramen transire truncum Laryngeae, plerumque super marginem thyreoideae & super thyropharyngeum, cui ramum dat notabilem, in Laryngem subit, & perpetuo per internam partem exit ad cricothyreoideum. Nec rarum est, ex ipsa thyreoideae origine ramum ivisse ad musculum mastoideum. Laryngeam quinquies vidi ex Carotidis superficialis ipso trunco provenisse.

7) Haec arteria nova est, quantum video primum descripta ad BOERH. Tom. I. p. 202. Tenuia sunt vestigia, quae apud scriptores reperi. Ramus ad rectum musculum colli, quem FALLOPIUS dixit & quarto loco numeravit l. c. p. 132. b. & VIDVUS pinxit T. XXVII. f. 1. O., huc omnino pertinet. Sed minorem fureculum cum habeat, pharyngis veros ramos omittit. Habet aliquid huiusmodi CANTIVS, sed obscurissimum est, quod pingit. LE CATI ramum procul dubio tubarium depinxit, p. 299. g. quem in foramen Carotidis internae ducit, nos eo ivisse nunquam vidimus, etsi eo iturus videri possit. WINSLOWI *Submaxillaris* arteria n. 54. accedit nostrae. Sed nostra non adit maxillarem, sublingualem, Parotidem glandulas, & de WINSLOWIANA descriptione nihil habet, nisi ramos musculis pharyngis & flexoribus parvis datos. Perpetua est, neque fallit inquirentem, etsi minor reliquis carotidis ramis primariis, si auricularem posteriorem non connumeret. Caeterum, ab eo tempore, quo descripsi Pharyngeam, pleraque eadem in nuperioribus cadaveribus reperi. Origo constantior est inferius, quam in hoc cadavere, vel ex ipsa divisione Carotidis, ut in tabula arteriarum faciei, vel ad lingualis originem. Eo semper fere omnia redeunt ut rami externi tres, duo, unusve rectum ma-

jorem, minorem, ganglion intercostale, & nonnunquam aliqui cutem & mastoideum musculum adeant (r). Qui foramen jugulare subit, non eodem semper loco exit, neque penitus perpetuus est, retro Carotidem vero internam sursum migrat. Arteriam autem huiusmodi cum jugulari vena Cranium adeuntem multi habent veterum, ut PLATERVS p. 23. 297. PAREVS L. III. c. 15. DIEMERBROECK p. 477. & alii: sed ii fere VESALIVM exscribere videntur, qui per errorem Carotidis magnum ramum ea via ducit. Cum octavi paris nervo subeuntem arteriam habet RIDLEY *obs. pract.* p. 165. & MONROVS quasi ex fama incerta de huiusmodi arteria loquitur *of the bones* p. 114. Idem ramus alio foramine, per quod & vena vertebralis ramum mittere solet, repertus est a me perforasse condylos occipitis, & partem durae matris proximam foramini magno adiisse. Alias, & in cadavere etiam unde arteriae faciei depictae sunt, ab occipitali prodisse vidi. Interni rami interiores styloideos musculos & pharyngem tribus ad minimum locis adeunt, primus circa angularem arteriam (s), unde longe nonnunquam descendit: deinde alter infra levatorem palati mobilis, unde ramus notabilis, reflexus, (u) etiam duplex, pariter per postica pharyngis in mediam pene Laryngis altitudinem migrat, cujus inni rami cum thyreoideis superioribus coeunt. Hic etiam tubae saepe, ejusque vicinis duobus musculis, ramos exhibet, & sursum ramos mittit in pharyngis superius infundibulum. Supremus denique omnium, qui pharyngis partem ossi occipitis sustentam adit, cumque compare transversum conjungitur, idem tubae cartilagineae, et cartilagini ossi petroso & occipitis interpositae, & recto minori, & ossis cuneiformis proximi parvis foraminibus, & principio narium ramulos dat, & ab eo arteria est, quae ingreditur canalem pterygoideum, atque cum nasali concurrit. Sed neque defuerunt cadavera, in quibus duo rami, alter sub levatore, alter supra eum musculum, pharyngis posteriora, rectum, vertebrarum corpora & ligamenta adierunt. Ipsam etiam Pharyngeam totam ab occipitali arteria vidi ortam, & vidi du-

- r Ramus superficialis ad glandulam parotidem.
- s Ramus ad pharyngem primus, sursum deorsumque divisus.
- t Ramus ad nervum octavi Paris, ganglion intercostale, scalenum, musculus rectum internum, & longum colli descendens.
- u Ramus ad pharyngem alter.
- * Sedes unde ramus comes jugularis prodire visus est in variis corporibus.
- w Ramus ad rectum internum, pharyngem summum.
- x Ramus ad pharyngis partem posteriorem, & summam proximam descendens.
- y Ramus superficialis ex Carotide externa. ⁸⁾
- z *Lingualis* arteria. ⁹⁾

Ra-

duplicem fuisse, cum ad communem altera a Carotidis trunco superficiali accederet; & triplicem, ut extrema, comes Carotidis, ab occipitali esset, rectisque prospiceret musculis; altera daret musculis tubae, veloque mobili: tertia vero tonsillis, & linguae, & utraque a Carotide externa esset. Palatinae caeterum longe plerumque sunt a Labiali.

8) vide not. 5. Frequenter adest. Caeterum ita soleo constituere limites Carotidis externae vel superficialis, ut a divisione Carotidis communis ad divisionem usque externae in Maxillarem internam & Temporalem nomen retineat.

9) Lingualis princeps arteria anatomicis fere omnibus innotuit, & principi COLUMBO L. VII. p. 181. *Tertia arteria* est FALLOPI (observ. p. 132. b.) & VIDIVIDII (l. c. n.) altera KVLMI p. 80. *Sublingualis* WINSLOWI n. 53. LIEVTAYD p. 478. CL. GVNZII de art. maxillar. p. 14. qui omnes breviter eam adtigerunt. CANTIVS obiter eam expressit sub glandula Parotide, melius vero ILL. TREWIVS in *Epist. de vasis linguae* olim ad me data T. 1. Quare ut hunc praecipuum Carotidis ramum pro dignitate recenseamus, trunco quidem lingualis nomen relinquimus, qui sub Labiali plerumque oritur, septies tamen a nobis inter quinquaginta observationes communi principio cum Labiali prodiit, uti etiam TREWIO videtur obtigisse l. c. Continuo super os hyoides flexuosa introrsum tendit, & sursum primum, deinde introrsum,

atque continuo Hyopharyngeis ramum tribuere solet, ad ipsum autem os hyoides alterum, qui transversim sub eo osse ductus minime raro arcum cum socio lateris alterni efficit. Hunc ramum, quem *hyoideum* voco, seorsim a trunco Carotidis oriri vidit FALLOPIVS p. 132. cui *prima* est, & ego bis vidi, ex Labiali vero pariter in duobus cadaveribus. TREWIVS exprimere videtur f. 1. haud longe ab L. Hic ramus perpetuus quidem est, magnitudine vero diversa. Ceratoglossa, Mylohyoideo, Biventre, Hyothyreoideo, Sternohyoideo, Coracohyoideo ramulos dat, vel omnibus, vel plerisque. Cum arteriae thyreoideae superioris ramulis concurrere solet variis anastomosis.

Eo ramo edito Lingualis super ceratoglossum, deinde super basiloglossum migrat, tecta utroque. In eo intervallo vel per intercapedinem Hyoglossis interjectam, vel variis eorum musculorum partibus perforatis, introrsum quidem ramum alterumve ramum edere solet ad Mylohyoideum, biventrem, geniohyoideum, in quo musculo cum compare alterius lateris non raro in anastomosis concurrat, aliquando etiam ad principia sternohyoidei, coracohyoidei.

Extrorsum vero vel sursum *dorsalem linguae* solet emittere, quae ad styloglossum, ubi linguae adplicatur, dorsique linguae principium profunda venit. Haec est, quae rete in postrema parte hujus dorsum facit, a quo & Epiglottis habet. Perpetua est, alias duplex, alias paulo ultra

- α Ramus ad ceratoglossum.
- β Truncus lingualis profundus *f. Ranina.*
- γ Ramus superficialis *f. sublingualis.*
- δ Ad mylohyoideum.
- ε Arteria *Labialis.* ¹⁰⁾
- ζ Ramus eius *palatinus.* ¹¹⁾

11 Ra.

ultra extensa, & pharyngis parti, linguae proximae, & tonsillis prospicit.

Ad finem denique basioglossi Lingualis plerumque finditur in duos ramos. Eorum alter, interior superficialis, *Sublingualis* dici potest, qui inter glandulam sublingualem & geniomylohyoideum antrorsum excurrit ad maxillae usque symphyfin, & ramos frequentes & illi glandulae dat, & huic musculo. Eadem denique ad finem anteriorem mylohyoidei erepere solet, & ramos edere vel cutaneos & biventri datos, vel quod rarius est, & ter vidi, in musculos labii feriores excurrere, uti de submentali dicemus. Inosculatur plerumque ad symphyseos sedem cum submentali. Hic ramus est quem *der kleinere* vocat KVLMS *tab. anat.* p. 80 & GRAMBS l. c. & ad i. i. expressit TREWIVS. Novies vero eum vidi a submentali totum provenisse, ut nihil a Linguali ipsi simile exiret, & semel in uno latere a Linguali, in altero a submentali vidi prodiisse, quae ramus est Labialis. Oritur vero tunc in sede fere anteriori glandulae Whartoni.

Alter perpetuus majorque ramus *Ranina* dici potest. Ea inter adhaesionem genioglossi ad linguam, & carnem linguae lateralem flexuosa excurrit, quod vir industrius D. PETSCH in diff. qua *selectae obss. anatomicae* continentur, observavit n. 40. ad apicem linguae usque, ubi subcutanea facta, comes venae & nervi a tertio ramo Quinti, in minutum illud rete terminatur, quod RVYSCHIVS pinxit Thef. i. T. 3. f. 4. A TREWIO delineatur *Ranina* ad gg. f. 1. Descripsi vero linguae arterias in *Comment. Boerb.* IV. p. 21. 22.

10) Labialem arteriam voco, quam vulgo vel Maxillarem externam vocant, ut WINSLOW l. c. n. 55. LIEVTAUD p. 478. VERDIER II. p. 347. GVNZIVS p. 14. vel Maxillarem ut BOVDON p. 241. GRAMBS l. c. vel denique, ob supremos ramos *angularem*, ut WINSLOW n. 58. & reliqui nuperi auctores haecenus citati. Maxillaris enim nomen mihi ambiguum videtur, angularis plerumque non verum; Labia vero vix unquam non adit, *Secunda major* est FALLOPII l. c. VIDIIQUE, *der dritte* KVLMI p. 80. EVSTACHIVS eum non ignoravit, quod ex T. XXV. adparet, figura tamen vix ulla exstat, nisi ejus partis,

quae in facie est, & eae quidem satis imperfectae, ut alibi demonstrabo (in Tabula artiarum faciei).

Tertius est inter internos ramos externae Carotidis, & perpetuus, nisi, quod cum Linguali non rarissimae conjuncta prodierit (not. 9). Minor est, quam haec ipsa arteria, & Thyreoidea, & Maxillaris interna, reliquis & Occipitali inprimis major.

Labialis arteria ex margine interno Carotidis superficialis orta, continuo super Lingua-lem adscendit introrsum, flexuosa, tecta stylohyoideo, & tendine biventris, (COWPER *Myotom.* T. 53. F.) ad glandulam maxillarem usque. In eo itinere, & brevi ab ortu Palatinam primo edit, quam dicam n. 13. Porro musculis, quos nominavi, surculos unum pluresve dare solet, & stylopharyngeo nonnunquam & ceratoglossio. Deinde, sed non raro in glandulae demum sulco, *Tonsillarem*, tum, vel in ipsa glandula, vel prius Pterygoideo musculo ramum. Vidi eum ramum etiam prius provenisse, quam tonsillaris.

Tunc, ubi glandulam adtigit, per sulcum ejus proprium, sulco venoso superiorem, proxima maxillae inferiori, migrat introrsum antrorsum, & in eo sulco ramos dat numerosos, pterygoideo musculo, glandulae maxillari, acuto margini linguae, membranae oris; tum subcutaneas, quarum aliqua nonnunquam per cutaneum colli musculum longe per collum, faciem, mentum, dividitur, alias antrorsum fere ad mentum usque repit, & ad glandulas conglobatas, quae Whartonianam intersunt & Parotidem, & Masseterem, huic vero maximas. Hujusmodi subcutaneas & glandulis datas maxillaribus externis HALEI pinxi in art. Labialis icone ad L. L. In eo denique sulco arteria finditur. Truncus sursum ad maxillae marginem se conjicit, quem ad oram exteriorem Masseteris superat, ibique pulsu tangitur; ea porro Labialis est proprie, quae in alia dissertatione describitur. Ramus trunco paulo minor submentalis est de qua n. 14.

11) Haec arteria perpetua quidem est, origine tamen non ita constante, non enim rarissimum est provenisse a Carotidis trunco. Sed plerumque a Labiali, haud multis lineis ab origine

- 7 Ramus ad Glandulam maxillarem major.
- Ramus tonsillaris. ¹²⁾
- Λ Ramus pterygoideus. ¹³⁾
- θ Ramus ad glandulam sublingualem, & mylohyoideum
five *submentalis arteria*. ¹⁴⁾
- Ξ Ramus nutritius maxillae inferioris.
- π Palatinae Rami ad musculos uvulae.
- λ Profundus palati.
- Σ Truncus Labialis ad faciem euns.

Ar-

gine, tecta musculis a styliformi processu ortis adscendit, quibus ramulos aliquos exhibet, & Pterygoideo interno, cuius margini externo adjacet. Inde Pharyngis sedi se adplicat, quae inter linguam est, & uncum pterygoideum, dat pharyngi, & linguae nonnunquam, & tonsillis parvos ramulos: attingit levatorem palati mobilis, & ibi fere finditur, datis ad duos tubae musculos, & interpositam tubam ramulis, Ramus palatinus *superficialis* ad uncum Pterygoideum cum circumflexo musculo tendit, & ad glandulas palati mobilis reflexus pervenit, inque eo velo ramosus finditur. Ramus palatinus *profundus* cum levatore ad palatum mobile venit major, & tectus eo musculo pererrat velum, dat azygo, & uvulam adit ultimis finibus. Idem ad expansionem tendineam circumflexi & palatum osseum ramulos dat. Sed tonsillis etiam ramum plerumque dat notabilem descendente. *Palatinam adscendentem* vocavi, vix descriptam haecenus, ut a palatina descendente separarem, quae ramus est maxillaris internae (Tab. huius art. y.). Descripsi nostram ad BOERH. I. p. 202. Vidi duplicem fuisse, & alteram, a Labiali perinde ortam, Pharyngeae locum deficientis supplevisse, ad Pharyngem &c. distributam. Alteram dedisse velo palati, linguae dorso, tonsillis.

12) Haec princeps est *tonsillae* arteria, quae nonnunquam ramus est palatinae. Adscendit juxta styloglossi ad linguam insertionem, secundum sedem lateralem pharyngis, dat tonsillis, quarum convexitatem adit, multis furculis, & radici linguae. Vidi a trunco Carotidis venisse. Sed hoc rarum est.

13) Perpetuus est, vel etiam duo, vel solitarii,

vel conjunctus alter cum dorsali linguae. Dat mylohyoideo musculo, Pterygoideo interno, glandulae Whartoni, linguae dorso, initio Pharyngis, gingivis, mylopharyngeo, glossostaphylinis.

14) *Submentalis* arteria perpetua, oritur in ipso sulco maxillaris glandulae, migrat inter maxillam biventrisque secundum ventrem (conf. etiam *tabulam arteriarum faciei* M.) dat ramos glandulae modo dictae, transque biventrem in cutem, (l. c.) varios, aliosque inter eum musculum & mylohyoideum transversim repentes, utrique tribuentes, denique ex intervallo biventrium cutaneos, quales pinxi obiter in Icone Thyreoideae inferioris. I

Dat porro maxillae inferiori, in foramen parum notum nutritiam arteriam, & varias ad periosteum ejus maxillae.

Denique ad terminum biventris anteriorem ejusque oram externam finditur, ibique vel uno vel duobus ramis mentum adit. Quando duo sunt, ramorum unus, isque interior, superficialis magis ad cutem menti & Quadratum; exterior vero profundus in levatorem menti, tectus quadrato, in periosteum, quadratum, triangularem, orbicularem cutemque divisus est. Sed haec incertiora sunt, mentalis tamen ramus nunquam deficit. Ultimi furculi inosculantur labialibus inferioribus (*Tab. art. fac.*) & inferiori dentali, (ibid) & alterni lateris arteriolis cognominibus. (ibid.) Vidi trunculum retrorsum redeuntem ab extrema biventris sede, rediisse inter geniohyoideum musculum & sublingualem glandulam, & maxime conspicuam anastomosis fecisse cum Sublinguali, datis ad geniohyoideos & sublingualem glandulam furculis. Sed minutis saltem ramis ad extre-

- μ Arteria Occipitalis. ¹⁵⁾
 ν Arteria stylomastoidea. ¹⁶⁾
 ξ Auricularis posterior. ¹⁷⁾
 ο Rami occipitalis arteriae ad splenium.

• Ra-

trema biventris, ubi nudus est a mylohyoideo, cum sublinguali frequenter communicat.

Ab hac submentali dixi sublingualem non infrequenter oriri.

Caeterum haec arteria videtur pingi apud EVSTACHIUM T. XXV. certius vero apud CANTHIUM T. I. f. 2. & habet etiam KULMUS p. 81. parum caeterum notam.

15) In hac arteria inprimis hoc variabile reperio, quod rami profundi, dicti ad Tab. II. arteriae thyreoideae inferioris, non rarissime absint: Tunc arteriae vertebralis ramus sub atlante ortus (dictus l. c. ad d) eo major est, vicesque replet occipitalis. Denique ramorum, qui ad caput adscendunt, alii superficiales sunt, alii profundiores. Hi in periosteo, illi inter cutem & galeam aponeuroticam repunt. Vidi etiam dedisse Pharyngeam.

16) Stylomastoidea arteria nomen habet a D. LIEUTAUD p. 479 & non perinde ignota est aut nova, ut ab ejus parvitate expectari posset. Dudum COLUMBUS habet p. 41. & VIDUS VIDIVS p. 28. C. BAUHINUS *Theatr.* p. 283. PLATERUS p. 23. HABICOTUS die v. p. m. 177. venamque aut comitem aut pro arteria descriptam VESALIUS p. 467. Nimii potius facta est a C. LIEUTAUD, qui inter ramos primos Carotidis superficialis posuerit, nimis parvam, & pene semper secundariam, ut semel aliter viderim. Caeterum ab Occipitali bis vidi prodire, quale quid etiam IOHANNI ADAMO KYLMO contigit, & pro frequente describit LIEUTAUD l. c. Plerumque tamen oritur ab auriculari posteriori. Inde extrorsum ad nervi duri foramen tendit. Dat etiam imo meatui auditorio, & alteram radicem Tympanicae. Nempe superior radix est ab arteria articulationis maxillae inferioris, quae a Temporalis provenit. Ea ad meatus auditorii partem posteriorem venit, arcum facit cum furculo stylomastoideae, & ex his duobus furculis fit coronarius ramus circumlegens osseam partem meatus, a quo porro descendit arteriola per membranam tympani, parallela manubrio, a qua illa arbuscula, picta RVYSCHIO.

Hanc originem tympanicae habet etiam KYLMUS p. 81. & WINSLOWVS ex auriculari n. 68.

Ipsa vero stylomastoidea, ubi foramen subiit

nervi duri, dat cellulis inprimis mastoideis, musculo stapedis, canali semicirculari exteriori, qui proxime posterior adjacet canali duri nervi, & gracili filamento ad partem posteriorem superiorem tympani adscendente coit cum meningae ramulo, qui fissuram FALLOPII subit, & trunculo tympani cavitatem adit, & fenestram ovalem, incudisque sedem adtingit.

Alius vero paulo antea ab eadem meningae ramo, fissuram subeunte, ramus princeps fere inter tympanicas, in partem anteriorem supremi tympani descendit ad promontorium, sedem foraminis rotundi, partem cavi tympani anteriorem: Idem cum eo, qui a Carotide venit, communicat. Vidi duas fuisse & distinctas propagines Meningeae, quarum una in tympanum, altera in fissuram aquaeductus ivit. A Carotide vero interna in ipso transitu per os petrosum, ubi anteriores legit tympani limites, ramus adit promontorium, quale quid VALSALVA etiam vidit T. VII. f. 1. Porro a meningea furculus in canalem musculi interni mallei solet descendere, cumque eo procurrere, CASSEBOHMIO etiam dictus n. 5. Alii furculi cum tuba adveniunt ex Pharyngeis: & alii ultimo, per fissuram, ad musculus anteriorem mallei, & nisi fallor malleum ipsum adveniunt, ex temporali, ut suo loco dicitur, orti. Hae sunt cavi tympani, quas novi, arteriae.

17) Haec arteria non est ex minimis, & plerumque a Carotide superficiali in parotide oritur; tamen quater vidi prodire ab Occipitali. Hujus haec historia est, cum multis cadaveribus comparata. Per Parotidem, super biventrem, retrorsum, pene transversa incedit, continuo sub styloformi processu, datque parotidi, biventrique. Ubi meatum auditorium attingit, dat ramum in ejus partem inferiorem, qui in junioribus corporibus membranam hujus meatus per proprium foramen adit, quod in adultis concrevit. Deinde stylomastoideam edit, retrorsum ituram. Dat porro extrorsum trans mastoideum musculus, ad hunc, ad cutem, ad regumenta & galeam non minimae partis occipitis ramum. Tunc inflexa ascendit in plica, quam auricula facit cum capite, truncoque suo ultimo in partem posteriorem, lateralem, squamosam

- π Ramus *meningeus posterior* ¹⁸⁾ ab eadem.
- ε Ramus ad complexum.
- σ Ramus ad occiput & finciput excurrens.
- τ Flexio *Carotidis*, ubi incipit degenerare in Maxillarem internam. ¹⁹⁾
- υ Arteria *Temporalis*.
- φ Arteria *Meningea*.
- χ *Maxillaris inferior*. ²⁰⁾
- ψ *Temporalis profunda exterior*. ²¹⁾
- ω *Maxillaris interna* praeterlegens radicem processus pterygoidei.
- ι Arteria *temporalis profunda interna*. ²²⁾

2 Ar-

squamosam temporum exit, & antrorsum cum temporali, & retrorsum cum occipitali & superiori auris, varie inosculata aponeurosi temporalis providet. Ramos autem secundum auriculam dat plurimos, neque satis constantes. Imus lobulum, antitragum, helicis ima, adit tum exterius, tum, sub cartilagine repentibus ramis, intus in auriculae cute. Dat idem ramus furculos minutos in partem inferiorem membraneam meatus, coeuntes cum ramis temporalis.

Tum furculi profundi ad periossium processus mamillaris, & foraminula vicina meatui auditorio.

Deinde alius ramus convexae conchae inferiora, et helicem adit.

Alius, vel plures extrorsum euntes, musculum auriculae posticum, occipitalem, splenium, ossis occipitis partem lateralem, superiorem.

Porro conchae superiori, helici ramum, aliisque superiorem conchae eidem, helici, anthelici unum, plures, & denique summo helici, qui circa ejus rotunditatem supernam confluxus, cum auriculari anteriori suprema convenit. (Tab. art. faciei n. 23.)

Haec arteria dudum nota fuit. Temporalis posterior dicta est VESALIO L. III. p. 489. & in tab. artt. o. Sexta est FALLOPIO p. 132. b. VIDO notatur q. Est ramus retro aures COLVMBI p. 181. *Seconde branche externe* WINSLOW I. c. n. 58. EVSTACHIVS etiam depinxit T. XXII. & originem CANTIVS I. c. & resectam VALSALVA T. II.

18) Ramus meningeus occipitalis, qui in angulo sub tentorii cerebelli fine extremo adit

duram matrem, nonnunquam deest, etiam praesente vena. Contrario modo vidi occipitalem meningeam notabilem dedisse per foramen lugulare, & alium per foramen peculiare nervo octavo: & secundam alibi per partem, quae foramini magno proxime superior est. Habet etiam D. VERDIER II. p. 339. venam vero EVSTACHIVS T. XXV.

19) Omnino dici potest Carotidem in maxillarem continuari, ut video scripsisse D. VERDIER II. p. 340. Etsi enim temporalis fere e directo respondeat Carotidis communis longitudini, & unice paulum extrorsum eat, major tamen est maxillaris, & ad eam manifesto incurvatur Carotis. Haec caeterum icon potest ad eam maxillaris arteriae in fasc. II. addi, ut, quae multa, ob nudata ossa, faciliora habeat.

20) Ab ea nuper ramum insignem in buccinatorum musculum, membranam oris & gingivarum partem posteriorem vidi ivisse, antrorsum euntem, alveolari inosculatum & labiali. Sed hoc rarius est.

21) Haec magis superficialis esse & temporalis tendini incumbere solet: profundos ramos etiam dat in periosseum calvariae. A maxillari inferiori non rarissime provenit.

22) Ad hujus historiam, ramosque orbitam perforantes, dictos in arteriae maxillaris descriptione not. r, addi potest ramum, qui major malae ossis coram partem, fossae temporali respondentem, perforat, lacrumali glandulae dare, ibi cum lacrumali ab Ophthalmica communicare, & imprimis constituere palpebralem externam arte-

2 Arteria alveolaris. ²³⁾

3 Infra orbitalis.

4 Nasalis ²⁴⁾ & Palatina descendens ²⁵⁾ in fissura sphenomaxillari obscure adparentes.


arteriam, quae bifurcata, utramque adit palpebram secundum tarfos, & in inferiori quidem cum Ophthalmicae ramo palpebrali varie coit, in superiori cum lacrumalis ramis.

23) Plerumque, & hic conjuncta cum infra orbitali, non raro distincta & inferior ortu. Canalem repetito effregi, qui primo interior ductu infraorbitali, deinde subjectus, ad septum narium repit, vicinus primum sinui Hignorian, ad quem ramulos dat, deinde cavitati narium. Dentibus omnibus datos furculos, in tunicam mucosam descendentes, manifesto vidi. Sursum etiam cum processu maxillae superioris nasali ramulos mittit, qui in osse inscriptiones habent. Maximus est, quem in teneris habet molaris tertius, ut in quo alveolo lateant trium dentium futura rudimenta. Conf. de alveolari not. f. historiae maxillaris externae.

24) Nihil valde addo historiae nasalis arteriae, nisi ramum superiorem, qui principes septi dat arterias, etiam in cellulas ethmoideas posteriores emittere furculos, inosculatos cum nasali posteriori ab Ophthalmica, & in sphenoidum sinum. Inferior ossibus turbinatis, fundo narium prospicit *art. maxill. bist. not. aa.* Deinde Pharyngeam supremam addo constanter adesse, quae in superficie ossis cuneiformis retro nares, ubi lacunar constituit pharyngis, ramosa terminatur, datque ramulum in pterygoideum ductum, inoscularum Pharyngeae not. z. l. c. & osseae substantiae furculos.

25) Constantèr nunc adfirmo Palatinae descendens anterioris, majoris, continuum ramulum esse, qui cum membrana callosa per foramen incisivum in narium cavitatem adscendit. Dudum videram not. y. *bist. art. maxill. intern.*





TABULA ART.
PHARYNGEAE.

C. J. Rollius M.D. del ad nat.

G. D. Hauman Graf de la Cour de S. M. Brit. et de l'Univ. de Gottingue.



AD ANATOMICOS LABORES

ANNI MDCCXXXVI.

I N V I T A T I O

Q V A

C A R O T I D I S E X T E R N A E

TABVLA III. CONTINETVR

S I V E

A R T E R I A E F A C I E I.

L E C T O R I S.

ALBERTVS HALLER.

Paucis Te volo Lector veriamans & aequi. In ista icon-
 ne, quam propono, ramus labialis superior rariori
 exemplo prodiit ex Transversali faciei. Nolui tamen a-
 liter quidquam pingi, quam natura iussisset. Ut vero
 facillime ad frequentiore normam icon reducat,ur,
 sufficit lineas notasse expressas asterisco, & labialem
 arteriam inferiorem cum superiori conjunxisse.
 Transversalem vero ad sedem Zygomatici musculi ter-
 minasse. Cranium, cui hae arteriae adfixae sunt, repo-
 sui in thesauris, ne quisquam porro molestus sit, & ne-
 get ad naturam pictas esse. Quinquagesies vero arteri-
 as capitis me persecutum esse, ideo addo, ut adpareat,
 me constantiores, aut rariores divisiones vasorum, ex
 ipsa natura potuisse definire, qui ejus quasi consuetu-
 dines familiaritate aliqua perspexerim. Arterias de-
 nique omnes, quas musculus aliquis aut glandula ob-
 umbraret incumbendo, punctis expressi, ne vel parti-
 um vicinias corrumperem, absque quibus tabulae va-
 sorum vix ullius sunt pretii, vel omitterem, quae
 necessaria videbantur. Picta est mense Decembri

a. 1745

TABULA ARTERIARUM FACIEI

- A Caroditis truncus communis
- B Vena Jugularis communis.
- C Carotis cerebialis.
- D Carotis superficialis.
- E Arteria Thyreoidea superior.
- F Arteria lingualis, tecta venis & Ceratoglossa.
- G Arteriae labialis ¹⁾ principium pariter tectum.
- rr Rami pterygoidei.
- o Ad dorsum linguae ramus.
- H Arteriae Carotidis superficialis truncus in Parotide.
- I Arteria Occipitalis tecta Parotide & musculus.
- K Arteria Pharyngea nunc latens.
- L Arteriae labialis ramus superficialis. ²⁾

MAR.

¹⁾ Historiam hujus arteriae incepti dare ad tabulam Pharyngeae arteriae not. 10. Superest, ut eam partem persequamur, quae per faciem distribuitur. Truncus ergo hac fere ratione plerumque se habet. Ubi marginem maxillae inferioris adigit, introrsum solet adscendere per marginem inferiorem Masseteris, interior tamen, quam vena comes: versus angulum oris, haecenus fere tecta mera pinguedine, ductu plerumque serpentino (PETSCHER diss. cit. n. 41.). In eo intervallo extrorsum masseteri ramos dat (z), illis inosculatos, qui a temporali ex Parotide adveniunt, introrsum vero unum duosve Labiales inferiores. (P. V.)

Ubi ad angulum oris advenit, regitur ibi zygomatico, & musculis reliquis in labiorum concursu convenientibus, per buccinatorem adscendit, dat huic ramum saepe non minimum, ad interiora vero edit coronariam labii inferioris, & in ea in hoc quidem cadavere, sed solito brevior, definit. Longe vero plerumque pergit adscendere in labrum superius, dat ipsi coronariam suam, attingit plicam, qua nasus faciem contingit, ad pinnas narium crebros edit ramos,

dorsum nasi conscendentes, aliosque ad levatorem labii superioris, & nonnunquam in suprema parte nasi in ipsa glabella definit, inosculata ophthalmicae, datis trans nasum ramis a dextris in sinistras communicantibus, quae procerdant & frontali. Extrorsum vero aliquando ad levatorem labii superioris, & orbicularem palpebrae ramos edit, qui omnium longissimus est ejus arteriae a me quidem observatus adscensus. Hujusmodi equidem fabricam WINSLOWVM vidisse oportet, qui (n. 57.) arteriae suae angulari ramos tribuit ad corrugatorem, & frontalem, & HEISTERVM (not. 65.) qui ramos in orbitam & ad frontem datos recenset. (de tun. Choroid. n. 16.) Saepe vero inferius in medio naso, in ipso margine terminante inferius osseam partem nasi, ita finitur, ut in ophthalmicam, incertis limitibus degenet. Ita fere COWPERVS habet Myot. T. XXII. O. Vel denique ad labium superius infra nasum definit, ut EVSTACHIUS vidit T. XXV. & FALLOPIUS, qui praeter ramos ad utrumque labium non alios nominat, & CANTIVS T. c. et ego saepe.

²⁾ Vide Tab. Pharyngeae not. 10.

- M Arteria submentalis. ³⁾
 N Rami superficiales Labialis.
 O Arteria muscularis labri inferioris. ⁴⁾
 P Anastomosis cum Maxillari inferiori.
 Q Maxillaris inferior, tecta musculus & ex foramine erumpens. ⁶⁾
 R Ejus rami ad quadratum labrumque inferius.
 S Anastomosis cum submentali. ⁷⁾
 T Anastomoses cum coronaria labii inferioris.
 V Rami arteriae labialis inferioris anastomoses cum coronaria labii inferioris.
 Y Coronaria labii inferioris. ⁸⁾
 Z Ramus ejus ad Masseterem & buccinatorem. ⁹⁾
 a Ad cutem ramus.
 b Ad triangularem & angulum labiorum.
 c Ramus carotidis superficialis ad Parotidem.
 d Transversalis faciei ex temporali orta. ¹⁰⁾

e Ra-

3) Ibid. not. 11.

4) *Labialis inferior* aliquando communi trunco cum Coronaria nascitur, plerumque seorsim, neque valde raro duae sunt. Adit buccinatorem, triangularem, quadratum, orbicularem, levatorem proprium, gingivas. Habet etiam WINSLOW n. 56. & cum compare alterni lateris inosculatam pingit EUSTACHIUS T. XXV.

6) Haec arteria & in puero plerumque & in adulto parva, multoque nervo socio minor in adulto hoc corpore praeter omnem morem ampla fuit.

7) Hujusmodi anastomoses non ideo recensio, quod magni faciam. Verissime Clar. HEBENSTREITIVS, vicina vasa ubique coalescere, nisi septo aliquo impediuntur (*de arteriarum confuissis*). Id de arteriis maxime valet, quae per musculos & membranas distribuuntur.

8) Nomen a WINSLOWO repeto n. 56. habet etiam KVLMS p. 81. Perpetua est, & tecta triangulari, orbiculari, subit labium, in membrana oris, repit inter glandulas ibi numerosas, sola membrana oris versus cavitatem oris tecta, flexuosa, sed in universum transversa, in com-

parem alterius lateris inosculatur. Dat buccinatori, glandulis, orbiculari. Dat ramos descendentes in levatorem proprium, & quadratum, inosculatos labiali inferiori, & submentalis ramis. Vidi etiam communi trunco provenisse cum coronaria labii superioris, uti WINSLOWO visum esse oportet, cum ita describat n. 58.

9) Ad buccinatorem musculum rami varii ex labiali & infra angulum oris, & super eum angulum, & in angulo nasci solent. Ii retrorsum euntes inosculantur ramis arteriae alveolaris (not. 12) amplis omnino anastomosis, quae in hoc cadavere ad transversalem faciei pertinuerunt. Sed & ad glandulam sociam parotidis, stenonianum ductum, ramuli ibi exeunt: & quando transversalis faciei minor est, aliquis inde ramus cum zygomatico ad orbicularem palpebrarum usque venit.

10) *Transversalis faciei* mihi est ramus notabilis arteriae temporalis, qui continuo fere sub jugo ortus, tectus Carotide, deinde sodalis aut superior, cum ductu stenoniano, trans masseterem repit. Plerumque tamen ad cutem solam, & parotidem, & zygomaticum, &

- e Ramus ad temporalem, Palpebrae orbicularem. ¹¹⁾
- f Alveolaris ramus comes buccinatoris vix conspicuus. ¹²⁾
- g Ramus ad zygomaticum, parotidem summam, orbicularem inferiorem, cutem.
- h Rami ad buccinatorem.
- i Ad angulum labiorum.
- k k Coronaria labii superioris. ¹³⁾
- l Nasalis lateralis inde profecta. ¹⁴⁾
- m Anastomosis ejus cum ophthalmica.
- n Alia nasalis duobus ramis legens narium ossis marginem.
- o Alius ad septum narium. ¹⁵⁾
- p Coronaria labii superioris lateris dextri & anastomosis cum sinistra.
- q Ramus ad Zygomaticum & jugi sedem.
- t Profundus, anastomofin hinc faciens cum comite buccinatoris, inde cum infraorbitali.

u Ea

masseterem: & orbicularem inferiorem palpebrarum consumitur, inosculatus ibi ramis superioribus, & inferioribus Ophthalmicae. Ad masseterem ramum magnum profunde defigere etiam solet, & hic defixit, quem tamen pictor non potuit exprimere, & vidi sub jugo adscendisse in carnem temporalis. Ad maxillae articulationem inde furculi veniunt. Quod in hoc subjecto dederit Coronariam superioris labii, id quidem insolitum fuit.

11) Haec anastomosis infraorbitalis cum temporali perpetua quidem est, non raro tamen non cum transversali faciei, sed cum proprio temporalis ramo etiam Labiali inosculato, sed masseteri proprio, conjungitur infraorbitalis.

12) *Alveolaris ramus* maxillaris internae dictus est in ejus descriptione not. 1) & tab. Pharyngeae not. 23). Ramus autem cum buccinatore adveniens, plerumque duplex est, superior & inferior. Iste ad usque triangularem excurrit, & cum aliqua labiali inferiori communicat. Ille superior, & vicinus

ductui stenoniano, & ipse labiali insertus, dat adipi malae subiecto ramos. Est ubi superior ramus praemagnus, in faciem exiverit, adscenderit in orbicularem palpebrae inferiorem, & inosculatus sit ibi infraorbitali, ramis datis masseteri, zygomatico, levatori labiorum communi, & superioris proprio.

13) Haec coronaria perpetua est & elegans. In ipso arcus prolabii flexuosa incedit. HEISTERUS observat, multum sanguinis dare in operatione labii leporini (*Compend. Anat.* not. 65. & *diff. de lab. leporin.* p. 11). Etiam KULMUS describit, non tamen anastomofin cum sodali p. 81. quae perpetua est.

14) Haec arteria alioquin trunco labialis continua est, ejusque finis. Anastomosis autem cum ophthalmica, quantum novi, perpetua est.

15) Quatuor ramos, comites septi narium, & ad globulum exeuntes, non dico perpetuos esse, analogi aliquid semper adest.

16) Etiam haec perpetua est.

- u Ea anastomosis. ¹⁶⁾
- x Sedes trunci *infraorbitalis* ¹⁷⁾ tecti musculus.
- y Anastomoses rami ejus *infraorbitalis* cum ramo temporalis.
- z Anastomosis *infraorbitalis* cum labiali coronaria.
- i Ramus ad imum nasum.

2 Ana-

17) Arteria *Infraorbitalis* descripta est descr. art. maxillar. not. u. cuius sociam venam videtur pinxisse EUSTACHIUS T. XXV. Sunt tamen quae addam, & quae conferas cum prioribus. In itinere quidem per orbitam, observo fere ex principio orbitae ramos plerumque aliquot reddere durae matri offarcenti fissurae orbitariae postrema. Tum, ingressa canalem & ab initio ad oculi adipem, & orbitae periosteum, & post aliquot lineas ex sulco ramulos edit, per fundum orbitae serpentes, atque adeuntes adipem oculi (saccum lacrumalem in nares usque, quoties ramus iste non oritur ab Ophthalmica) obliquum inferiorem, palpebram inferiorem. Non raro vel per proprium foramen ossis malae, vel certe per marginem ipsum orbitae vel interior ramus iste exit ex orbita ad orbicularem inferiorem, & levatorem labii superioris, vel exterior, ad illum solum. Hic est *superior* LIEUTAUD p. 479, qui tamen non ad omnes orbitae partes abit. Alii surculi ex ipso sulco in Highmori sinum omnino descendunt. Alii in cellulas ethmoideas medias descendunt, vicinae prioribus. Vidi etiam in temporalem musculum per foramen ossis malae surculum ivisse. Postquam vero ex orbita truncus exiit super originem communis levatoris, sub ortu externa partis levatoris proprii labii superioris, plurimos dat ramos. Eorum intimus orbicularem saccumque lacrumalem nonnunquam adit. Sequentes cuti dant, & naso, levatori interiori labii superioris, semilunari musculo nasi, perichondrio, inosculati aliquot ramis, (2. 3.) ophthalmicae. Alius aut plures retro levatorem proprium labii superioris descendunt ad angulum nasi, inferuntur labio superiori, orbiculari superiori, levatori proprio, rhomboideo musculo, periosteo, & inosculantur coronariae superiori ramis (z). Alius retro levatorem eundem descendit, & partim ad cutem ramos edit, etiam cum labiali inosculatos (f) aliis in communem levatorem consumitur, & periosteum ossis maxillaris. Alius in membranam oris, glandulasque buccinatori injectas repere solet. Alius extrorsum redeuns in orbicularem

& palpebram venit, tum introrsum, tum extrorsum, & cum ramo palpebrali profundo tam ophthalmicae quam temporalis profundae, denique etiam cum orbitaria ophthalmicae inferiori, & cum orbitaria a temporali anastomoses habet, qualis hic etiam picta ad g, & frequens est. Horum ramorum plerique semper adsunt, raro omnes.

18) *Ophthalmica*, arteriarum corporis humani fere elegantissima, descriptionem meretur uberiorem, quam vel apud scriptores reperio, vel ipse in BOERHAAVIANO COMMENTARIO n. Vol. IV. n. CX. not. d. aut cum icone dedi not. 29. ad iconem baseos cranii, cum in primis de ea extricanda omnino desperandum esse scripserit ILL. HEISTERVS de tunic. Choroid. n. 20. Origgo perpetua est a Carotide interna, ubi secundum foramen opticum transit. Ibi sub nervo optico, paulum exterius, exit ex carotide, ut nervum comitetur.

Dat nonnunquam continuo ex ortu ramum receptaculo.

Sensim interiora petit, ut nervo interior fiat, dat ipsi per iter ramulos duos, tres, in substantiam defixos, tunc mistam prioribus *ciliarem superiorem*, magnam, quae octo plerumque flexuosis ramis scleroticae fundum perforat, & totidem ramulis superioribus aliquandiu scleroticam permeat exterior. Dat porro, aliquot lineis ab ortu musculorum rectorum, simul fere, tres ramos *lacrumalem* & *muscularem inferiorem*, tertiamque, sed fere pertinentem ad *ciliarem inferiorem*, quae & ipsa dat centralem nervi optici & octo fere ramis serpentinas ciliares inferiores constituit. Sed eae ciliares non raro non duobus, sed plusculis divisis trunculis, ab Ophthalmicae trunco oriuntur, proximè tamen semper lacrumalis & inferioris originem. Hae ciliares omnes utcunque ortae partim continuo perforant scleroticam & constituunt vasa vorticosa Choroideae membranae, RUYSCH. ad f. 8. l. c. partim recta erepunt per scleroticam. eamque paulo antè perforant rectaque pergunt cum nervulis (RUYSCH. Epist. XIII. f. 11. 12.) & circulo iridis inferuntur id. ib. f. 8. descr. HEISTER l. c. n. 21. qui in anteriori parte uveae, in ipsa intima parte con-

- 2 Anastomosis cum ophthalmica.
- 3 Alia anastomosis.
- 7 Ramus infimus ad levatorem communem & communicans cum f.
- 4 Ramus descendens ophthalmicae ad levatorem.
- 5 Alius ad alas nasi.

6 Trun-

nexionis illius albidæ choroideæ & uveæ sedet ib. f. XVII. XVIII. & Thes. II. T. I. f. 6. HEISTER N. 21. & fit ex ramulis tum istis, tum anterioribus ciliaribus modo dicendis. Hæ arteriolæ dextrorsum & sinistrorsum divisæ, & inosculatæ sui similibus, ultimo circulum continuum faciunt.

Ciliares posteriores sunt ad quindecim aut ultra, mediae pauciores, sex vel octo.

Lacrumalis l. c. 2.) dat continuo ad nervum opticum ramum retrogradum, tum nasalem posteriorem, & recta rectis musculis extrorsum migrat, dat notabilem ramum ad rectum oculi superiorem & palpebrae levatorem, quibus tegitur dat duræ matri fissuræ sphaenoideæ ramum, qui aliquando major est, atque a COWPERO T. IX. f. 2. & T. 89. operis Bidloiani & a RIDLEYO pingitur f. 2. *bb* & a VIEUSSENIO ad X. X. T. 17. melius vero describitur a I. la CHARIERE, p. 110. III. & BOUDON II. p. 57. & olim a PLATERO p. 36. Conf. *art. maxill.* not. u. Repit super bulbum oculi extrorsum, dat quatuor ramulos illis ipsis, quos nominavi musculis, iterum externo, & nonnunquam ramos, qui osse malæ perforato ad temporalem muscolum exeunt (l. c. prope 24.) tum glandulae lacrumali, & circulum facit *tarseum superiorem*, dum introrsum eundo secundum tarsum elegantissimam & flexuosissimam anastomosis facit cum ophthalmicae palpebrali ramo modo dicendo, a quo circulo & ad levatorem, & extrorsum ad conjunctivam bulbumque denique oculi plurimi furculi exeunt RUYSCHIUS hæc vascula expressit Thes. X. f. 6. T. III. *Nasalis* denique *posterior*, quoties adest, neque enim est perpetua, dat pathetico, quo tegitur, & per canalem proprium adit duram matrem, in cellulas ethmoidæ posteriores & sphaenoideam denique, in quibus cum nasali a Maxillari Externa communicat. Hanc MONROUS habet *of the bones*.

Alter ramus Ophthalmicae, continuo cum Lacrumali natus, est *Muscularis inferior oculi* l. c. ad I. *exterius*. Is ramosissimus, continuo finditur subjectus optico nervo. Ramus internus recto cognomini insidet, cui & inferiori multos ramulos dat, trunculo vero ad bulbum

oculi ramosus, ultimo per fundum orbitæ in saccum nasalem irrepit, cumque eo sacco in nares descendens inosculatur ramo inferiori nasalis arteriæ a maxillari interna ortæ. Est tamen ubi ramus iste, qui saccum lacrumalem adit, oritur ab infraorbitali.

Ramus externus Inferioris it extrorsum trans muscolum inferiorem, hinc dat ramulos, fit comes nervi obliquum inferiorem adeuntis, cum externo musculo migrat antrorsum, dat ipsi furculos numerosos, & in obliquum inferiorem inseritur.

Hi rami ab ophthalmica ad musculos dati, exeunt ultimo in scleroticam, fere dimidia linea cis corneam, eorumque quilibet tribus circiter furculis perforat scleroticam, & continuo se in circulum iridis inserit. Hæ Ciliares anteriores, nemini dictæ, perpetuæ tamen sunt, indeque cum rectilineis jam notis radiatæ arteriæ iridis oriuntur. Ab his vero arteriæ tunicae pupillaris in fetu proveniunt, quæ claudit in ea ætate pupillam, & post partum, brevi, evanescit, quam in Actis Upsalensibus descripsi, cujusque iconem habeo paratam.

Datis his ramis ophthalmicae, (l. c. 3.) truncus sequitur patheticum muscolum exterior, cui & interno multos, dat furculos: dat *nasalem anteriorem*, (ib.) perpetuam, quæ per canalem proprium partim in duram matrem proximam cristæ Galli & falcem, partim in cellulas ethmoidæ anteriores descendit, partim in partem proximam septi, & caelum narium per foramina cribrosa.

Tum ad sedem trochleæ dat denuo sacco nasali, deinde *palpebralem internam* vel communem vel duas distinctas superiorem, inferiorem.

Hæc nata prope trochleam, alio ramo superiorem palpebram secundum tarsum præterlegit, & inosculatur lacrumali, facitque *arcum arteriosum tarseum* minus pulchrum superiori.

Altero ramo per inferiorem palpebram transversa migrat in orbita, & inosculatur ramis palpebrae inferioribus a temporali ortis. Utrunque dat conjunctivæ, & deorsum etiam cum infraorbitali communicat.

Inde

- 6 Truncus ex orbita prodeuns *Ophthalmicæ*
- 7 Ramus ad palpebram inferiorem.
- 8 Ad superiorem, corrugatorem &c.
- 9 Ad glabellam.
- 10 Cutaneus.
- 11 Dorsalis nasi.
- 12 Anastomoses cum nasalibus a Coronaria
- 13 Ex temporali ramus masseteri ¹⁹⁾ & Paroditi datus.

14 Tem-

Inde ophthalmica exit ex orbita, legendo oram trochleae & musculi inde in bulbum euntis internam, & erepit per finem suum, tecta orbiculari, ibique in angulo interno in quatuor ramos finditur.

Primus est *superciliaris* palpebrae sequens originem, orbiculari tectus, & circumscripta orbita, inosculatus ramo temporalis profundi interni.

Alter *Nasalis*, qui continuo finditur. Ramus *orbitalis inferior*, circumlegit oram imam orbitae in orbiculari palpebrarum, et anastomosein habet illam cum labiali et infraorbitali, quae pingitur ad y.

Alter trunculus nasalis transversus in glabellam osseamque partem nasi abit, & partim cum sodali suo arcum facit trans dorsum nasi, & cum labiali varie communicat, & sursum in frontem ramos dat. Ab isto oriuntur dorsales nasi (11.) quae varie implexae cum ramis infraorbitalis & labialis, furculis etiam propriis foraminula subeunt ossum nasi.

Tertius ramus est *frontalis superficialis*. Ille ante corrugatorem antequam frontalem in media fronte adscendit, & cum interno ramo temporalis pulchras habet anastomoses (8).

Ultimus *frontalis profundus*, corrugatore tectus per ipsum os adscendit, & ipse inosculatus priori atque temporali profundo, in corrugatorem, frontemque, per periosteum adscendens absimitur.

Ita se habuit Ophthalmica in cadavere sollicite dissecto. In aliis, etsi varia paulum ab ea fabrica diversa fuerunt, pleraque tamen conferunt, eorum vero, quae aliter se solent habere, praecipua jam notavimus.

Caeterum lacrumalis, aut tota, aut plurimis ramulis, suppletur nonnunquam a ramo temporalis profundae, qui suo loco dicitur, aut a ramo meningae, adveniente per fissuram inter

magnas & parvas alas, qualem ILL. HEISTERVS descripsit de Choroidea n. 19. & ait junctum fuisse temporalis, infraorbitalis & labialis ramulis. Hujusmodi etiam ramum KVL MVS habet p. 80. internae tamen Carotidi adscribit, quod erroneum videtur.

19) Carotidem superficalem arteriam in Pharyngeae descriptione deduximus ad eam sedem usque (not. 5. 7.) ubi in maxillarem internam, & temporalem finditur. Inde illa quidem maxilla tegitur, temporalis vero paulum extrorsum recedit sursumque, & secundum aurem emittit, hinc quidem auriculares anteriores (not. 21.) inde varios ad Parotidem & masseterem ramos, cum labialibus varie unitos, quos *Massetericos* vocari posse CL. GYNZIVS monet l.c. p. 15. In eorum numero nihil certi est. Deinde propius articulationem maxillae inferioris profundam arteriolam, quae capsulae articulationis hujus maxillae, ramoque denique uno vel pluribus, cum nervo duro, per fissuram inter articulationem eam & meatum auditorium subit, ad anteriorem mallei musculum. Ab ista arteriola furculus exit, qui circa meatus auditorii partem posteriorem, superiorem flexus, occurrit ramo stylomastoideo, & cum eo arteriolam membranae tympani constituit (Tab. Pharyng. not. 16.). Vidi, per hiatus anuli, qua dicitur transire musculus exterior, tympani cavitatem subiisse.

Porro sub jugo generat perpetuo *temporalem mediam*, profundioram, quae ante jugum in carnem temporalis, tecta aponeurosi, erepit. Ipse vero truncus subcutaneus, extus adiectus aponeurosi tegente temporalem adscendit, & super jugum denuo fissus in temporalem *internam* & *externam* dividitur. WINSLOWUS & qui eum sequuntur, BOUDON & VERDIER tres ramos Temporalis faciunt *antérieur*, *moyen* & *postérieur*.

- 14 Temporalis profundior.²⁰⁾
 15 Temporalis.
 16 Auricularis anterior.²¹⁾
 17 Temporalis interior.²²⁾
 18 19 Ejus anastomoses cum ophthalmicae ramis.²³⁾
 20 Rami ad frontem, tempora, sinciput.
 22 Temporalis exterior.²⁴⁾

23 Au-

sterieur. Ego duos constanter reperiō. Prius tamen unam alteramve arteriolam mittit versus angulum externum oculi, quae orbicularem adit, anastomoses faciens cum ramis reliquis palpebralibus, & orbitariis, inferioribus & externis. Eam in nostro cadavere dedit transversa faciei (not. 10.)

Haec caeterum arteria *VESALIO* dicta est anterior temporalis L. III. p. 489. & Tab. magn. f. qui tamen, caeterum magnus auctor nihil valde boni hic habet. Est *residuum tertii rami FALLOPII* p. 133. *VIDI T. 27. f. l. u. Noch ein andrer KULMI* p. 81. *EVSTACHIUS* etiam T. XXII. & *CANTIUS* expresse runt, & omnibus in vulgum nota est *temporalis* nomine. Pro trunco habet Carotidis externae *LIEUTAUD* p. 479. ut olim *FALLOPIUS*, sed confer not. 19. ad Pharyngeam.

20) *Mediam* voco, quod neque jugo subjecta, ut temporales profundae a Maxillari interna (ie. ejus art. not. q. r.) neque aponeurosi temporalis superpositae sint, ut temporales vulgo noti rami (20. 22.). Ab hac arteria, in angulo oculi externo, nonnunquam ramus irrepat in orbicularem palpebrae superioris, inosculatus furculis ophthalmicae. Cum temporali interna non raro communicat. Sed etiam supremae auriculae ramum dedisse vidi, qui cum auriculari posteriori & occipitali conjungeretur.

21) *Auriculares anteriores*, qualem hic unicam majorem pingi curavi, solent numerosae esse. Supra originem vero temporalis mediae oriuntur. Immae meatus auditorii adeunt, inosculatae, in retis speciem, cum ramis posterioris auriculae. not. 19. ad art. Pharyngeam) Qui sequuntur tragus, initiumque meatus adeunt, qualis hic pictus est 16).

Alius in helicem it, anthelicem, partem superiorem auditorii meatus. Alius in anthelicem, partem helicis superiorem. Denique supremus, helici datus & communicans cum auriculari posteriori n. 23. Haec ita incerta sunt, ut tamen perpetuo plures auriculares anteriores, ex partium ordine sibi succedant.

22) *Temporalis interna* sive frontalis a temporali, perpetua est, & per superficiem aponeuroseos musculi temporalis externae in frontem migrat, hancque fere totam ramis occupat, ad glabellam usque & partem sincipitis. Haec est *temporale anterieure WINSLOW* n. 70. aliorum & *KULMI* p. 81.

23) Hujus arteriae ramus (18) ad corrugatorem, & orbicularem abit, qui arcum superciliarem cum ramo Ophthalmicae perficit, datque non nunquam ad ipsam orbitae, et per *WINSLOW* observationes (l. c.) glandulae lacrumali. Idem magis superficialis cum aliis ramis ophthalmicae alias facit anastomoses. Hic est secundus ramus *HEISTERI* l. c. n. 17.

24) *Temporalis exterior* s. *sincipitalis* est *Rameau posterior* de *WINSLOW* 70. & *Rameau moyen* ejusdem, cum & istum occipiti tribuat. Ex *WINSLOW* repetunt *BOYDON*, & *VERDIER*. Haec arteria truncus est temporalis arteriae, quae a divisione (22) retrorsum versus aurem paulum se reclinat, & sinciput imprimis totum ramis replet. Cum interna (not. 22.) confinia sua habet prope fontem pulsatilem, cum occipitali anterieus paulo quam futura Lamdoides. Anastomoses sunt fere infinitae, quarum paucas depinxi ad 25. Conf. *HEBENSTREIT* de *arter. confin.* Caeterum cutanea est, & aponeurosi musculi temporalis incumbit, & galeae crani tendinescenti, ad pericranium tamen profundiores ramos dat numerosissimos. Eos ramos vidi in fetu sulcos replere, qui fibras osseas distinguunt, perque eos longe proropere, ut dubium non videatur, fibras osseas esse coagulatam materiam, quam hinc & inde appellens pulsus arteriolarum induravit. Fissuras autem succus osseus effusus videtur replere, & in adultioribus arteriae in periosteo solo manent, inque osseam substantiam parvos ramulos desigunt. Pulchre sed minus distincte habet *LAMIRAL* ic. A. A. O. O. ic. cran. alt. Caeterum *HEVCHE* R O, quando venam temporalis arteriae comitem dari negat, oper. omn. l. p. 534, aegrius fidem adhiberem, cum imprimis eam venam, lociam arteriae, *EVSTACHIUS* icone expresse rit T.

- 23 Auricularis superior.
- 24 Arteriae fincipitales.
- 25 Anastomosis cum occipitali.
- 26 Vena *facialis*. ²⁵⁾
- 27 Vena temporalis.
- 28 Vena facialis in facie adscendens.
- 29 Venae frontales.
- Δ Vena ophthalmica. ²⁶⁾
- 30 Ductus stenonianus.
- 31 Ductus glandulae accessoriae. ²⁷⁾
- 32 Glandula Maxillaris.
- 33 Glandula Parotis.
- 34 Socia Parotidis.
- 35 Masseter musculus.
- 36 Triangularis.
- 37 Quadratus.
- 38 Orbicularis inferior.
- 39 Superior.
- 40 Nasalis labii superioris.
- 41 Buccinator.
- 42 Zygomaticus.

XXIV. nisi nuper inquirendo omnino reperissem, & interiorem, & exteriorem ramum temporalis arteriae absque vena socia fuisse. Plerumque utique adest socia.

25) Hanc perpetuam venam EVSTACHIUS habet, cum anastomosis in frontalibus & infraorbitalibus venis T. XXV. & PLATERVS T. 50. ad b.) & BERRETINVS T. XXIV. f. D. & COWPERVS *Myotom.* T. XXII. N. Anastomosis in superciliis, quibus dextrae & sinistrae venae conjunguntur, etiam COLVMBVS habet p. 163. Angularem vocare merito possis, perpetuo enim in angulum oculi internum, glabellam, frontemque erepit, & cum vena ophthalmica lata anastomosi communicat.

26) Perpetuo hinc in venam faciei, inde in receptaculum sellae equinae communicat, arteriae suae non satis similis, etsi pariter ciliares, sed me-

43 Ele-

dias omnes, & nasales, & meningeam per fissuram ossis sphenoidis alis interjectam ad duram matrem remittat. Hanc habet PLATER p. 36. COWPER app. T. IX. f. 2. & T. 89. BOVDON II. p. 57. sinus autem, repeto, nomen eam ferre non posse.

27) Glandula quidem ista nova non est, ut a SANTORINO picta in tabula muscutorum faciei, perpetua tamen, quam in superiori margine Masseteris, interius sedentem nunquam non reperias, injectam ductui stenoniano. Non tamen raro continuatur Parotidi. Vidi etiam duas fuisse, & ab utraque ductum in stenonianum ivisse. Plerumque tamen peculiaris & sua est Ductum, quantum video, primus descripsi *Comm. Boerb.* l. p. 166. qui in ipso margine Masseteris interno se stenoniano perpetuo inserit, & ad eum omni-

- 43 Elevator labiorum communis. 22
 44 Levator communis labii superioris & alae nasi. 24
 45 Orbicularis palpebrae. 25
 46 Frontalis. 26
 47 Temporalis. 27
 48 Mastoideus. 28
 49 Sectio asperae arteriae. 29
 50 Medulla spinalis. 30
 51 52. Verum medium labii utriusque. 28)

no se habet, ut ad Wahrtonianum Bartholinianus.

28) Ut anastomoses ramorum finistrosum cum dextris demonstrarem, paulo plus quam mediam faciem jussi exprimi. Limitem tamen

verum dimidia faciei his numeris 51. 52. expressi. Caeterum iconem Pharyngeae, etsi nuperius factam, iconi articularum faciei praemissi, quod ordo partium ita requirere videretur.





TABULA ARTERIARUM
FACIES

TABVLA ARTERIARVM INTERIORVM PECTORIS

LECTORI S.

In pectoris arteriis, primo loco danda fuerat icon arteriarum Thoracis exteriorum, & mammariae rami epigastrici. Verum utrumque alias exhibebo. Nunc Interiora, parva neque tamen ignobilia vasa pectoris absolvere visum, bronchialia & oesophagea, quorum naturalis connexio, & anastomoses videbantur jure quodam poscere, ut Mammariarum & subclaviarum surculi conjuncti prodirent. Quod vero bronchialia vasa extra pectus educta pinxerim, eo me omnino necessitas adegit. Etsi enim velles laborem subire destruendarum vertebrarum, ut posteriorem pulmonem partum denudares, etiam ea ratione plurima corrumperes. Deinde brevia cum sint vasa, quae bronchum adeunt & oesophagum, nihil valde in arteriis peccatur quae perinde, cum exemptis visceribus, integrae maquent. Venas corollarii loco, ut parum notas, addidi. Ex teneriori vero puero, annum fere nato, anteriora, ex adultiori octodecim & ultra mensum puero posteriora vasa dedi, cum unum subjectum vix sufficiat picturae trium figurarum, neque selectus semper sit in arbitrio nostro. Picta est bronchialis arteria mense Ianuario MDCCXXXVI. anteriores arteriae eodem mense anni MDCCXXXVII.

TABVLA ARTERIARVM ANTERIVS IN PECTORE SITARVM

EXPLICATIO LITERARVM

- A Hepar obiter expreſſum
- B Diaphragmatis pars dextra
- C Aliqua pars mufculorum abdominis
- D Pericardium per quod cor paſſim pellucet
- E Auris dextra punctis circumſcripta
- F Mucro cordis.
- G Vena Cava inferior
- H Venae pulmonales dextrae
- I Vena Cava ſuperior
- K Ejus in jugularem dextram continuatio ¹⁾
- L Siniftra jugularis
- M Arteriae aortae pars
- N Linea, qua terminatur Pericardium in vena ²⁾ cava
- O Linea qua idem aortae adhaeret ³⁾
- P Thymi pars dextra ⁴⁾

Q Et

¹⁾ Vena jugularis dextra eſt omnino verus et continuus truncus ſuperior venae Cavae. Sed etiam ſiniſtra ſubclavia vena ſenſim ita directionem mutat, ut perinde cum truncu continetur jugularis ejus lateris, ac axillaris Vena.

²⁾ Hanc lineam EVSTACHIVS etiam expreſſit T. XV. f. II. Sed ſurſum oblique in angulum uſque, in quo cava dividitur, poſterius et lateraliter adſcendit adhaeſio.

³⁾ EVSTACHIVS ib. f. 2.

⁴⁾ Duas thymi glandulas eſſe, dudum, repetitis admodum experimentis, confirmor. Nam et ſuperiora cornua, et inferiora, diſtincta ſunt in medio, ubi cohaerere creduntur, et abſque ulla violentia ſeparantur.

Solent autem cornua ſuperiora thymi in recens nato, aut fetu, cui longiſſima ſunt, ante venam ſubclaviam ſiniſtram adſcendere, ut denique contingant thyreoideam glandulam, gracilia, caeterum & in obtuſi conii figuram ſaſtigiata

- Q Et sinistra
R Mediastini lamina sinistra cum pericardio conjuncta s)
S Aspera arteria
T Oesophagus
V Glandula Thyreoidea
X Vena jugularis interna dextra
Y Vena Thyreoidea superior
Z Nervus octavi paris dexter
a Arteriae subclaviae & Carotidis dextrae communis truncus
b Subclavia arteria dextra
c Et Carotis ejus lateris
d Vena mammaria dextra
e Arteria mammaria dextra 6) quae retro venam advenit

f Ar.

stigiata. Neque tamen haec perpetua sunt. Modo enim dextrum cornu, modo sinistrum brevius est, & hoc quidem frequentius, neque eo pertingit, & non raro alterum ipsa subclavia vena brevius est. In adulto, uti in universum thymus pene evanescit, ita maxime super sternum vix unquam adparet. Est ubi utrumque cornu retro subclaviam adscendere vidi, quod rarissimum est.

Semel etiam cornu superius bifidum vidi, uti quadricornem Thymum pingit ex pygmaeo EDMUNDVS TYSON anat. of a pigmy f. 10. M. M. Tricornem etiam WELSCHIVS facit Tab. anatom. n. 53.

Inferiora cornua lata, utcunque triangula, pericardio innatant, multa enim, uti notum est, cellulosa tela cavitas mediastini repletur, in qua thymus sedem suam habet.

Descendunt, alias ad originem vasorum magnorum, alias ad medium pericardium, alias, in fetu, pene ad septum transversum usque, & in ea inferiori longitudine eadem varietas est, quae in superiore. Solet tamen id cornu longius esse inferius, quod superne brevius erat. Ita sinistrum lobum longiorem esse WINSLOWVS ait n. 37. quod cum meis experimentis consentit, si de inferiori lobo acceperis. Media pars thymi medio modo se habet, non ita, ut cornua su-

periora tenuis, neque crassa ut inferiora. Contiguus ibi est uterque thymus, sed separabilis. Ea pars Aortae incumbit, & cavae venae. Caeterum de thymo ejusque cavea erudite disputavit Gen. D. A. L. de HUGO in inaugurali diss. Addo esse, cur mireris figuram thymi tolerabilem nondum reperiri, quae in situ suo naturali depicta sit, ipsumque EVSTACHIUM (T. XV. f. 1.) ovalem praeter omnem observationem pinxisse. CHESOLDENIANA icon T. XIV. ed. III. figuram utcunque exprimit, vasa vicina & situm non demonstrat. VERHEYENIANA L. II. T. VI. f. 2. satis bene duas glandulas contiguas, & superne rotundas, inferne latissimas exhibet, omni vicinia perinde destituitur. De aliis nihil attinet dicere.

5) Non necesse est hic explicare Mediastini naturam, quam esse ipsam utrinque pleuram, & anterieus inter sternum & pericardium, & posterius inter pericardium & aortam sibi a dextris & sinistris contiguam, multa vero cellulosa conjunctam, & anterieus thymum, posterius aortam & oesophagum continere, notissimum est.

6) Harum arteriarum origo valde constans est. Oritur & dextra, & sinistra, simillima, a subclaviae trunco, e regione thyreoideae inferioris, eodem loco, ubi & arteria intercostalis suprema

- f Arteriae Mammariae dextrae Ramus Pericardiaco Diaphragmaticus.
- g Rami ad Pericardium, glandulasque cavae venae incumbentes.
- h Ramus comes nervi Diaphragmatici. 7)
- i Ramuli superficiales ad pulmonem.
- k Alii ad Pericardium.
- l Phrenicae dextrae arteriae ramus.
- m Ramus adscendens cum nervo Diaphragmatico.
- n Anastomosis utriusque arteriolae hunc nervum comitantis.
- o Arteriae Phrenicae dextrae ad rami diaphragma.

p Ana-

ma, sed posterior prodit, ad latus nervi Phrenici, & internum scaleni interioris limitem in ipso apice ultimo, pene conico, sacci pleurae. Neque ego unquam truncum utriusque lateris mammariam daturum vidi, qualem VESALIUS describit l. c. p. 465. & ex eo varii, qui magnum virum exscribunt, auctores.

Descendit introrsum utrinque, pleurae adjecta, in mediastini cavo, & retro sternum se conjicit. Prius tamen, quam eo veniat, perpetuo fere edit ramum superficialem, qui modo trans venam jugularem ad glandulas ipsi impositas; modo secundum claviculam ad superiora Scapulae venit (ut in ic. Thyreoid. inf.) & imis musculis colli transversus accedit, loco rami art. Thyreoidae, modo omnino ad Scapulae superspinalem, modo unice cutaneus circa sternum & claviculam ludit, & in sternohyoideum, atque sternothyreoidium. Deinde Mammaria retro costarum cartilagine, in loco sterni valde vicino, ita descendit, (VESAL. L. VI. f. 2.) inter musculum intercostalem internum & sternocostales, ut sensim a tertia costa extrorsum vergat, ad marginem usque costae septimae vel octavae, sub quo exit & musculis nunc solistegitur. In eo itinere, quo pectore continetur, dat introrsum bronchiale superiorem nonnunquam, perpetuo vero Phrenici nervi comitem, & Thymicam, & mediastinas minores, quales etiam RVYSCHIVS pinxit Epist. II. T. II. f. 3. DD. & habet LIEVTAVD p. 240. & majorem, not. 13. quae & mediastino & pericardio & septo transverso prospicit, & minores denique tot pene, quod costae sunt,

quae & ad sterni interiora veniunt, anastomoses ibi facturae cum lateris alterni ramulis, & ante sternum in periosseo simili recte ludentes. Ex iis mediastinae minores saepe oriuntur, sed singularibus tamen etiam trunculis in aliis corporibus ex Mammaria prodeunt. Extrorsum vero Mammaria tot etiam ramos mittit, quot costarum sunt intervalla, quos inferius fusius recensebo. Dum autem confluentibus costarum cartilaginibus protegitur, ad sextam costam, magnum ramum generat Musculo phrenicum, longiore descriptione dignum.

7) Ramus Mammariae, qui comes est nervi Phrenici, oritur non raro ex communi cum thymica superiori trunculo. Alias supra eum trunculum sola provenit, & ita plerumque reperio. Valde parva est, & vix memoria digna, nisi perpetua esset, & ab omnibus Scriptoribus ipsoque VESALIO recepta l. c. p. 465. & a VERHEYNO praeter omnem veri speciem pro nova arteria descripta L. II. Tr. III. c. 4. p. 155. Pericardio Diaphragmaticam etiam vocavit RVYSCHIVS & amplam depinxit l. c. A. E. Diaphragmaticam eandem dixit LIEVTAVD p. 240. & diaphragmaticam superiorem vocat HEISTERVS p. 157. WALTHERVS, WINSLOWVS vocat Pericardine III. n. 85. & ab ea distinguit mediastinam n. 86. quam oportet esse ramulum aliquam mammariae inter superiores, ad mediastinam datum, cui, quod minus constans sit, nomen nullum inposui not. 6.

Haec Arteriola in dextro latere glandulis in venae Cavae trunco sitis, pericardii parti superiori dextrae, tunicis Aortae, mediastino, in sinistro latere

p Anastomoses cum ramulis phrenicae a mammaria. 8)

q Arteria thymica dextra. 9)

r Ar-

latere iisdem & ductui arterioso, utrinque vero thymo, superficiei pulmonis, & venarum pulmonalium superiorum, tum pericardio inferiori, denique septo transverso furculos dat, si inferior abfuerit, & in hoc cadavere non raro anastomosi cum ramo adscendente phrenicae conjuncta est.

Vidi trunculum istum a superficiali mammariae ramo in jugulo ortum esse. Plerumque tamen in apice pleurae haud longe ab origine mammariae nascitur.

Et unicus & duplex visus est. Cum pericardiacis, thymicis, mediastinis, varie inosculatur. Omnes vero mediastinas, thymicas, pericardiacas, pro desperatis relinqui jubet LIEUTAUD p. 481. ut quae nullo sermone possent enarrari.

Vena, comes sinistra fere semper est a bronchiali, dextra a mammaria, aut a divisione cavae WINSLOW n. 58. GALENUS, quod mireris, & mediastinas & thymicas & pericardias venas habet *de art. & ven. dissect.* c. 2. & 5. Nostram VESALIUS dixit L. III. c. 7. & pinxit cum nervo comite ramisque pericardiacis L. VI. f. 1. Q. arteriam non habet. Habet etiam venam COLUMBUS p. 169. EUSTACHIUS permagnam pingit T. VIII. f. 3. & in sinistro latere describit de vena f. P. p. 281. Mediastinam vocant c. BAUHINUS p. 210. SPIGELIUS L. V. c. 4. p. 168. BOURDON p. 347. RAU apud VALENTIN p. 106. Haec est vena illa singularis D. de MARCHETTIS p. 79. diverso vero trunco prodire facit a thymicis. VERHEYENIO p. 376. (qui a cava deducit) est diaphragmatica superior. Diaphragmaticam vocant BOUDON p. 361. & LIEUTAUD p. 240. qui p. 503. eam venam in sinistro solum latere ait reperiri, sed de vena Intercoastali superiori ipsa loqui videtur. Haec vena comes nervi phrenici egregias anastomoses cum socia lateris alterni facit in septo transverso, a dextro in sinistrum latus continuatas, & in pericardio, atque cum venis demum Phrenicis communicat, ut EUSTACHIUS olim vidit p. 281. Sed omnes minores pectoris venulae, Phrenici comes, & intercoastalis superior, & Thymici, & mediastinae inferiores, passim inter se inosculantur, ut recte monet WALTHERUS progr. a. 1731. edito.

8) In hoc cadavere, Arteria Phrenica dextra ex Aorta de more infra septum transversum nata, adscendit per foramen venae Cavae, atque dexterior in thoracem advenit. Ibi trunco trans venam introrsum ivit, deditque septo transverso ramos, & pericardio, & comitem

nervi phrenici, cum descendente ramo inosculatum. n. 7. Alio ramo vero in abdomen unde venerat, rediit ad hepar. Alias ad sedem utriusque nervi phrenici saepe diaphragma perforavit, & contra nervum adscendit, dedit pericardio, & superiori comiti Phrenicae inosculata est.

9) Thymica vasa, ut in his minutiis fieri solet, non satis perpetua sunt. Ita tamen plerumque se habent.

Pars media arterias habet a mammaria. Et frequenter omnino ramus omnium primus mammariae, quem in pectore edit, thymum adit, unum sui lateris aut utrumque.

Is ramus non raro generat comitem arteriam Phrenici nervi. Notum vero fuit plerisque anatomicis, aliquid thymum a mammaria arteria accipere, ut c. BAUHINO p. 239. & tot aliis.

Alias a comite Phrenici diversus est is trunculus, & modo prius ortus, modo inferior.

Sed & illa comes nervi Phrenici ad thymum graciles, ut parva est, furculos exhibet.

Rarius est, a radice communi subclaviae dextrae & Carotidis thymicam venisse dextram, bis tamen visum, & bis ex trunco aortae continuo super Pericardium, quod vix notatum reperio.

Cornua inferiora ramos habent a Mediastina majori, quam edit mammaria not. 6. & not. 13.

Cornua superiora plerumque aliquos ramos a Thyreoideis superioribus habent in collo. A carotide interna habuisse vidi, sed hoc rarum est. A mammariae ramo superficiali, non valde frequenter.

Unicam a mammaria thymicam arteriam describit VESALIUS L. III. c. 12. unam WINSLOWUS, qui etiam a trunco communi subclaviae & carotidis vidit prodire n. 84. unam D. LIEUTAUD. Sed & Mediastina WALTHERI ex vicinia phrenicae superioris & ramis suis vera thymica esse videtur p. 6. idemque de fere omnium auctorum *mediastina* iudicium meum est. Minutius loca auctorum non persequor, quod plerique parum in his studiosi fuerint. Perpetuum fere est, in eodem corpore thymum habere arterias a thyreoideis, mammaria, mediastinis, phrenicisque nervi comitibus, octo adeo ad minimum trunculos, & saepe multo plures.

Venae in universum non sunt arteriarum similes. Subclavia nempe sinistra duas, & plerumque tres, in uno strato Thymicas edit, raro unam ut WINSLOW n. 62. & vulgo scribunt,

- r Arteria pericardiaca posterior superior inde orta. ¹⁰⁾
 s Arteria thymica sinistra posterior, pariter inde proveniens.
 t Vena thymica dextra.
 u Arteriarum Mammariarum rami, qui thorace exeunt. ¹¹⁾

x Divi-

vel anteriores minores, vel posteriores majores & plerumque utrinque glandulae prospicientes, & non raro generaturas comitem nervi Phrenici. Eae thymicae mediastino etiam prospiciunt, & cum mediastinis inferioribus communicant. Sed etiam mammae venae, uti arteriae, medio thymo ramos mittunt, maxime dextra, vel una cum subclaviae ramo, vel sola. Vidi omnino septem fuisse venas, ut in uno corpore unam thyreoideae, tres subclavia sinistra, unam divisio cavae, aliam jugularis, aliam mammae ederet.

Sinistrae a Bronchiali sinistra, etiam in hac icona, provenerunt aliquae: Perpetuo vero a thyreoideis, mammae dextra, subclaviis, & intercostali superiori sinistra, & mediastinis ramuli thymum adeunt.

Inferiores venae, tum quae in collo sunt, arterias sic satis exprimunt, & a thyreoideis quidem illae veniunt. Eas habet etiam WINSLOW n. 62. Nonnunquam tamen a colli rete cutaneo oriuntur, aut a jugulari vena, quod rarius. Minores inferiores a phrenici nervi comite, & a Mediastinis majoribus, arteriarum similes sunt. Caeterum peculiare Pericardiacas & mediastinas venas a subclavia, dictas veteribus multis, & nuper HEISTERO p. 157. & WINSLOWO n. 57. 63. WALTHERO progr. a. 1731. a thymicis diversas, raro reperiri credo, qui nunquam viderim, & fere ita explico, quod in adultis quae fuerint VIRI EXIMI; sed ibi thymus fere evanuit, atque ipsius vasa facile possunt ad vicinas partes referri.

¹⁰⁾ Vide in sequente programme descriptas.

¹¹⁾ Horum ramorum, interim dum icon non facillima paratur, dabo historiam. Dum secundum sternum descendit Mammae, ex quatuor costarum superiorum intervallis, proxime sternum, perpetuo ramos edit superficiales, qui vel per intimam illam triangularem sedem inter sternum & musculos intercostales internos, vel etiam exterius, istis perforatis, ad musculos pectoris cutemque veniunt, vel singulae in suo intervallo, & cum ramis extrorsum inter costas euntibus conjunctae, vel distinctae etiam, ut duo sint in uno intervallo rami exteriores, muscularis & intercostalis, & nonnunquam in uno intervallo duo inter costas eant.

Primi intervalli ramus intercostalis profunde descendit in pleuram, & intercostalem primum. Ramus autem superficialis alter internus ad sternum it, cujus utramque faciem pingit, & cum alterni lateris sodali rete facit: alter, vel eodem trunco ortus, ad pectoralem magnum cutemque late exit, & etiam secundum claviculam cum focia alterius lateris coit. Anastomoses duas habet cum Thoracica altera.

Secunda sub costa secunda ad costarum perichondria, pectoralem, & cutem venit, eademque secundum costae secundae marginem extrorsum dato ramo, cum secundae Thoracicae duobus ramis coit. Vidi & ad mamam descendisse.

Tertia majori ramo etiam ad pectoralem, & ad cutem abit. Sed & ipsa saepe mammas adit, ibique vel cum thoracica externa, vel cum ramo secundae & quartae a mammae anastomosis facit. Hanc mammae arteriam habet KULMUS p. 82.

Quarta sub costa quarta ad pectoralem, cutemque similis, exterior tamen, & fere ad finem cartilaginis exit, anastomoses facit perinde, dat mammae nonnunquam, & cum superioribus mammae ramis ex mammae tertia & secunda, & thoracica aliqua ortis, anastomoses habet prope papillam (Cl. GUNZ de mamm. p. 20.

Quinta, sub costa quinta, pariter & ad cartilagineas costarum rete dat vasculosum, & exit ad cutem, pectoralem, mamam. Est etiam, ubi ad diaphragma & ligamentum suspensorium ivit.

Ea vero ad sextam costam prodit arteria, quam possis *Musculo Phrenicam* vocare, ad imitationem nervi brachii. Raro parva est, plerumque insignis, & alter quasi truncus Phrenicae. Praeter enim anastomoses cum intercostalibus, statim describendas, extrorsum, tecta costarum cartilaginibus, insigni trunco ramosa adit Diaphragma, & uno trunco in hoc septum late dividitur, multis ramis inosculata & phrenicae verae, & ramis intercostalium ad septum euntibus. Ejusdem furculi etiam per ligamentum suspensorium euntes, communicant cum hepaticae ramis. Alter ramus descendit in transversum & rectum, & hinc cum epigastrica, inde cum lumbalibus anastomoses habet. Eadem, dum extrorsum

vergit

X Divisio Mammariae arteriae.

y Ra-

vergit tecta confluentibus costarum cartilaginibus, per earum intervalla edit furculos varios tum pingentes cartilagines costarum, tum ad obliquum descendantem & ferratum euntes. Hujusmodi a mammariis ramos ad septum euntes, sed brevissimis voculis expriment WINSLOW l. c. n. 175. LIEUTAUD p. 484. & CL. HEBENSTREIT.

Sequitur, ut elegantissimas describam anastomoses horum ramorum mammariae cum Thoracicis & intercostalibus, quibus certe nihil pulchrius esse potest.

Ad singula nempe costarum intervalla unus plerumque rarius mammariae arteriae exit, vel cum superficiali conjunctus, vel, quod rarius, solitarius. Is cito finditur & secundum marginem tam superiorem, quam inferiorem costae cujuslibet, pressim ad os ipsum, extrorsum migrat, donec in superioribus intervallis quatuor vel quinque, cum thoracicae externae furculis profunde se demergentibus, & in imis duobus tribusve intervallis cum ipsis absque medio intercostalibus, in unum continuum anulum abeat, qualem EUSTACHIUS T. XXVII. f. 12. pingit, anastomoses vero solas RUYSCHIUS Ep. cit. T. II. f. 3. a quo viro mea experimenta longe recedunt. Ipse enim mammariarum ramos geminatos ad ramos simplices intercostales depingit, mihi intercostales rami nunquam non duo sunt visi. Etsi vero haec sint perpetua, numerus tamen ramorum & costarum paulum incertus est. Nam & duplices rami visi sunt in uno margine, duaeque anastomoses.

Primus ergo mammariae ramus sub costa prima, duobus ramis communicat cum thoracicae alterius arteriis. Ea thoracica in tertia costa fere finem facit, inter serratos descendens. Alter, sub costa secunda cum eadem Thoracica secunda duas habet anastomoses.

Sub tertia costa jam cum Majori Thoracica anastomoses incipiunt, quae inferrati magni superficie, pollice exterius quam prior, ex subclavia orta, ad ferratum eum & pectoralem, mammam, intercostales, ferratum minorem, infra costam denique quintam descendit. Eadem etiam cum minori Thoracica secunda anastomoses circa costam tertiam habet. Vidi tamen sub tertia costa anastomoses mammariae ad thoracicam secundam pertinuisse.

Sub costa quarta utraque anastomosis mammariae est cum hac ipsa Thoracica majori.

Sub costa quinta superior anastomosis vel ad eandem, vel ad intercostalem pertinet. Habet autem hujusmodi anastomoses sed breviter WINSLOWUS n. 90.

Quae sequuntur, pertinent potius ad intercostales. Nempe prope costarum origines quilibet

trunculus intercostalis ramum unum ad musculos dorfi mittit.

Alter, qui proprie intercostalis est, finditur, & in duos ramos abit.

Eorum ramorum omnino major est, qui secundum marginem inferiorem costae superioris exit, minor, qui secundum superiorem marginem costae inferioris. Descendunt autem frequenter ramuli a superiori trunculo in inferiorem, oblique antrorsum, quales RUYSCHIUS pinxit Thef. I. T. III. f. 3. & minores alii ad periosteum costarum euntes rete faciunt.

Hae intercostales arteriae superne parvae, inferius perpetuo majores fiunt. Inosculantur autem cum Mammariis, ut prima, eo perveniens, sit sub quinta costa vel superior, vel inferior. Deinde duo rami sub sexta costa cum musculo Phrenica, subque septima, cum ejusdem arteriae ramis exterioribus anastomoses faciunt sive circulos, & denique, non perpetuo sub octava, cum eadem arteria, rarius cum Phrenica vera.

Venarum mammariarum anastomoses magis quam arteriarum veteribus notae fuerunt. Eas, quas habent cum Thoracicis, descripsit EUSTACHIUS l. c. *antigr.* XVIII. p. 310. 311. Habet etiam HABICOT Die IV. Lect. VII. & alii. Intercostalium cum mammariis anastomoses EUSTACHIUS describit p. 308. 310. C. BAUHINUS p. 210. & c. Earum denique cum axillaribus conjunctiones FALLOPIUS *instit. anat.* p. 20. *observ. anat.* p. 117. 119. b. EUSTACHIUS p. 309. ARANTIIUS obs. c. 32. AMATUS Cent. V. c. 70. C. BAUHINUS p. 208. BOURDON *descript.* p. 345. & alii. RIOLANUS ita descripsit p. 221. ut manifestum sit non vidiisse. Arterias autem in universum minoris quam venas, fecerunt veteres. Nullam vero in origine venae Mammariae varietatem vidi, sed eam constanter fabricam, quam GALENUS descripsit l. c. c. VI. & EUSTACHIUS iconibus expressit in tabula XXV. & XXVI. ut dextra ex divisione cavae paulo propior subclaviae prodeat, sinistra ex intercostali proxime arteriam. VESALIUS communi trunculo utramque venam mammariam vidit produsse L. VII. c. 3. sed id mihi non contigit videre.

Caeterum, cum mammariarum & thoracicarum cum intercostalibus conjunctiones non videantur separari debere, addo nunc eas, quae in costas superioribus inter thoracicas & intercostales fiunt.

Tres thoracicae ibi singulae cum suis intercostalibus junguntur, quas ad unam revocat WINSLOW n. 123. semper autem reperi vel tres distinctas, ut alibi confirmabitur, vel ad minimum duas, quarum superior illa brevis est, inferior, duas hic descriptas, comprehendit.

Prima thoracica brevis, ad serrati superioris primum

- y Ramus externus five Epigastricus. ¹²⁾
- z Ejus furculi ad exteriora pectoris tegumenta.
- 1 Ramus abdominalis f. Epigastricus interior.
- 2 Exterior five Musculo Phrenica.
- 3 Ramus internus Mammariae five *Phrenico-Pericardiacus*. ¹³⁾
- 4 Ramus ad Mediastinum.
- 5 Surculi ad Pericardium.
- 6 Trunculus ad diaphragma exeuns.
- 7 Arteriae Coronariae anteriores obiter expressae.
- 8 Vena thyreoidea inferior dextra.
- 9 Vena thyreoidea inferior sinistra.
- 10 Inde ramus ad asperam arteriam.

II Et

primum dentem, & primum intercostalem fere consumitur, orta ad marginem externum scapulae primi.

Haec duobus ramis perforat musculos, cumque intercostalis primae, grandioris, duobus ramis, anulus facit in primo intervallo duos.

Sub secunda costa duae cum intercostalibus anastomoses fiunt, quarum superior pertinet ad Thoracicam primam, inferior ad secundam exterius ortam, quam prior, ejusque ramum extrorsum in intercostales subeuntem.

In intervallo tertio thoracicae secundae ramus cum ramo tertiae conjunguntur, & cum intercostali tertia anulum facit. Itidemque cum eadem in inferiori parte hujus intervalli. Ab eo furculo etiam anastomoses cum Mammaria fiunt.

Sub quarta costa, & in superiori parte quinti intervalli, anastomoses sunt inter thoracicae majoris ramos & intercostales. Qui sequuntur anuli, pertinent ad Mammarias, nempe inferior quinti intervalli, & duae sexti, duaeque septimi, & superior octavi. Deinde breviores jam intercostales sub costa octava & nona vel Musculo Phrenicae, vel vulgari diaphragmaticae insertae anulos faciunt. Inferior ramus nonae intercostalis, ad transversum musculum exit postquam anastomosem fecit cum Phrenica alterutra, & multos ibi ramos dat, inosculatos Epigastricae. Sub decima costa intercostalis superior ramus in musculo transverso inosculatus est Epigastricae, & ramo Musculo Phrenicae exteriori. Inferior vero in obliquo descendente, vel cum eadem arteria, vel cum alia ex Femorali adscendente coivit.

Sub undecima itidem superior major, ad descendente obliquum euns, vel cum eadem Epigastrica, vel cum laterali abdominis a femorali orta inosculata est, ad cutem etiam dedit.

Omnes autem ii anuli ita intelligendi sunt, ut continuus circulus sit ab intercostali v. g. sinistrae cujusque origine ex aorta, antrorsum euns, insertus Thoracicae, vel Mammariae: deinde a Thoracica, quoties ea miscetur intercostali, in mammariam, ab ea retro sternum, in mammariam alteram, hic quidem per rete potius quam per anulum, indeque iterum in dextram Thoracicam, intercostalem, aortam. Minores descendentes trans costas, vel sub costis anastomoses superiorum & inferiorum Mammariarum de industria omitto.

Caeterum mammae arterias alias ab aliis truncis provenientes minime ignoro. Dudum *VERSALIUS* L. III. c. 12. obscuras esse arteriarum mammariarum internarum ad mammas propaggines scripsit, & majores externarum *CABROLIUS observ.* VII. Eae ergo a Thoracica secunda, vel tertia, vel nonnunquam a brachiali veniunt, & cum internarum propaginibus coalescunt, internas autem mammarias vere mammas adire recte confirmat *FALLOPIUS observ.* p. 131. *instit. anat.* p. 20. *EUSTACHIUS* p. 130. D. de *MARCHETTIS* p. 36. neque in ea re *GALENUS* l. c. c. V. aut *IACOBUS SYLVIUS Isag.* II. p. 34. b. aut veteres anatomici erraverunt.

¹²⁾ Divisio haec non quidem perpetua est, sed valde frequens, saepe tamen ramus pictus ad 3. minor est.

¹³⁾ Arteria Mammaria infra septimae, & nonnunquam octavae costae appendicem, dat furcu-

- 11 Et alter ad oesophagum.
- 12 Alius ad cornu thymi dextrum.
- 13 Arteria Carotis sinistra.
- 14 Subclavia sinistra.
- 15 Thyreoideae arteriae inferioris rami duo.
- 16 Vertebralis sinistra.
- 17 Et mammaria.
- 18 Hujus ramus mediastinus, qui idem comes Phrenici nervi.
- 19 Ramus Thymicus sinister.
- 20 Divisio mammariae sinistrae.
- 21 Ramus Phrenico Pericardiacus sinister. ¹⁴⁾
- 22 Ramus Epigastricus.
- 23 Vena subclavia sinistra.
- 24 Vena jugularis sinistra.
- 25 Vena Mammaria sinistra.

26 Ra-

furculum introrsum, qui circa Appendicem Enliformem varie ludit, suo socio alterius lateris inosculatus, atque in ejus appendicis perichondria, periostea vicina, originem recti musculi consumitur, & ad cutem. Deinde finditur Mammaria. Ramus anterior, a quo prior furculus saepe oritur, vel simplex in rectum descendit, vel finditur, & uno ramo per anteriora Recti, altero per posteriora descendit, vel inter Rectum & Peritoneum, dat utrique, & transverso, & in recto musculo multis cum Epigastrica anastomosibus communicat. Umbilicum raro adtingit, plerumque superior finitur. Quando eo venit, anastomoses ibi habet cum hepaticis ramulis, comitibus umbilicalis venae.

Ramus externus, quem tamen minime raro musculophrenica generat, secundum marginem costarum, sed infra eum, in obliquum superiorem & transversum extrorsum deflectit, & in rectum etiam ramos dat, hos cum epigastricis, istos cum ramis intercostalium inferiorum, eidem dantibus

musculo, varie inosculatos. Dixi Mammariam retro cartilaginem septimae costae descendere. Est tamen, ubi ramus interior per ipsius cartilaginis medium hiatum ad rectum musculum migrat: quod minime ignotum veteribus, rarum tamen est. Ea tamen via ad mammam ramum exire, ut RIOLANUS habet, p. 231. omni observationi & partium situi repugnat.

14) Notabilis ista arteria saepius visa est oriri sub costa quinta, alias tamen ad quintam & sextam demum.

Ea descendit secundum pericardium, dat continuo mediastino inferiori, dat thymo infimo, pericardio, denique ad septum pervenit, cui antea inferitur notabilibus ramis, ibique plerumque terminatur, inosculata cum phrenica vulgo nota.

Quater tamen vidi perforasse septum, & ad inferiorem partem septi transversi venisse, huic late dedisse ramos. Confer, ic. art. coeliac. 1. not. O & b. HENSING de peritoneo in 1. tomo *disp. anat. select.* n. 41.

H

Sed


- 26 Ramus thymicus finifter.
- 27 Ramus superficialis.
- 28 Vena bronchialis finiftra. ¹⁵⁾
- 29 Ramus thymicus.
- 30 Ramus mediaftinus.
- 31 Ramus bronchialis.
- 32 Vena thyreoidea media finiftra.

Sed in hepatis praeterea partem gibbam vidi
fuiſſe inferam, cum ligamento ſuſpenſorio, in-
oſculatam ramulis hepaticis. Alias, praeter
hanc unicam arteriam, a Mammaria duae, tres,
mediaſtinum & pericardium inferius ad ſecun-

dam, tertiam, quartam, ſextam, coſtam, deſcen-
dunt, ſupra not. 6. breviter tactae, & fere exi-
guae.

15) v. Tab. bronch. not. 5.





ARTERIAE ANTERIORES PECTORIS INTERNI.
Kaltenhofer sc. et del. ad Nat. Gott.

T A B V L A

ARTERIARVM BRONCHIALIVM.

Pulmones cum corde & mediastino exempti, unaque asperae arteriae, oesophagi, & aortae, quantum in thora-
ce est.

FIGVRA I.

Aorta ad sinistra reclinata, ut vasa bronchialia dextri lateris melius adpareant.

EXPLICATIO LITERARVM.

A B C Pulmo dexter.

A Lobus infimus.

B Supremus.

C Medius. ¹⁾

D E Pulmo finifter.

D Lobus imus.

E Superior.

F F Oesophagus.

G G G Aorta.

H H

1) Notissimum est, pulmonis dextri plerum-
que tres lobos esse. Sed id in sinistro etiam lobo
non rarissime reperio. Ita etiam videtur pin-

xisse VESALIUS L. VI. f. 4. & distinctius EUSTA-
CHIUS T. IX. & T. XV. in omnibus figuris &
C. BAUHINUS & PLATERUS p. 112. & alii.
H 2

H H Rami in abdomine obiter expressi, coeliaca & mesenterica.

I Arcus aortae. ²⁾

K Truncus subclaviae & Carotidis dextrae.

L Dextra subclavia.

M Carotis dextra.

N Sinistra.

O Subclavia sinistra.

P Pericardium posterius pleura tectum.

Q Q Mediastinum posterius.

R Vena Cava.

S Azygos.

T Ramus intercostalis superior ad intervallum. II. ³⁾ & III.

VV

²⁾ Nullam haëtenus in arcu Aortae varietatem reperi, praeter ortam ex arcu Vertebralem finistram.

³⁾ Venae sine pari historiam quidem hic non repeto. Paucis tamen addo, ex azyga, ubi primum vertebra adigit, ad quartam costam, VESALIUS L. III. 7. p. 464. oriri venam *intercostalem superiorem dextram*, (WINSL. III. n. 45.) quae plerisque superioribus intervallis prospiciat. Supremum enim plerumque ab azyga ramum non accipit, uti nudum etiam ab azyga in iconibus relinquit EVSTACHIVS T. VIII. conf. HEISTERI icon Cent. VII. VIII. obs. 64. Sed & secundum intervallum propriam saepe venam habet, quam a subclavia plerumque, aliquando tamen etiam a vena Cava, (quale quid VESALIUS vidit *de humer. ar.* p. 31.) arcu facta, prodire vidi, & quae uni intervallo prospicit, & nonnunquam duobus, ut SPIGELIUS l. c. p. 167. 168. & EVSTACHIVS, C. BAVHINVS N. HIGHMOR. T. XVII. VESLINGIUS T. 2. c. X. utrinque. Tribus vero intervallis paullo rarius, neque certe in cadavere a me ipso dissecto, ramos dat. Ita tamen vidit GALENVS *de ven. diss.* c. 2. ubi bonam descriptionem hujus venae dedit, etsi ex simia sit, & VIDVS T. XXIII. p. 3. COLVMBVS p. 116. L. VI. FALLOPIVS *instit.* p. 20. & EVSTACHIVS p. 304. 305. Nam quatuor ramos dare, ut plerique superioris aevi scriptores habent, non facile crediderim. Vidi tamen, neque rarissime, hanc intercostalem a subclavia in latere dextro nullam fuisse, ut nullam pingit EVSTACHIVS T. XXVI. Ita etiam de-

scripsit IACOBUS SYLVIVS *Isag. anat.* p. 70. b. & aliquando se habere VESALIUS p. 464. Nullam etiam pingit LANCISIUS. Ita porro intercostalem dextram adesse negat DOMINICVS DE MARCHETTIS p. 76. De sinistro latere continuo dicitur. Cum vena vertebrali & haec dextra, & sinistra intercostalis, non raro conjungitur. Id etiam HABICOTVS habet *Jepr. anat.* D. IV. lect. VII.

⁴⁾ Divisio Azygae venae non semper certa est. Ad sextam costam, frequenter ramum vidi per intervallum quintum ad sinistra transeuntem, qui sursum cum intercostali superiori, deorsum cum sequente communicat. Quando is ramus abest, tunc ad septimum usque intervallum superior intercostalis descendit. Unum habet EVSTACHIVS T. VIII. f. 3. duos fig. 2. & describit p. 301. tum LANCISIUS in ic. de ven. f. p. quam sibi tribuit PETRIOLVS ad EVSTACHIVM p. 81. & FALLOPIVS de ven. obs. V. & alii.

Sed ad septimam, vel plerumque ad octavam costam, aut ad nonam, ut VESALIUS l. c. p. 461. & 462. cum ic. VALVERDVS L. VI. f. 7. p. 269. RIOLANVS p. 221. ad sextam vero in icone LEONCENAE *Phil. Trans.* n. 280. f. VI. ramus princeps, perpetuus fere, sinistrorsum migrat, ibique in *Hemiazygam* abit, dextri lateris trunco similem, quae quatuor vel quinque inferioribus intervallis ramos exhibet. EVSTACHIVS utique eum habet ad octavum intervallum ortum T. VIII. f. 1. 2. 3. & T. XXVI. LANCIS. l. c. Hic trunculus modo una radice oritur, modo duabus, coalescentibus, ex septimo, octavo & nono etiam intervallo

V V 1. 2. 3. Venae intercostales

X Divisio Azygae.

Y Truncus dexter

Z Sinister

Δ Aspera

Σ Bronchus dexter

a Vena bronchialis sinistra 5)

b Trun-

vallo. De eo WINSLOWVS agit n. 50. An haec fuerit azygos sinistra dextrae par DOMIN. PANAROLI *latralog.* III. *obs.* 19?

Finis utriusque Azygae ita se habere mihi visus est.

Sub ima costa fere semper uterque truncus transverlo ramo in prima lumbali vertebra communicat, quod miror in iconibus excidisse EVSTACHIO, & reliquis anatomicis. Deinde utraque abdomine exit retro diaphragma, & sinistra lumbali primae, ut EVSTACHIVS T. XXVI. aut secundae, ut EVSTACHIVS T. IV. F. 1. 3. aut, quod rarius est, tertiae, & cum lumbali vel Cavae, vel renali sinistrae, vel ramo communicanti inter Cavam & Renalem, quale quid RIOLANVS describit p. 222. aut, quod rarius, Cavae ut NICOLAI p. 94. & aliqui passim veterum, aut renali proxime spermaticam inferitur, quod frequens est. Ita EVSTACHIVS l. c. f. 2. & p. 308. FALLOP. *obs. anat.* p. 120. & *de venis obs.* V. SPIGEL. L. V. C. 4. p. 167. C. BAVHIN. p. 208. D. de MARCHETT. p. 76. FR. MICHINVS de S. ANGELO apud MARCELLVM DONATVM *bist. mirab.* p. 210. MOLINETTVS *diff. anat. patholog.* p. 240. IASOLINVS *de cordis adipe* p. m. 14. SALOMONALBERTI edit. II. p. 71. ZOD. MED. GALL. I. p. 78. LEONCENA l. c. RAV. ap. VALENTIN p. 106. HEISTER l. c. & plerique anatomici vident. Spermaticae inferi rarius est, habet tamen VIDVS T. XXV. ad c. & LANCISIUS l. c.

Dextra vero azygos Cavae venae trunco aut continuo inferitur, & absque alio trunco medio, ut MOLINETTVS l. c. LEONCENA Ph. Tr. l. c. BAVH. p. 208. LANCISIUS, SPIGEL l. c. KYLMVS *anat.* Tab. p. 86. BRESL. 1718 febr. CASSEBOHM apud KIESWETTER *de calc. sinistr. ren. freq.* p. 10. & plerique alii. Invenisse vero NICOLAVM SAMMICHELIVM NOSOCOMENSEM hanc azygae cum emulgente anastomosin, ait H. FABRICIVS ab AQUA PENDENTE Chir. L. II. C. 22. p. 111. & *de omento* p. 104. 127. ex eo vero GVERN. ROLFINK *diff. anat.* p. 939. & T. BARTHOLINVS p. 637. De

eo vero viro vix quidquam praeterea innotuit. Alias in lumbalem primam, deinde in Cavam se immittit, uti habet C. BAVH. p. 208. SPIGEL l. c. aut in secundam ut FALLOPIVS p. 121. quod ex tertiae vertebrae nomine auguror, & EVSTACHIVS p. 308. aut in tertiam si VIDO fides T. XXV. in renalem inferi LAURENTIVS p. 231. f. 2. MOLINETTVS, ROLFINK l. c. BARTHOLINVS p. 637. VERDIER II. p. 370. quod rarum ait esse, & vere omnino FALLOPIVS p. 121. & negat se vidisse EVSTACHIVS p. 308. Cum aliquo ramo Cavae aut emulgentis communicare magis generaliter SAL. ALBERTI. Lumbalibus & quandoque emulgentibus inferi VERHEYEN p. 376. & DIEMERBROECK l. c.

Vidi etiam Azygam dextram fissam fuisse ad costam undecimam, & ramum minorem in intercostali undecima finem fecisse sui, majorem vero cum duodecima & prima lumbali conjunctum in cavam ivisse, neque hoc rarum est.

Aliam varietatem EVSTACHIVS habet T. XXVI. ubi & cum lumbali prima & cum Cava conjunctam pingit.

Habet etiam varias fabricas WINSLOW. III. *tr. des veines* n. 42. FALLOPIVS p. 120. BOVDON II. p. 260.

Cum cruralibus communicasse PLATERVS p. 113. cum Iliacis in hystrice viderunt PARISIINI in homine MVRALTVS, *vademec. anat.* 365. et nuper CL. SCHMIEDLINVS *de vasor varietatibus*. In osculationem vero venae sine pare cum vena renali negare ut VESALIUS *Exerc. Fallop.* p. 85. aut adserere, nullum azygae cum Cava commercium fuisse, ut RIOLANVS *Anthropol.* p. 221. bis terve se ait vidisse, aut rarum id esse ut NICOLAI p. 95. ea omnia ab anatome recedunt nunquam enim vidi aut dextram, aut sinistram azygam absque conjunctione cum vasis in Cavam venam insertis fuisse.

5) Sive *intercostalem* dicere malis *superiorem sinistram*, ut WINSLOWVS n. 66. seqq. cujus perbrevis est descriptio, & alii, perpetua vena est, et ab EVSTACHIO picta fuit T. II. f. 3. & egregie descripta *de ven. f. par.* 381. Duas vel tres facit D. de

MAR-

- b Truncus trans aortam in intercostalia spatia insertus
- c Rami ad oesophagum
- d Ad asperam arteriam
- e Iterum ad oesophagum
- f Ad eundem
- g In tunicas aortae
- h Arteria pericardiaca posterior & superior a subclavia sinistra orta ad oesophagum & asperam 6)
- i Eadem

MARCHETTI p. 76. Primus autem plene, cumque ramis bronchialibus descripsit ILL. WALTHERVS in Progr. a. 1731. edito, cum nomine *diaphragmaticae*. Ea ergo vena a trunco subclavio ejus lateris descendit, & trans arteriam pulmonalem extrorsum retrorsum se confert, communicans nonnunquam ramo transverso cum thyreoidea inferiori, donec truncum Aortae contingat, per quem, sub ortu magnorum ramorum, meat transversa, & ubi vertebrae attingit, intervallo supremo, duobus, ut LEONCENA, tribus, quatuor, etiam sex omnino & septem, & octo denique, & decem, intercostales dat, duas quidem fere sursum euntes, reliquas descendentes, donec omnino inferius vel in medium ramum venae sine Pari, quando ipsa minor est, (ut apud EVSTACHIUM T. IV. f. 3.) vel in majorem inferiorem inferatur, ubi major. Superius vero vel omnia intervalla replet, vel, quod multo rarius, in intercostalem peculiarem superiorem ex subclavia exterius ortam, dextrae similem, inosculatur, quae tamen rarissime adest. Describit EVSTACHIUS l. c. p. 300. & inferi ad sextam, nonam, undecimam demum costam confirmat.

Ramos autem edit minores, primo thymicam plerumque, deinde comitem Phrenici nervi, vel duas nonnunquam comites, quae, prouti ad priorem iconem dictum est, pleurae, pericardio, truncis arteriarum magnarum, thymo, mediastino, septo transverso ramos exhibet. Eam habet EVSTACHIUS p. 300. & WALTHER l. c. Hae sunt mediastinae ab azyga VALVERDI p. 269. & aliorum l. c. Porro parvos ramos edit ad glandulas bronchiales incumbentes arteriae pulmonali, ad superficiem pulmonis, ductum arteriosum, pericardii vicinam partem supremam. Deinde *bronchiale venam* inter Aortam, & pulmonum finistram arteriam, profunde adrepentem, edit. Ea bronchialis plerumque non simplex est, & cum intercostali ramo in ipsa Aorta rete facit, neque raro plures ex eo rete bronchiales finistram pulmonem adeunt, ut duae sint ve-

nae bronchiales, una socia arteriae pulmonalis, altera inferior, sub ductu arterioso, retro arteriam pulmonalem. Ita duplicem esse plerumque observat Cl. LIEVTAUD. Ab eadem porro vena bronchiali plerumque unus pluresque rami Oesophagum adeunt. Sursum autem in broncho cum ramis thyreoideae inferioris, qui cum broncho adveniunt, communicat.

Hae videntur illae venae bronchiales, quas ex intercostalibus prodiisse vidit ILL. HEISTERVS not. 42. ad *Comp. anat.* Unam habet WINSLOW n. 68. & *Tr. de la poitrine* n. 424. Habet etiam WALTHERVS, KVLMS p. 86. TABARRANI *observ. anat.* n. 39. FERREIN in diss. LIEVTAUD p. 222. Disertius vero dextram quidem bronchiale venam ab azyga, finistram ad Cavam pertinere monet Cl. ROSEEN in anatome sue cica lingua edita, ob multas vero rariores observationes commendabili p. 191.

Varietates dixi, vena ipsa est perpetua, semel tamen ex thyreoidea inferiori, non ex subclavia, vidi prodiisse.

Deinde semel vidi ex sinu pulmonali ex radice venae pulmonalis dextrae superioris, & semel ex Vena Pulmonali ipsa, ramum exivisse ad glandulas bronchiales, & pulmonis substantiam, non magnam. Hujusmodi fuerunt illae anomaliae venae WINSLOW dictae, & citatae in mea de *vasis bronchialibus & oesophageis* diss. not. y.

6) Sive Bronchialia haec vascula malis vocare, sive *Pericardiacas posteriores & superiores*, perinde est, etsi posterior appellatio minorem confusionis metum habet. Ea descripsi ad Boerh. III. n. CCCVIII. not. a. & *ic. art. Thyreoid. inf.* I. not. m, eaque intelligere videtur Cl. HEBENSTREIT de *arter. & venar. confin.* p. VII.

Hujusmodi arteriolae, perpetuae, veniunt in posteriorem superiorem partem pericardii, truncum arteriae pulmonalis utrumque, glandulas incumbentes huic trunco, asperae arteriae ramos, vicinos huic ipsi arteriae Aortae vicinae, & ductus arteriosi membranas, denique in oesophagum.

Ori-

i Eadem a subclavia dextra ad truncum aortae & asperam arteriam.

k Arteria bronchoesophagea ex Aorta

o Arteria & vena oesophagea a bronchiali dextra

l Arteria bronchialis dextra 7)

m In-

Oritur vero haec arteria in dextro latere a mammaria non raro, (Tab. vas. anter. pect.) alias a trunco communi subclaviae & carotidis dextrae, vel a trunco subclaviae dextrae, qualem a subclavia ad oesophagum videtur reperisse. Cl. HEBENSTREIT l. c. vel a trunco intercostalis superioris, quem dat subclavia, etiam oesophago datura, vel a thyreoidea, vel a trunco ipso Aortae sub magnis ramis, vel quod rarissimum, prius quam eos ramos edat, continuo super adhaesionem pericardii. Dextra ergo arteria Pericardiaca posterior superior conflexa circa Cavam venam, truncumve subclaviae dextrae ad posteriora, & ad illud intervallum, quod inter arcum aortae & bronchos est, descendit, ibique cum verae bronchialis arteriae ramis non raro coalescit.

Sinistra plerumque a trunco subclaviae exit, antequam det vertebralem, vel ultra eam, & ultra nonnunquam mammariam, vel a mammaria sinistra, vel ab ipso aortae trunco post datos magnos ramos, ubi ductus arteriosus nascitur, vel ab intercostali superiori Aortica, aut sola, aut & ab ipsa, & a proxime inferiori intercostali. Est ubi ad vertebrae pervenit, & inosculata est intercostali primae inter Aorticas. Est ubi haec arteria thymicam phrenici nervi comitem, & pericardiacas aliquas generavit. Est denique, ubi potuit pro bronchiali vera haberi, etsi a subclavia oriretur, cum non superficiem solam bronchi extra pulmonem, sed in ipso pulmone bronchum comitaretur. Abit autem ad pulmonalem arteriam, bronchum sinistri lateris, arteriosum ductum, aortae tunicas, glandulas bronchiales, pleuram retro pericardium positam, pericardium.

Venae Pericardiaca posterior superior orientur a subclavia sinistra, & a Bronchiali sinistra, a dextra vero mammaria, similes facturae ramos inter arcum aortae & asperam, ad glandulas bronchiales, oesophagum. Alias a vena Cava ipsa, ex divisione, retro cavam, descendens venula hanc omnem, inter aortae arcum & bronchum sedem, & oesophagum adiit, quae forte est bronchialis illa vena, quam ex Cava oriri aliqui, quos proxime citabo, anatomici dixerunt.

7) Arterias bronchiales in universum, veteribus omnibus, inde ab ERASISTRATO fuisse notissimas, alibi ostendi. GALENVS ergo de loc. adfect. l. V. cap. 3. conferendo cum arter. & venar. dissect. c. IX. & Arabes, ut RHazes ad ALMANZOREM c. VI. & AVICENNA oper. edit. Venet. 1555.

p. 18. & FERNELIVS (part. corp. descr. c. XII. p. 41.) arteriam ab Aorta ad Pulmones eundem descripserunt. COLVMBVS primus negavit, arteriam pulmoni offerri propriam p. 185. quae fortasse inter causas fuit neglectus, quam in posterioribus anatomicis videmus. DOMINICVS tamen a MARCHETTIS cultro potius, quam ex libris eam arteriam detexisse videtur, ante RVYSCHIVM (anatom p. 81. ed. Pat.). RVYSCHIVS tamen utique renovavit obs. anat. post. tr. de Valv. lymph. XV. & intrepide adfirmavit, nemini fuisse notam. Ab eo tempore MVRALTUS, BLASIVS in Miscell. anat. p. 191. KEILIVS, COWPERVS, & reliqui eam receperunt anatomicorum. Ut ordine historiam istam tradamus, tenendum est, arterias Bronchiales esse dextras, sinistras, communes, & vel omnes in uno subjecto vel aliquas adesse. A communi initium faciam.

Valde frequens est utrumque pulmonem habere ab eodem trunco arterioso ramos suos, quod veteribus contigisse videtur, nam ex aorta proveniente & unam, fere communi consensu describunt. Eam etiam vidit inter varietates WINSLOW tr. des arter. n. 109. & L. IV. n. 128. ubi eadem voces repetuntur). Ita in ove viderunt AMSTELODAMENSES apud BLASIVM anatom. anim. p. 99. Hujusmodi etiam est arteria, quam BOVRDON descripsit p. 373. & pinxit T. IV. f. 23. & quam ex vitulo RVYSCHIVS delineavit l. c. VERHEYENIVS vero Tr. III. c. 12. p. m. 195. pro raro casu. Ita etiam describit LIEVTAUD p. 487. ROSEEN p. 190. FERREIN in diss. an fluida tempor. exspir. CASSEBOHM apud GLASS. de circ. sang. p. 59. & alii, communem utrique pulmoni arteriam dixerunt. Id quoties factum est, fere semper ea oritur communi trunco cum intercostalia aortica prima lateris dextri, ita tamen, ut major ramus bronchialis sit, & pulmones adeat, minor ad spatium intercostale tendat. Solet ea ante oesophagum, & saepe ante dextrum bronchum ire, unde nomen *Bronchiale anterieure* WINSLOWI n. 110. & in homine anteriorem partem bronchi saepe perreptare etiam RVYSCHIVS vidit l. c. Caeterum quartae, vel quintae, & nonnunquam sextae costae altitudini respondet. Inter eum ergo bronchum & arteriam pulmonalem dextram, ad eum pulmonem tendit trunco majori, ad sinistram vero pulmonem, paulo postquam orta est, rami edit.

A dextro ramo oesophagus habere solet, & utraque bronchialis non uno sed duobus, tribus, l. 2. quae

m Intercoastalis superior ⁸⁾ inde orta, ad intervallum secundum tendens.

n n Bronchiales ad pulmonem euntes.

o Pars bronchialis sinistrae adparens. ⁹⁾

p p p p Intercoastales arteriae.

q Tres

quatuor truncis circa bronchium suum advenire. Semel vidi ex subclavia dextra sub mammaria ortam fuisse. Tredecies caeterum eam reperi ex aorta pronatam. Bis communes duas vidi, quarum utraque in uno corpore ex aorta, in altero una ex aorta altera ex intercoastali venit. Hi casus fuerunt inter viginti quinque corpora.

Dextra vero Bronchialis pene aequae frequens reperitur. Decies inveni in eodem numero, absque communi, ex intercoastali suprema ortam solam, semel cum communi, seorsum ex Aorta ortam, semel a mammaria proventientem. Plerumque nihil a communi differt, nisi quod pulmoni sinistro ramum nullum mittat. Oritur ergo eodem loco, nempe communi cum intercoastali trunculo, dat oesophago, & asperae arteriae ramis & anteretroque bronchum serpentino ductu suum pulmonem adit. Dat etiam pleurae & pericardii parti superiori, sinui pulmonali, superficiei pulmonis, glandulis bronchialibus. Eadem in vertebri ludens & in broncho, cum intercoastali suprema & cum thyreoidea inosculatur. Habet autem bronchialem ab intercoastali RVYSCH. *Thes.* VI. n. 14. Ep. VI. f. 2. COWPER l. c. WINSLOW n. 109. LIEVTAUVP. 221. CHESELDEN p. 188. GARENGEOT *splanchnol.* II. p. 160. 169. SYLVA *traité de la saign.* II. p. 188. & frequentem esse monuit SALZMAN apud H. A. NICOLAI *de direct. vasorum* p. 62. & BOVDON l. c. & VERHEYEN l. c. p. 195. Ab intercoastali superiori, ex subclavia orta quod rarum est, RVYSCHIVS vidit *Epist.* VI. fig. 3. a secunda dextra intercoastali FERREI *diff. an pulmo in fluida agat. temp. exspir.* A tertia intercoastali inter aorticas RVYSCH l. c. quod credo esse rarissimum. Mihi semper ex prima provenit.

Praeter hanc dextram arteriam non penitus absque exemplo est, aliam inferius ab ortae trunco cum broncho dextro ad pulmonem & oesophagum venisse.

8) Quando vero de intercoastali suprema Aortica dicimus, addendum est, eam intercoastalem plerumque quartum intervallum adire non sextum ut LIEVTAUVP. 486. indeque sursum eunte ramo tertiam etiam, & nonnunquam secundam generare intercoastalem. Conf. BOERH. COMM. III. p. 16. Superior autem illa intercoastalis ex subclavia orta, mihi perpetua visa est. Ea ad unum quidem intervallum satis frequenter, in aequae fere copiosis cor-

poribus ad duo intervalla, ad tertium paulo rarius ramum intercoastalem mittit & cum suprema aorticarum nunquam non communicat.

Adesse omnino aliquam huiusmodi arteriam negavit RIOLANVS in Laurentium p. 641. in BARTHOLINVM p. 776. & GARENGEOTVS in *splanchnologia* & simile quid aliquoties contigisse VERDIER II. p. 343. Sed recte restituit HERSTERVS p. 175. neque ego unquam abfuisse vidi. Ad duo intervalla vidit eundem et WALTHERVS *vas. vertebr.* p. 3. et VALVERDVS p. 280. & VIDVS p. 136. Ad tria VESALIUS L. III. c. 12. p. 486. & olim SYLVIVS p. 386. & RYFF. ic. p. 25. Ad quartum usque SPIGELIVS L. VI. c. 2. p. 189. C. BAVHINVS p. 248. PLATERVS p. 216. 219. HABICOT. D. VII. L. 13. BARTHOLINVS p. 652. VESLING. l. c. DIONIS p. 493. LIEVTAUVP. 486. & veteres in universum. Sed id valde rarum est.

9) Arteria *Bronchialis sinistra*, qualis ab communi oritur, supra dicta est. Alias autem eodem fere loco sed ab ipso Aortae trunco, prodit sinistra in universum ejusdem indolis, & pariter transversa, oesophago datura & bronchialibus glandulis, pleurae, pericardio, sinui pulmonali, WINSLOW n. 112. pulmonis superficiei, & cum communi bronchiali & cum coronariis cordis communicatura.

Frequens autem est, ut praeter eam sinistram, quam tunc oportet *superiorem* vocare, sive ex communi trunco fuerit, sive solitaria, alia inferior ex Aorta proveniat, ex sede secundae, vel tertiae, vel quartae intercoastalis aorticae. Ea socia venae pulmonalis superioris sinistrae prodit, atque Oesophago, glandulis bronchialibus venae pulmonali insidentibus, pleurae, pericardio, mediastino, quod infra asperam arteriam incipit, ramos exhibet. Inosculari cum superiori solet. Ita frequenter reperi secundam istam bronchialem sinistram, ut rarius absit. Reperi nempe sinistram cum communi in eodem subiecto ter cum dextra quater, duas sinistras cum dextra iterum quater, cum dextra a mammaria semel, nullam praeter communem, communesve duas, decies. Semel dextras duas, quarum superior ab intercoastali erat, & sinistras duas aorticas. In reliquis observationibus, quae vetustiores sunt, neglexi inquirere, an praeter communem adesset aliqua; In universum, uti arteria pulmonalis, & pulmo ipse

q Tres Oesophagae parvae ex Aorta. 10)

r Oesophagea arteria.

s Vena ab azyga ad Aortam.

est Vena

ipse dexter, ita etiam arteria hujus lateris major est sinistra. Caeterum ex aorta bronchiale deduxit ERASISTRATVS, GALENVS, & veteres omnes, inter recentiores vero SCHRAEDER *obs. anat. med. Dec. I. n. 6. 7.* MYRALTVS l. c. p. 258. LAMMY *discours anat.* p. 129. NICHOLLS *Praelect.* XVII. p. 29. BOYRDON, sed iste cum rarissima fabrica ortae continuo ex trunco aortae bronchialis. RVYSCHIVS ex aorta prodeuntem bronchiale inter rariora refert. *Ep. cit.* p. 10. *Thef.* IX. n. 63. Certius autem huc, ad sinistram aorticam, refero eam, quam MOLINETTVS ex sinistro latere aortae prodire vidit p. 211. & quam NICOLAI pro rariori casu, & WINSLOW n. 110. & SYLVA II. p. 188. habent: tum quam ex aorta venientem vidit COWPERVS l. c. pinxitque l. c. & VERHEYEN p. 195. & certius adhuc est, quam tertio loco WALTHERVS descripsit *de nerv. inter.* Prog. II. fin. Nostris etiam similia habet LIEVTAUD inter varietates p. 221. cum saepe duplicem esse bronchiale, & unam ab intercostali provenire ajat, tum FERREIN ex eadem ratione, & BOYDON p. 245. Sinistram etiam ii omnes viderunt, qui plures aorticas bronchialis dixerunt, ut KVLMSVSP. 82. D. de MARCHETTIS l. c. TABARRANI *obs. anat.* n. 39. qui duplicem, imo triplicem se vidisse dicit, non explicata origine. Unam vero duasve se vidisse perhibent VERDIER II. p. 244. & DEIDIER *anat. raisonn.* p. 333. Ut denique nostras observationes colligam, has duas fabricas in plerisque corporibus obtinere invenio, ut vel communis ex intercostali adsit cum sinistra aortica superaddita, vel dextra, ex intercostali orta cum sinistra una vel duabus. Caeterum bronchialis arteria sive dextra sive sinistra, in pulmonem cum broncho demersa in tot ramos finditur, quot ipsius sunt bronchi, qui valde flexuoso ductu eos ramos sequuntur, non singuli, sed in uno ramo bini ternive. Flexuosum hoc iter recte observat BLASIVS *Anat. anim.* l. c. non bene vero omittunt in iconibus RVYSCHIVS & WILLIS *Pharm. ration.* J. 2. H. quam fictitiam esse suspicor, & quam clamculum imitatur VERHEYEN T. XXIII. f. 2. Cum arteria pulmonali evidentissimis & magnis anastomosis bronchiales communicant, quas vidit etiam RVYSCHIVS *Epist.* VI. & *mus. rarior.* p. 162. & Cl. PETSCHEN. 43. & COWPERVS ad BIDLOO T. XXIV. f. 1. & T. *append.* III. & SYLVA *tr. des saignées* II. p. 183. Hae anastomoses fiunt tum a ramis ab arteria Pulmonali bronchum conscendentibus,

tum aliis a Bronchiali, de broncho descendentes, & in pulmonis substantiam delatis. Solam vero asperam arteriam alere, neque ad pulmonem aliquid facere, ex aliqua forte invidia KERKRINGIVS scripsit *observ.* 99. Melius LOQVETVS *de arteria hepat.* etiam ad membranas, quae lobulos tegunt, & ad membranas artiarum venarumque pulmonalium ramulos exhibere scripsit. Penetrare nempe in bronchi membranas vere cum KERKRINGIO credit Cl. LIEVTAUD p. 222. Sed, ut hoc verum est, ita a pulmone eam arteriam non oportet excludere.

10) Arteriam oesophageam unicam RVYSCHIVS descripsit, qualem nunquam reperi, neque redertam esse credo. Sed neque duae aut tres sufficiunt, ut WINSLOW habet n. 114. Parvulae enim cum sint, longae esse non possunt. Absque exemplo est arteriam, quae sit eadiametro, ut aegre scalpello praepararetur, progredi ultra unciam. Nimis retardatur sanguis in ea angustia, & si longitudo itineris accederet, stagneret utique.

Ergo primae inter oesophageas thoracicas sunt, quas thyreoideae edunt (*art. thyreod. inf.* & HEBENSTREIT *de confin. vasor.*)

Sequuntur eae, quas Arteriae Pericardiacae posteriores superiores producant (not. 6.) & quae super asperam arteriam ponuntur. Rariores paulo sunt, quas superior intercostalis a subclavia orta nonnunquam producit, qualis est RVYSCHIANA *Epist.* VI. f. III. Tunc arteriae oesophageae a bronchialibus arteriis utriusque lateris proficiscuntur, una duaeve a singulis. Unam ita & a bronchiali ortam facit RVYSCHIVS *obs. anat. post Tr. de Lymph.* Unam etiam vidit WALTHERVS *nerv. inter.* II. furculos vero aliquot VERHEYEN p. 195. Invertit nomen WINSLOWVS, atque ab oesophagea bronchiale dextram nonnunquam prodire dixit, n. 109. & repetit LIEVTAUD p. 221. Sed rami ad oesophagum euntes pulmonali trunco semper multo minores sunt. His congenere sunt & substitutae nonnunquam, quas intercostalis inter aorticas suprema mittit, aut alia aliqua (HEBENSTREIT *de confin. vasor.*) aut Aorta, vicinae & intermixtae bronchialibus.

Reliquae Oesophageae, intra bronchiales, sunt aorticae. Earum sex septemve sunt, paulo pauciores intercostalibus. Unicam oesophageam aorticam habet DRAKE l. c. 30. & WALTHERVS *nerv. interc.* II. duas tresve rectius HEISTERVS not. 67. LIEVTAUD p. 487. BOYDON II. p. 245. aliquot

HEBEN-

t Vena bronchialis dextra ab azyga. ¹¹⁾

u Aliae duae parvae oesophageae.

x Ramuli arteriae r.

y z Oesophagea major arteria.

I Arteria

HEBENSTREIT, KVL MVS p. 82. Observo id in magna inconstantia, constantius esse, ut duae tresve superiores merae oesophageae sint, & parvae, inferiores duae, tres, vel quatuor longiores & majores, & praeter Oesophagum mediastino, pleurae, pericardio posteriori, pulmonis superficiei, prospiciant. Hujusmodi arteriae ad septimum intervallum, octavum, nonum, decimum oriuntur, tres, vel quatuor, quarum imae & septum attingunt adeuntque, & cum oesophago in abdomen perveniunt, atque ibi phrenicis inferioribus, & coronariis inosculantur.

11.) Non magnam varietatem in hac vena vidi. Oritur longe plerumque ex Vena sine pare paulo prius, quam vertebrae adtingit, in ipso flexu. Dat continuo oesophago vicino, & ad quartam costam cum broncho pulmonem adit.

Vidi duplicem fuisse ex Azyga, ut WINSLOW n. 43. & VERDIER II. p. 370. Vidi duas, unam hoc loco ortam, alteram inter quintam sextamve costam, ex eadem vena, rete fecisse in aorta, & cum bronchiali arteria inferiori pulmonem adiisse.

Habet eam bronchialem, ex azyga ortam RAVIVS apud VALENTINUM p. 106. cui utique primam dextrae bronchialis veram descriptionem debemus, & recte haecenus laudem inventae hujus venae Ravio tribuit BOERHAAVE *Meth. stud. med.* p. 336. Eam originem habet etiam CHESELDEN *Anat. of hum. bod.* edit. VI. p. 193. NICHOLLS l. c. LIEVTAUD p. 504. KVL MVS Tab. p. 86. In *Compend.* etiam *Anat. Russ.* Petrop. impresso T. XVI. f. 2. 6. pingitur. Haec sunt multa illa vasa ab azyga & a Cava ad asperam euntia LANCISII *de vena sine P.* p. 87. 90.

Nullam vero esse venam bronchialem, ut RVYSCHIVS scripsit Epist. VI. & I. W. PAVLI ad I. van HORNE p. 107. neque vidi, neque credo. Neque a subclavia dextra provenisse vidi ut TABARRANVS l. c. & COWPERVS habet ad T. XXIV. BIDLOI f. 1. A cava vero oriri rarum est. Ita vetustiores solent describere, siquidem ea vena est Pneumonica, quam legimus, non longe super septum transversum ex vena Cava ortam, & ab eodem illo inventore

anastomoseos venae sine pare cum emulgente NICOLAO SAMMICHELIO Novocomensi, inventam fuisse apud COSTAEVM & MONGINVM, ab ipso etiam H. FABRICIO ab AQUAPENDENTE demonstratam apud ROLFINKIVM l. c. p. 963. a BARTHOLINO etiam citatam p. 637. & ab ISBRANDO de DIEMERBROECK L. VII. c. 3. MVRALTO p. m. 450. BOVRDON p. 346. & f. 23. ad imaginationem expressam, & KEILIO dictam *abridgm.* p. 351. WILLISIO in *Pharmac. ration.* II. p. 5. DIONISIO, PALFINIO & aliis. Facile vero credo vera vidisse superiores, ut VERDIER II. p. 244. BOVRDON, GORTERVUM *Chirurg. reform.* p. 151. Denique recte ii scripserunt, quos inter est ILL. ARCHIATER ROSEEN, qui dextram bronchialem ex vena sine pari, sinistram ex Cava (nempe intercostali quae in Cavam per subclaviam se exonerat) oriri scripserunt (*Anat. suec.* p. 191.).

12) Oesophageae venae numerosae sunt, perinde uti arteriae. Earum supremas thoracicas, oriuntur a thyreoidea inferiori vena (in icone Art. thor. anter.) a vertebrali sinistra, a mammaria dextra, aut a Cava, continuo ubi pericardio egressa est. Deinde a vena sine pare venae aliquae in dextro latere, ex ipso arcu ortae, continuo Oesophagum adeunt (not. 11.).

A bronchiali sinistra perpetuo aliquae ad oesophagum veniunt. Inferiores vero sub quinta costa, sunt ab Azyga, & ab Hemiazyga, totidem fere numero, quot arteriae intercostales, quibus socie adcedunt. Eae, quas dat Azyga, per mediastinum ad oesophagum, pericardium, pulmonis superficiem, & Aortae tunicas veniunt, in quibus communicant cum Hemiazygae ramis. Quae inferiores, eae etiam majores sunt, tres fere, quarum duae imae in septum transversum veniunt. Quas vero dat Hemiazyga sinistra, eae majores fere sunt, eaeque ad Oesophagum, mediastinum, aortae superficiem eunt, & rete faciunt cum ramis dextris, incerto numero, sed quem non vidi infra quinque esse, inde vario numero ad quatuordecim majusculos ramos in sex inferioribus intervallis costarum adscendisse. Ultima per diaphragma euntes communicant cum Phrenicae inferioris ramo oesophageo, & cum venis Coronariis ad portas pertinentibus.

Caeterum

- 1 Arteria oesophagea.
- 2 Vena Oesophagea alia.¹²⁾
- 3 Tertia.
- 4 Quarta.

Caeterum mediastinas venas aliquas ab azyga jam VESALIUS habet L. III. c. 7. oesophageas vero ab eadem, nescio an ex aliquo antiquiore, sed certe habent ANDREAS LAVRENTIUS p. 126. edit. Paris. & C. BAVHINUS in *theatr.* p. 208. Deinde post lon-

gum intervallum WELSCH *Tab. Anat.* XXXI. RVYSCH *Thes.* VII. n. 23. LIEVTAVD p. 504. BOVRDON, WINSLOW n. 50. An istae fuerint, quas a mediastinis & intercostalibus ad pulmones venire RAVIUS scripsit l. c.



F I G V R A II.

Aorta ad dextrum latus reclinata, ut sinistra vasa melius adpareant.

A B C D E F G H I K L M N O P Q S T V.

T A a b c d h i

m o p p

z

1 2 3 4 ut in priori icone

5 Venae bronchialis rami, qui nervum diaphragmaticum comitantur & ad pericardium dant.

ψ Arteria pulmonalis sinistra.

φ Bronchus finifter.

ε Ramus alter arteriae i ad arcum aortae & pericardium.

ζ Ramus venae bronchialis ad arteriam pulmonalem.

η Ad oesophagum.

6 Vena Bronchialis sinistra.

7. 8. 9 Arteriae bronchialis sinistrae rami ad asperam arteriam & Oesophagum.

10 Arteria Bronchialis sinistra inferior.

11 Vena comes.

13 Oesophagea arteria parva.

14 Alia.

15 Alia.

16 Alia.

17. 18. 19. 20 Venae inferiores mediaestinae a hemiazyga ortae, & ad septum transversum etiam euntes.

FIGURA I.





FIGURA II.



TABULA BRONCHIALIUM
VASORUM.

T A B V L A
ARTERiarVM MESENTERICARVM.

41

L E C T O R I S.

ALBERTUS HALLER.

Poteram forte, nisi plenam dare vellem historiam arteriarum, labore hujus tabulae supersedisse cum plenissimam dederit EVSTACHIVS in duabus figuris, quae sunt II. & IV. T. XXVII. Verum nolui descriptionem absque icone dare, quae fuisset obscurior. Deinde eximius vir EVSTACHIVS vasorum skeleton dedit, a carnibus vicinis & a visceribus undique solutum. Ego vero omnia vasa in naturali nexu pingere malui, neque vasorum mesentericorum hujusmodi figura exstat hactenus. Neque facile est in Eustachii iconibus coli vasa & tenuium distinguere. CASSERII quoque tabulae I. L. V. & VII. Libr. VII. in quibus hujusmodi aliquid molitur vir perindustrius, sunt vitiosissimae. Figura caeterum ex infante sumta est, & picta Novembri M. 1745.

- ABC Mesocolon Medium integrum, sursum reclinatum,
ut ejus radix adpareat. ¹⁾
- A Sedes hepatis respondens &
B Ventriculo &
CD Lieni.
D Pars dextra mesocoli &
E Pars sinistri mesocoli inter lienem renemque, quae
angustissimae. ²⁾
- FF Flexus Iliacus sinister 3 Mesocoli peramplus, mem-
branis inter vasorum truncos maxima ex parte
deletis, ut viscera, quae contegit, possint conspici.
- G Pars ejus, quae ad rectum intestinum descendit.
H Ilei intestini pars.
I Mesenterii finis, qua cum Mesocolo dextro conti-
nuatur.

K K

1) Ut facilius intelligantur vetustiorum scrip-
torum descriptiones, meminisse oportet, ab
ipso primum GALENO mesocolon transversum
omento accenseri, VESALIO vero idem Mesocolon
perpetuo nomine laminae humilioris vel
posterioris Omenti describi (*Tab. Oment. 1. not. k*).
Excusabilem reddit errorem summa ana-
logia Mesocoli & Omenti. Inflatum enim Me-
socolon in similes omnino rosulas turgit, &
appendiculae inprimis, quod jam apud WINS-
LOWVM exstat, flatu recepto turgent Omenti
simillimae. Eo experimento vero constat, O-
menti cavitatem non esse cum Mesocoli cavi-
tate continuam, sed caeco sacco in ea linea ter-
minari, quae in *Tab. 1. Omenti* litera L. notata
est. Deinde Pancreas non contineri cavitatem

Mesocoli, sed utramque laminam Mesocoli
transversi sub Pancreate a peritoneo oriri.
Flatus nempe adactus in cavitatem mesocoli,
eo toto, & continuo Mesenterio repleto, inter
Pancreas & ejus membranam externam non
diffunditur. Monere de hac re visum est, quod
contraria Viri magni docuerint, quae hoc uno
experimento convinci possunt.

2) Ut omnino peritoneum, nihil mutatum,
intestina absque media ulla propagine ample-
ctatur, nuda penitus, qua parte peritoneo re-
spondent. Vasa etiam in ipso intestino hic
repunt, cum nulla adsit longitudo Mesocoli.

3) Ita vocari potest quod S. Romanum ne-
que satis vere, neque erudite Galli vocant.

- K K Mesenterii pars dextra inter vasa maxima parte rescissa, ut subjectorum vasorum viciniae adpareant.
- L L Mesocolon dextrum eadem ratione tractatum.
- M Caecum.
- N Appendicula.
- O Colon dextrum.
- P Transversum.
- Q Sinistrum.
- R Flexus Iliacus sinister Coli.
- S Ren sinister.
- ⊙ Vasa spermatica ejus lateris.
- △ Vasa adiposa ex iisdem.
- R Aortae truncus.
- S Iliaca arteria communis.
- T Externa.
- Φ Ultima cartilago lumborum.
- ψ Pelvis sive os sacrum.
- V Interna iliaca arteria.
- X Vena focia.
- Y Arteria sacra.
- Z Intestini Jejuni pars prima, quae emergit sub mesocolo transverso.
- a Duodeni pars transversa inferior.
- b Renis dextri pars.
- c Pancreatis portio dextra sive caput.
- d Pancreatis pars transversa retro Mesocolon transversum latens.
- e Venae portarum truncus.
- f Vena coronaria sinistra.
- g Vena Mesenterica.

h Ve-

- h Vena Gastro Colica. ⁴⁾
 i Vena Colica dextra.
 k Vena Ileocolica. ⁵⁾
 l Vena Mesenterica in arcum flexa.
 m Rami mesenterici resecti.
 n Haemorrhoidalis interna vena five Colica sinistra.
 o Ramus adscendens.
 p Descendens.
 q Arteria mesenterica superior. ⁶⁾

r Ar-

4) Communis nempe truncus venae Colicae mediae, dextrae, Ileocolicae, Gastroepiploicae dextrae, Pancreaticae.

5) *Caecalis* est RIOLANI *anthropogr.* L. II. p. 113. WINSLOWI, WALTHERI *de ven. Port.* p. VIII, & si recte intelligo, picta a BACCHETTONO T. XIX. ad f. 2. F. inferius.

6) *Arteria Mesenterica superior* a IACOBO SYLVIO nomen accepit, antiquissimae cognitionis. Venae enim, quae a magna ad lactes dividuntur in ANONYMO LAVREMBERGIANO c. 13. sunt haec ipsa Mesenterica. & ARISTOTELIS disertius eam arteriam describit *de part. anim.* L. IV. c. 4. Arteriarum Abdominalium maxima est, Coeliaca notabili descrimine amplior. Unica est perpetuo & aequae diversa a Coeliaca. GALENUS equidem dubitanter ita scripsit, ut possit videri communem utrique truncum esse *de arter. & venar. dissect.* c. IX. & RIOLANVS veterem errorem ita renovavit, ut splenicam quidem ex aorta, coeliacae loco prodeuntem describeret, ramos omnes reliquos, & coeliacae & mesentericae superioris uni trunco adscriberet *Anthrop.* L. II. c. 18. p. 115. & denuo p. 641. 691. &c. *Enchirid. Anatom.* L. II. c. 22. 27. & p. 144. ROLFINKIUS denique; conditor equidem Theatri Anatomici Jenensis, caeterum in librorum lectione diligentior quam in dissectionibus, utrumque errorem recepit & secutus est *dissert. anat.* p. 1149. Neminem tamen valde seduxit utriusque auctoritas, & facile fuit DOMINICO de MARCHETTIS *Compend. Anat.* c. IV. p. 22. evertere RIOLANI descriptionem, & Coeliacae truncum splenica quidem restituta ornare, a mesenterica vero sejungere. Ipse GALENUS, cujus descriptio seduxisse videtur RIOLANVM, eodem fere loco etiam distincto trunco utramque arteriam oriri vidit, & distinxit eas IACOBUS SYLVIVS *Isagog. Anat.* L. II. p. 39. & VESALIUS L. III. c. 13. & COLVMBVS, & reliqui anatomici.

Ergo perpetuo inter appendices septi, sub coeliaca, super venam renalem sinistram, magna arteria ex Aorta provenit, & descendit dextrorsum primo, ut Aorta tota sit dexterior. In principio retro duodeni primam transversam partem & Pancreas descendit (*Tab. Coeliacae II. P. Q.*), deinde vero ante duodeni flexionem transversam secundam (ibid). Ibi eam nunc quidem relinquemus. In eo itinere non est absque ramis, etsi minores sint. Plusculos equidem Pancreati furculos tribuit, quorum aliquis nonnunquam notabili est longitudine, & dextrorsum, atque sinistrorsum per ejus glandulae marginem inferiorem excurrit. Is ramus parvas colicas dare, cum Pancreatico Duodenali vero Coeliaca, & cum Epiploicis, & denique cum splenicis pancreaticis ramis communicare visus est. Dat etiam, prima inter Mesentericas, duodeno sinistro, super Mesocolon transversum.

Deinde Duodeni parti, quam sinisterius sibi accumbentem habet, super Mesocolon, unum, duos, tres ramos dat ex suo sinistro & posteriori margine ortos, inter se parvis arcubus inosculatos. Hos etiam WINSLOWVS vidit n. 202. 203. & LIEVTAUD *Essays anatom.* p. 492. KVLMSVS p. 83. WALTHER *de ven. Portar.* p. 5. & alii nuperiores. Eorum aliquando primus generat ramum a parte superiori Pancreatis descendentem, vel primus sed transversum, retro arteriam Mesentericam transversim euntem, vel etiam alter (ut in *Tabula Coeliacae II.*), aut truncus mesentericae arteriae, aut denique ramus Colicus Medius, arteriam, quae in parte pancreatis ima, dextrorsum adcumbente Arteriae Mesentericae, per superiorem oram Duodeni transversim H secundi, venit, inque duos ramos finditur. Eorum ramus ante Pancreas in arcum flexus inosculatur arteriae Pancreatico Duodenali, (*Coeliac. T. II.*). Alter retro pancreas ad dexteriores & posteriorem partem duodeni repit, &

- r Arteria Colica media.
s Ramus in medium mesocolon transversale.
t Ejus ramus dexter cum Colica dextra concurrens.

u Co-

& contra Duodeni partem descendente adscendit, atque inferitur arteriae Duodenae primae sub ductu bilario. Ita fere perpetuo se habet, conf. ad *tab. Coeliacae primam not. s ad secundam not. d.* Aliquando fabrica magis composita est, ut praeter eas duas, quas dixi, anastomoses, secunda esset alterius rami Duodenalis ex Mesenterica inferius orti, cum coeliacae ramo anastomosis.

Alias ramus a coronaria magna arteria, fere ex origine, descendit, & retro pancreas, deorsum ductus, huic Mesentericae cum Pancreatico Duodenalis arteriae anastomosi inferitur. Alias a Pancreatico Duodenali arteria alius, anterior ramus, ante venam Portarum transversus it, & cum ramo pancreatico arteriae mesentericae inosculatur.

Alias vidi hunc ramum communicantem maiorem fuisse illo, cum quo convenit, Coeliacae ramo, ut Gastroepiploica a Mesenterica potius, quam a Duodenali Coeliacae oriretur. Id etiam WINSLOWO contigit n. 186.

Hos ramos, dictos haecenus, situs ratio hic vetuit pingere. Habentur autem in icone Coeliacae T. II. & not. p. Caeterum Coeliacae aliquas cum Mesentericis Anastomoses EUSTACHIVS expressit T. XXVII. f. 4. & alio modo *ibid.* f. 2. quae tamen cum meis observationibus vix possunt conciliari, nisi forte cum iis compares, rarioribus, in quibus ex Colica media ea arteria Duodenalis prodit, quae cum Pancreatico Duodenali in arcum coit. Post EUSTACHIVM nemo habet aliquid simile, nisi WINSLOWVS n. 197. 201. qui aliquas utriusque arteriae Coeliacae & Mesentericae in duodeno anastomoses esse docet, anteriorem vero & posteriorem arcum non distinguit.

Praeterea supra Mesocolon, imo super Pancreas, & super venam splenicam, prima inter ramos Mesentericae prodit illa a Mesenterica Hepatica dextra, quam septies in triginta experimentis nunc vidi, dudum a variis (art. Coeliac. I. not. o.) & a WILLISIO cum COLLINSIO visa (*System. of anat.* p. 430.) sed omnium primum a GALENO, qui interdum divisam invenit a Mesenterica Coeliacam, & illam inferiorem mesenterium & hepar adiissel. c. Haec ergo Hepatica sursum retro duodenum dextrorsumque migrat, comitemque se, sed posteriorem, addit Choledochi ductui. Ea hepaticas dextras, & cysticas, & duodenam primam solet generare.

7) Dextrum Colon a Mesenterica arteria ra-

mos habere GALENVS iam vidit l. c. & IACOBVS SYLVIVS, & VESALIVS, & qui VESALIVM fere secuti sunt omnes VIDVS & VIDIVS L. III. c. 17. p. 135. VALVERDVVS L. VI. c. 12. PLATERVS p. 117 SPIGELIVS L. VI. c. 4. p. 195. ANDREAS LAVRENTIVS L. IV. c. XI. p. 146 THOMAS BARTHOLINVS Libell. II. c. 5. p. 655. DOMINICVS de MARCHETTIS l. c. p. 19. ISBRAND VAN DIEMERBROECK L. VI. c. 5. 479.

Sed etiam a Coeliaca ramos ad Colon euntes descripsit COLUMBVVS L. VII. p. 185. & habet praeter priores VESALIVS l. c. & VIDVS, VALVERDVVS L. VI. c. 12. p. 283. PLATERVS, C. BAVHINVS, LAVRENTIVS, T. BARTHOLINVS, DOMINICVS de MARCHETTIS p. 19. DIEMERBROECK p. 479. SPIGELIVS p. 193. ROLFINKIVS L. II. c. 25. p. 1155. HEISTERVS *Compend. Anat.* p. 158.

Verum isti quidem rami, nisi sunt aliqui per exigui, quos suo loco dicam, Pancreaticarum furculi, aut omnino imaginaria vasa splenicae adfecta arteriae, quia a splenica vena non raro mesocolicae sinistrae oriuntur (not. b. ad *Tab. Coeliacae* II.) qui sint, ego non video.

Illos a Mesenterica colicos ramos, adeo perpetuos & nobiles, omittere inceperunt priore seculo, quo mos invaluit, & rarius humana corpora, & etiam tunc partes de corpore exactas & solitarias disseccandi. Ergo VERHEYENIVS L. I. Tr. VII. c. 1. p. 370. DIONIS *Cours de Chirurg. Dem.* III. p. 248. RAU apud VALENTINVM in *append. ad Amphith. Zootomic.* p. 104. COWPERVS (in descriptione, cum praeterea in KEILII mensuris de arteria Mesenterica COWPERIANA arte parata, viginti & unus ramus arteriae Mesentericae ex ordine recensentur, nulla Colici mentione facta) & IACOBVS DRAKE, & LAURENTIVS HEISTERVS *Compend. Anatom.* p. 158. & HENRICVS ALBERTVS NICOLAI *diff. de direction. vasor.* n. 17. & FRANCISCVS NICHOLLS in *Compend.* p. 21. & omnes fere alii nuperiores ad WINSLOWVM usque, ita nihil de vasis mesentericis ad colon euntibus scripserunt, ita perpetuo eam arteriam solis tribuerunt tenuibus intestinis, ut ea opinio fere ubique regnaverit in compendiorum scriptoribus.

Donec WINSLOWVS haec vasa ordinate tandem descripsit, & in Anatomen revocavit. Eum, ut fieri solet, recentissimi secuti sunt, GRAMBS *tabul. Angiolog.* V. CHESELDEN *Anatom. of hum. bod.* ed VI. p. 188. BOVDON in PALFYN *Anat. Chirurg.* T. II. P. VII. c. 1. p. 246. KVLIVS

u *Colica dextra* cum priori arcum faciens. ⁸⁾

x *Arteria Ileocolica*. ⁹⁾

y *Arcus*

in *tab. anat.* p. 83. LIEVTAUD p. 491. VERDIER II. p. 355. WALTHERVS *de Ven. Port.* p. VIII. & alii.

Ergo ita se res habere solet. In ipsa duplicatura mesocoli, imo nonnunquam supra priores ramos duodenales (not. *b.*) plerumque tamen infra eos, ut in hac icone, & Coeliac. T. II. Q. 1. oritur ex trunco arteriae Mesentericae, conspicuus ramus, qui nobis *Colica media* vocabitur. *Colique superieure* dicitur WINSLOW n. 204. sed nomen paulum mutavimus, ut a dextra colica, quae perinde superior est, separaretur. Hunc ramum CASSERIVS equidem in Tabulis, quae SPIGELIO sunt adjectae, pinxisse videtur L. V. T. I. y. venamque sociam sub S. sed non intellexit BVCRETIVS, quod ipsi saepiuscule accidit. EVSTACHIVS procul dubio habuit notissimum, ejusque ramos pinxit T. X. f. 2. integros vero, non tamen satis a reliquis ramis intestinalibus separatos, T. XXVII. f. II. IV. in quarum posteriori, arteriam, quam oportet colicam mediam esse, ita humili loco a trunco prodire facit, ut nihil unquam viderim simile COWPERVS in icone T. III. & DRAKIANA T. XX. ubi magnum arcum representat, hanc arteriam depinxit, in descriptione tamen non definivit. D. STVKELEY *of the spleen* T. I. habet aliquid colicae mediae simile inter 2 & 2. EVLERVS eum ramum vocavit, a quo anastomosis cum mesenterica inferiori oritur *diff. de mesenter.* BACCHETTONVS pinxisse videtur arteriam venamque in *Anatome* sua T. XIX.

Plerumque unica est, & uno ramo per medii transversi mesocoli duplicaturam antrorsum emergit, fere e regione ejus partis ventriculi, quae tertia parte longitudinis pyloro est sinisterior. Alias unus quidem truncus est, sed haud magno spatio interposito in duo crura dividitur. Sed etiam quinquies duas reperi Colicas medias, dexteriores & sinisteriores, sibi parallelas, quarum altera sub altera ex trunco proveniret, & semel denique tres vidi.

Quando unica est, ut in hoc cadavere una fuit, finditur prope intestinum Colon in duos ramos, praeter Colicam dextram, de qua not. 8. dicemus. Dexter circumlegit oram coli medii inferioriorem, per partem transversam, dextram, & in flexu hepatico, vel paulo inferius, arcum cum Colica dextra perficit.

Sinister ramus sinistram partem Coli medii sequitur longo, & ad intestina parallelo, arcu, & denique adscendenti ramo Colicae sinistrae, five Mesentericae. ut vulgo vocant, inferioris egregia anastomosi inferitur, quae nisi fallor omnium in corpore humano adulto, longe maxima est.

Hunc arcum habet EVSTACHIVS, neque tamen satis aut longum, aut ab intestinalibus junctum l. c. fig. utraque. Inter recentiores renovavit egregiam anastomosis COWPERVS, & in *append. ad BIDL.* T. III. & in DRAKIANO compendio T. XX. laudabilem iconem dedit. CHESELDENIVS vero malam omnino, qui mesentericae arteriae ramulum aliquem ex ultimis intestinalibus brevissimo arcu cum inferiori mesenterica pinxit junctum. Ed. III. T. XVII. quam iconem ex nuperiori editione rejecit. Idem vitium est iconis BIANCHIANAE *hist. hepat.* T. VIII. f. 1. Melior fere est rudis illa BACCHETTONIANA, pro arteria ut videtur T. XIX. f. 1. pro vena f. 2. Aliam dedit STVKELEY *of the spleen* T. I. ubi duo arcus magni habentur inter inferiorem & ramos duos superioris, sed iste auctor sublesta fidei est. Descriptiones absque iconibus dederunt H. A. NICOLAI p. 71. WINSLOWVS, WALTHERVS l. c. KVLMS p. 83. & alii nuperiores. Si duae porro fuerint Colicae mediae, eae arcu intermedio inter se coeunt, earumque sinisterior magnum arcum facit, dexterior alterum cum dextra Colica.

8) *Colica dextra* est quam WINSLOW n. 205. vocavit *seconde branche principale*, cujusque venam sodalem *Colicam* RIOLANVS *Anthropogr.* L. II. p. 113. *Gastrocolicam* vocat WINSLOWVS. Eandem etiam BACCHETTONVS ad F. superius expressit l. c. f. 2. Haec est, quam GALENVS vidit & vetustiores descripserunt, nam, ad dextram inprimis Coli sedem arterias a Mesenterica venientes describunt. Parum caeterum nota, vel solitaria ex mesenterica prodit, vel ex Colica media, pene ex ipsa origine, vel, quod rarius est, ex Ileocolica. Transversim in duplicatura mesocoli transversi sub hepar ad flexum Coli dextrum accedit, qua transversum mesocolon cum dextro conjungitur. Inde ramis sursum datis cum Colica media inosculatur. Aliis vero deorsum sequentibus longitudinem intestini Coli dextri, ipsi innata intestino, in Ileocolicam inferitur, medio fere inter hepar & valvulam coli spatio. Vidi ex hac arteria Pancreaticam transversalem ortam fuisse, quae cum Pancreatico-duodenali Coelicae ramo inoscultatione coiret.

9.) *Ileo Colicam* arteriam dixi, quam WINSLOWVS vocavit *troisieme branche*. Eo forte referas iconem 2. T. XXVII. EVSTACH, in qua arteriam mesentericam superiorem fissam pingit in duos ramos. Eadem est, cuius comitem venam *Coecalem* dixit A. LAVRENTIVS *hist. anat.* p. 123. RIOLANVS L. II. p. 113. *Enchirid. anat.* p. 113. Apud BACCHETTONVM videtur esse F. inferior T.

- y Arcus quem facit cum colica dextra.
z Ramus *caecalis*.¹⁰⁾
1 Arcus & anastomoses ejus cum mesenterica.
2 Mesentericae arteriae superioris rami ad tenuia intesti-
na.¹¹⁾

3 Ra-

T. XIX. f. 2. & apud STVKELEY l. c. huc pertinet ramus ad *d. d.* Sed & ILL. WALTHERVS habet p. IX. & venam p. VIII. l. c. Perpetuus & fere unicus ramus dexter est arteriae mesentericae, postquam sub mesocolon descendit, origine non valde perpetua, ut tamen uno alterove pollice infra Mesocolon proveniat. In duplicatura mesenterii descendit, ut diagonalem describat quadrilateri, quod a colo, ileo, arteria Mesenterica, & Colica dextra circumscribitur, & recta via ad Caecum descendit. Prius tamen ramosa fit, & ramis aliis secundum Colon adscendens inosculatur Colicae dextrae. Ramus alius sinistrorsum redeuns, legens oram superiorem ilei per pedem vel ultra, inseritur in ultimum truncum Mesentericae arteriae.

10) Truncus nempe lleocolicae ad caecum pergit ire, & emittit primo ex media longitudine lleocolicae, vel paulo ultra posteriorem ramum *appendicalem*, qui ad mesenteriolum vermicularis adpendicis advenit, eius longitudinem sequitur, eique ex ea tota longitudine breves rectosque furculos exhibet. Deinde haud longe ab intestino truncus lleocolicae in duos finditur, quorum anterior per plicam anteriorem ilei & coli, alter per posteriorem a colo cum caeco illo crasso factam descendit extrorsum, idemque radici appendicis prospicit & cum appendicali conjungitur anastomosis. Repeto vero superficie tantum harum plicarum incumbere, neque ita profunde descendere, ut valvulae coli generationem, quae debetur utique his plicis, tribuas istis arteriis. Haec vasa Mesentericae tribuit WINSLOWVS n. 202. sed reddit Caecali n. 206.

11) Mesenterica arteria sub Mesocolo dextrorsum migrat magis magisque, dum in duplicatura mesenterii descendit, ut arcus inde fiat longae curvaturae, dextrorsum cavus. Ex latere dextro, ut egregie monet WINSLOWVS, nulum fere ramum emittit praeter lleocolicam. Hoc magnum vitium est iconum fere omnium, quod perinde ex utraque facie arteriae mesentericae exeant. Ita in VESALII iconibus se habet, & EVSTACHII, & BIANCHI, neque valde probari potest ipsa COWPERI tabula. In LEONCENAE iconne, quae exstat in *Transactionibus Philosophicis* n. 280. arcus iste fere rectus exprimitur, & tres soli rami ex convexa parte pinguntur. Sed etiam CHESELDENVS in edit. VI. arte-

riam ad unam partem flexam expressit T. XXIII.

Ex huius arcus latere sinistro brevissimi primo ramuli exeunt, ad nascens jejunum: inde sensim longiores fiunt in jejunum, etiam WINSLOW observante n. 199. & multiplicantur, quas statim dicam, areae. Ad ultimam fere, in puero, spithamam mesenterii minuuntur iterum longitudines ramorum, donec ultimo brevissimi fiant, & truncus ipse in lleocolicam continuetur, (iconis nostrae 1. 2.). Horum ramorum numerus incertus est. WINSLOWVS sub mesocolo numerat decem vel duodecim. KEILIVS *de secret. anim.* viginti & unum. Sed multum hic omnino ab arbitrio pendet, prouti ultimos ramos illos ilei seorsim aut numerare malis, aut negligere. In tenuibus vero intestinis haec est natura vasorum, ut quaelibet arteria, in ramos duos fissa, his ramis & cum vicinis coeat, & ipsi duo rami inter se in arcum inosculentur. Sed etiam secundo ex convexitate horum arcuum enati rami eodem modo inter se minores, sed copiosiores faciunt anastomoses, idque tertio, deinde ubi longissimi sunt, quarto, quinto denique fit, & reduplicantur arcuum conjunctiones, donec ultimi rami intestino fiant vicini. Inter eos ergo divisos & subdivisos arcus areolae intercipiuntur polygoniae. Hanc fabricam inter veteres solus habet EVSTACHIVS T. XXVII. f. 2. & 4. descripsit vero WINSLOWVS p. 200. 201. & FANTONVS *Diff. Anat. renovat.* V. p. 268. Paucos, tres quatuorve pinxit VERHEYENIVS T. XXXVIII. f. 1. Arcum longum, nimis simplicem, neque naturae similem COWPERVS pinxit l. c. EVLERVS melius & quatuordecim omnino arcus descripsit l. c. p. 245. n. 20. Multiplices arcus etiam expressit in venis CHESELDENVS Ed. VI. T. 24. in arteriis nimis paucos T. XXIII. Ego in hac iconne, cum sceleta haberem vasorum mesentericorum copiosissima, non potui exprimere.

Ex ultimorum arcuum convexitate denique non flexi ultra, sed recti prodeunt furculi, duplici ordine, ut anterior sit ubique ramus & posterior, qui per omnia similes, solo fere situ diversi sint. Ea rectilinea vasa abscissa EVSTACHIVS pingit, longiora CHESELDEN T. XXIII. & XXIV. describit vero WINSLOW IV. n. 229. LIEVTAUD p. 282. EVLER p. 28. alii.

De-

3 Ramus Colicae mediae sinister.

Deinde haec eadem vasa intestina conscendunt in cellulosa prima, quae inter extimam & muscularem est. Dant ibi ramum exiguum arbuscularem ramosum, musculari tunicae RUYSCH. Epist. XI. f. 1. 2. B. ALBIN. l. c. p. 4. & ramos externae RUYSCH. Ep. cit. f. 1. 2. A.

Trunculi vero in nerveam per intervalla fibrarum musculosarum descendunt (RUYSCH. Thes. I. aff. III. n. 14. aff. II. n. XI. Thes. VIII. n. 60.) & in cellulosa secunda rete faciunt, quasi arbuscula foret, quae arbusculae ultimis trunculis in convexitate, quae libra natat intestini, inter binos binosque anteriores, & binos binosque posteriores arcus faciunt, ut ex convexitate anterioris arcus infiniti majores minoresve ramuli in convexitatem arcus posterioris exeant, ALBIN. de vas. intestin. ten. p. 6. & ic. CHESELDEN T. VII. XVIII. STUART de mot. musc. T. II. Haec vasa ita multo majora sunt prius descriptis, ut in nervoso sola tunica, remotis duabus externis, tot fere vasa videas, quam si conjunctas reliquisses. Solet autem ubique iste trunculus incumbere radici valvulae alicujus, inque ea depressione tuto recipi, quod recte observavit vir solertissimus IOHANNES NATHANAEL LIBERKUHNI in diff. inaug. de valvula Coli. Ramuli vero lateres in eadem cellulosa sparsi & repetito subdivisi, cum vicinis suis ejusdem ordinis in rete coeunt, ALBIN. l. c. & in iconibus RUYSCH. Epist. XI. T. XII. f. 3. A cellulosa primus ALBINVS observavit aliqua vascula ad carneam & extimam redire. Rete vero in jejunum plenum & crassiusculis factum est furculis. RUYSCH. Advers. III. T. I. f. 4. 5. in ileo valde subtilibus, areis inter vicinos ramos liberis manentibus ID. ib. f. 6. 7.

Ultimi denique & invisibiles nudo oculo furculi, perforata nervea in cellulosa tertia illa pulcherrima retia faciunt, quae solus LIBERKUHNIUS admirabili industria patefecit, & quae in villorum cellulosa fabrica ponuntur, de vill. intest. fig. 2. & 3.

His, quae perpetua sunt, expositis, rariora aliqua subicere visum est.

Primo quidem in mesenterio & mesocolo quatuor magnae nudaque areae sunt, Mesocoli transversae duae, ad utrumque latus Colicae Mediae, Mesenterii itidem duae, ad utrumque latus Ileocolicae. Per has areas utrobique, non raro, ducuntur rami majusculi rectilinei, qui oppositos arcus connectunt. Vidi etiam arteriam a Colica media prodiisse comitem venae haemorrhoidalis internae, & insertam fuisse primo ramo Colicae sinistrae.

Deinde in mesocolo transversae vasa alia sunt, diversa a Mesentericis, magis rectilinea, & ultimo variis locis cum mesentericis inosculata & omentalibus. Haec vasa in sinistra parte Mesocoli transversae oriuntur a ramis Pancreati-

cistransversalibus, quos Gastro Epiploica dextra (ut in T. Coeliac. II.) & aliquando ipsa mesenterica emittit (not. 6.) alias splenicæ rami, qui ad imum pancreas descendunt. Eadem vasa dixi not. b ad tab. II. Coeliacæ.

In dextra parte ejusdem Mesocoli oriuntur vasa similia a Pancreatico-duodenalibus in radiorum speciem per pancreas flexis. Eadem etiam in peritonaeum excurrunt.

Perpetuae etiam sunt & copiosissimæ anastomoses in toto Colo transversae, & in ea parte dextri coli, quae omentum adnatum habet, inter vascula subtilia Omentalia a Gastroepiploicis orta, & vascula mesenterica superficiem coli pingentia.

Ex spermaticis vero aliisque aorticis arteriis & venis earumque adiposis ramis multiplex est cum vasis intestinalibus communicatio. Primum versus imam partem duodeni dexterimamque, & ad ileon etiam dextrum, & denique ad coli caeco proximam partem plusculi ramuli spermaticarum in Peritonaeum veniunt, & cum ramulis mesentericarum varie communicant. Alii spermaticarum rami etiam adiposi, ad caecum veniunt, & ibi cum ramis arteriae ileocolicae inosculantur. WINSLOWVS similia habet n. 221. & alii citati ad p. 299. Comm. Boerb. V. P. I. & GRAAFIUS de organ. mascul. p. 20. ed. 1705. BOURDON descript. anat. p. 101. qui ad omentum nempe mesocolon ramos dixerunt edere spermaticam, & GARENGEOT splanchnolog. II. p. 3. KIESEWETTER diff. de lithias. sin. ren. inf. n. XI. qui ex WINSLOWO habent alique. Deinde ab intercostali undecima perforato septo transversae ramos ad adipem renalem, proximum colon sinistram, & ligamentum suspensorium lineis venisse, atque cum capsularibus & colicis anastomoses habuisse vidi. Aliam vero capsularem dextram ad peritonaeum duodenale ramulos emisisse, & ibi cum spermaticis eo venientibus atque duodenalibus ramos communicasse vidi. A capsulari vero dextra aliqua ex renali orta, ad duodenum, & angulum Coli dextri cum transversae, ramulos venisse, pariter vidi, similesque ad angulum sinistram Coli a sinistris capsularibus. Porro rami Mesocolicae arteria primi in glandulas lumbales missi, ibi & cum aortae & cum spermaticae furculis in eas glandulas missis varie inosculantur. Denique a vasis colicis sinistris furculi non minimi excurrunt ad peritonaeum vicinum, ibique cum spermaticis & lumbalibus communicant.

Sed nuper, cum avide inquirerem in venas illas RUYSCHIANAS quas senex optimus adeo constanter a Cava vena ad intestina dari repetiit, & BOHLIUS amicus noster olim carissimus se vidisse, confirmavit

- 4 *Colica sinistra* ¹²⁾ arteria five Mesenterica inferior.
- 5 Ramus adscendens.
- 3 6 Ejus conjunctio cum Colica media five *arcus magnus Mesentericus*.

7 Ra.

firmavit (*de via lactea* n. XLVII.) & Cl. KAAU *de perspir.* n. 475. in puella sex vel septem annorum vidi venam lineae fere diametro, ex spermatica dextra ortam, quae duodenum adiit, & anastomoses fecit cum ramis intestinalibus, quales debere adesse sensit WINSLOW n. 154. *tr. des vein.* Etsi nunc vascula ista in statu naturali perminuta sint, neque aliquid notabile officium eae anastomoses habere videantur, videtur tamen RVYSCHIVM, ut magnus erat artifex, ita ceram suam in hujusmodi venas urfisse, ut denique ipsum venae portarum systema per eas repleret. Certe quid aliud viderit nondum inveni. Caeterum curiositate non caret olim ab ARISTOTELE *de part. anim.* L. IV. c. 4. descriptas esse venas a Cava ad mesenterium euntes, a Cava vero ad omentum a GALENO *de uril. part.* L. XVI. c. 14. refutatas a VESALIO p. 616. Adeo non inventa solum et opiniones, sed controversiae vertentibus seculis in orbem redeunt.

Denique quod rarissimum vidi in vasis mesentericis, arteria fuit Omphalo Mesenterica, quam in puero trium fere septimanarum mense decembri 1745 vidi. Erat arteria minime obscura, orta ab aliquo ramorum, qui a Mesenterica adeunt intestina tenuia: ea liberrime cum exigua membranula ad umbilicum descendit, ibi uno ramo urachum adiit versus vesicam, altero cum Epigastricae furculo conjuncto umbilicalem funem, qui resectus erat, adiisse videbatur. Huiusmodi sunt Omphalo Mesenterica vasa brutorum animalium. In homine aliquid simile repertum fuisse nunquam legi.

¹²⁾ *Mesenterica inferior* rara felicitate usa est, ut parco in rebus humanis exemplo a duobus seculis nullam omnino passa sit aut in nomine, aut in descriptione aut mutationem, aut controversiam. Solus SCHELHAMMERVS impositum a IACOBO SYLVIO (*Isag.* p. 39. b.) nomen, quod ubique receptum est, sollicitavit in *progr. valed.* n. 17. & utique speciosis satis rationibus. Nam Mesenterico, quoties a Mesocolo distinguitur, omnino nihil dat. Quare si placuerit LINNAEANAS leges in anatomen transferre, & nomina, quibus aliquis error subsit abrogare, poterit *Colica sinistra* vocari. Pauci Haemorrhoidalem internam vocarunt, ut VERHEYENIVS l.c.p. 371. Perpetua caeterum arteria est, bene nota GALENO l. c. & VESALIO, & recentioribus omnibus, qui quidem pene

omnes VESALIVM hic exscripserunt. RIOLANVS hanc arteriam non conturbatam reliquit. EVSTACHIVS ejus iconem dedit complexam cum superiori. CASSERIVS depinxit L.VI. T.I. quae tamen figura valde vitiosa est, & anastomosis magnam huic arteriae tribuit cum spermaticis, nullo modo excusabilem. Bona vero icon est COWPERI l. c.

Oritur autem perpetuo quidem in anteriori sinisteriori parte aortae, inter renalia vasa & Iliaca, modo propius renes, ut EVSTACHIVS pingere solet, modo Iliacis propius, ut CHESLEDEN T. XXII. l. C. GARENGEOTVS *Splanchnol.* T. ad p. 19. & 75. & frequentius est. A splenica vero arteria ortam esse ex RHODII *mantissa obs. anat.* 49. citat. Cl. SCHMIEDLIN. *de variet. vasor.* Sed ea procul dubio vena fuit.

Haud longe ab origine, sed aliquando etiam post plusculas uncias, ramum edit unum alterumve in glandulas lumbares & peritonaeum, de quibus dixi, eos cum spermaticis communicare. Ad imam vero renis sedem solet prodire, & descendere sinistrorsum.

Postquam descendit ad id fere spatium vel paulo supra, quo aorta finditur, dat ramum *adscendentem* ab EULERO dictum l. c. p. 21. n. 25. a COWPERO in icone distinctum, quem WINSLOW vocavit *branche superieure*.

Is ramus comitem sibi continuo venam offendit haemorrhoidalem internam, hinc adscendit ad sedem mesocoli transversi, deinde finditur. Ramus superior, relegans summam partem sinistri coli et aliquam transversi, in ramum colicum medium redit uno duobusve ramis, facitque arcum jam descriptum Mesentericum (not. 7.), qui huic potius arteriae, quam Colicae mediae debetur, cum omnino major sit.

Ramus alter adscendentis rami sub liene ortus, coli sinistri partem, quae medio fere reni respondet, transversus percurrit, ei dat, & sursum quidem secundum colon, satisque vicinus intestino in priorem redit: deorsum vero cum sequente communicat WINSLOW n. 209. Hunc ramum pro duobus ramis numerat EVLERVS p. 25. n. 21.

Nempe colica sinistra haud longe a priori secundum ramum dat, qui praecipua est arteria flexus sinistri Iliaci Coli. Est ubi duplici trunco provenit: tunc inferior est *seconde branche moyenne* WINSLOW n. 21. Quatuor fere pluresve arcus facit, omnes lon-

- 7 Rami ejusdem ad colon finistrum.
- 8 Colicae sinistrae medius truncus.
- 9 Arcus cum Mesocolicae adscendente ramo.
- 10 Sinistrae truncus inferior five *haemorrhoidalis interna*.
- 11 Arcus ejus cum priori.
- 12 Arcus secundarii five duplices Colicae dextrae.
- 13 Similes in Colica media.
- 14 et in sinistra.
- 15 Ab arcubus secundis rami in intestina rectilinei.
- 16 Epigastricae.
- 17 Vasa spermatica.
- 18 Psoas.

gos & intestino parallelos, ut non male se-
ptem in universum arcus cum EVLERO nume-
res. Haec est *branche moyenne* WINSLOW n.
210. Inde rami illi supra excitati, qui peri-
tonaeum adeunt, & cum lumbalibus, & sper-
maticis communicant.

Truncus denique arteriae sensim dextror-
sum se conflat, EVSTACH. T. 27. f. 2. 4. da-
tisque aliquot imo colo ramis in pelvim de-
scendit, ibi recti intestini faciei posteriori se
adplicat, atque mutata tota fabrica, per ejus
longitudinem decurrit, ut tamen ad sphincte-
rem non perveniat, sed aliquam partem recti
infimam relinquat irrorandam haemorrhoida-
li arteriae mediae (Comm. Boerh. V. P. I.), uti
ultimus sphincter ab externis hypogastrica-
rum arteriarum ramis sanguinem habet.


Anastomoses cum Hypogastricis perpetuas
habet, dictas olim STAHLIO, & confirmatas a
WINSLOW n. 213. Eam conjunctionem nu-
per Cl. SCHMIEDLIN ita depinxit, *de varietat.*
vasor. magn. moment. f. 11. quasi a recto intesti-
no aliqui rami Mesentericae inferioris in vagi-
nam adscenderent, seque ad ejus parris arteri-
as applicarent. Ego vero nunquam hoc mo-
do, semper autem vel venam Haemorrhoida-
lem mediam COMM. BOERH. V. P. I. p. 409. vel
vesicalium & vaginalium varios ramos descen-
dere in rectum, ibique cum vasis a Mesente-
rica conjungi, non valde parvis anastomosis
vidi. Exemplaria siccata ad manus sunt.

Caeterum vasa crassorum intestinorum mul-

tis modis ab illis differunt, quae adeunt te-
nuia. Arcus primo, qui in mesocolo sunt,
pauciores habent, plerumque simplices, rari-
us duplices, ipso jam observante EVSTACHIO
l. c. eosque fere longos, parallelos intestino,
& parum capaces, quod utrumque bene
etiam expressit COWPERVS l. c.

Deinde vasa rectilinea illa, dicta inter tenui-
um intestinorum arterias, profundioribus et-
iam plicis insident. Ramos quidem etiam nu-
merosos habent, sed breviores, ut arbusculae
rectiores sint, & magis parallelae, & ramos ad
minores angulos emittant, & in universum ar-
buscularum vix sint similes. In recto demum
intestino trunci per longitudinem intestini de-
currunt, & utrinque versus anteriorem com-
planatam semicylindrum intestini simplices,
& absque medio arcu ortos furculos inordina-
te emittunt. Ibique magni trunci in postero-
ri illa cellulosa in superficie intestini ponuntur,
eorum vero ramuli in anteriorem partem in-
testini euntes offendunt descendentes a vesica-
libus & uterinis ramos, qui anteriorem & la-
teralem Partem obsident, cumque iis innume-
ris locis inosculantur, ut hic rete potius con-
fusus, quam aliquid arborum simile invenias.
Musculosa crassorum, ut quae crassior sit,
plures etiam ramos arteriosos habet.

Caeterum monendum duxi, arteriae adiposae
sinistrae signum in multis exemplaribus
perversum esse, literam nempe Q. loco literae
A ex errore Chalcographi poni, quem sero
perspectum absente tunc typographo non po-
tui corrigere.



TAB. ARTERIARUM
MESENTERICARUM

T A B V L A 51
ARTERIARVM RENALIVM ET VICINARVM.

L E C T O R I S.

Etsi pulcherrime haec vasa expresserit EVSTA-
CHIVS, non potui tamen, quin adderem nostris
iconibus adeo nobiles arterias. Icon equidem fida,
sculptura minus felix est, & corrupta literis. Dex-
tram capsulam, & ureteres materies ceracea nimis
penetrabilis repleverat, ut crassiores facti sint,
quam oportuerat. Caeterum miraculo simile est, has
visceribus notissimis datas arterias adeo fere ante
WINSLOWVM publice ignoratas fuisse. Picta est
icon Mense Novembri 1746. ex puello unius anni.

ARTERiarvm RENALIVM
ET VICINARVM.

- A Ren dexter.
 B Ren finifter.
 C Capfula dextra.
 D Capfula finiftra.
 E Pars ejus paulum elevata ad confpicienda vafa pofteriora capfulae.
 F Sulcus capfulae major.
 G Idem in dextra capfula.
 H Septi tranfverfi appendices obiter expreffae.
 I Tendineum diaphragmatis centrum.
 K Carnes fepti a coftis ortae.
 L Ligamentum fufpenforium hepatis.
 M Foramen venae Cavae.
 N Et oefophagi.
 O Pfoas finifter.
 P Ureter ejus lateris.
 Q Ureter dexter.
 R Inteftinum rectum obiter expreffum.
 S S Adipis renalis reliquiae.
 T Arteria aorta.
 V Vena Cava ex hepate egreffa.



X Arteria Phrenica hic unica.

Y Ramus dexter.

Z Rami capsulares anteriores.

a Posteriores.

b Ra-

1) Etsi arteriarum Phrenicarum inferiorum principum, aliquam descriptionem dederim ad Tabulam I. Coeliacae, occasione ejus originis, quam haec arteria Phrenicis nonnunquam dare visa est, plenam tamen historiam omnium phrenicarum minime praetermittendam censui, quae defectus iconum farciat. Nunquam enim, nisi infinitas fere facias, picturis vasa omnia exprimentur, & nocent prima sequentibus.

Arteriae Phrenicae aut duae sunt, aut unica. Ex aorta unicam phrenicam prodire WINSLOWUS vidit n. 172. & WALTHERVS *de coeliac.* ex coeliaca vero unicam, ni fallor, Phrenicam HEBENSTREIT *de vasor. confin. sub init.* In viginti cadaveribus & uno quinquies unica origine prodiit, ter nempe ex aorta, continuo super Coeliacae, bis ex hac ipsa arteria.

Verum etiam, quando una est, ut fuit in puero, unde sumta est haec icon, continuo tamen in dextrum & sinistrum truncum finditur, ut parum sit, quod ab ea fabrica differat, in qua duo sunt trunci.

Sedecies ergo duae fuerunt, sexies utramque Coeliaca dedit, bis aorta, bis dextram coeliacam & Aorta sinistram, bis dextram coronaria major sinistram Aorta, bis dextram aorta sinistram coeliacam, semel dextram Renalis, sinistram aorta, semel denique fuerunt quatuor arteriae, quarum duas aorta, duas Phrenica produxit. Aliam observationem hic omitto, in qua cum duabus ex aorta Phrenicis tertia ex Coeliaca adcessit, ea enim minor fuit. Ex istis observationibus adparet veteres auctores non nimis bene pro perpetua lege posuisse, ut duae essent Phrenicae, eaeque ex Aorta prodirent. Ita GALENVS *diff. arter. c. IX.* EVSTACHIUS T. XXV. VESALIUS, VIDVS, IACOBVS SYLVIVS *Isag. Anat. p. 39.* VALVERDVVS L. VI. c. 12. p. 282. PLATERVS p. 117. SPIGELIVS L. VI. c. 4. p. 193. T. BARTHOLINVS p. 655. ROLFINKIVS L. VI. c. 17. p. 1116. DIEMERBROECK L. VI. c. 5. p. 478. KEILIVS *abradgm. p. 342.* & plerique omnino alii scriptores. Rectius ergo recentiores, qui coeliacae hic aliquid tribuerunt, ut alterutra Phrenica ex ea arteria prodiret. Ita BOURDON in T. III. f. 11. primus, deinde inter recentiores

varii. Sed RAVIVS l. c. p. 104. & Cl. NICOLAI l. c. p. 64. & HEISTERVS p. 158. & KVLTVS l. c. p. 83. & GRAMBSIVS l. c. T. V. & HEVCHERVVS *ars magn. anat. p. 61.* & SYLVA *tr. de l'usag. des saign. l. p. 93.* in universum ex coeliaca Phrenicam oriri dixerunt. BOURDONVS dextram ex aorta sinistram ex ortu coeliacae deducit T. cit. Eadem est observatio WALTHERI *de Coeliac.* & pro frequentiori habet CHESELDEN *Anat. of hum. bod. Ed. VI. p. 188.* cum quibus observationibus omnino duae nostrarum consentiunt. COWPERVS vero ad n. 40. Tabul. append. Bidl. III. & DRAKIANAE XX. WINSLOWVS, *tr. des arter. n. 172.* & qui ipsum sequi solent VERDIER II. p. 352. BOUDON in PALFYN. II. p. 246. LIEUTAUD p. 487. contrario modo, dextram ex Coronaria, sinistram ex Aorta frequentius deducunt. Et haec descriptio etiam magis confirmatur a nostris, in quibus, bis a coeliacae trunco, bis ex Coronario ramo prodiit Phrenica dextra, ipsaque situs ratio facit, ut facilius dextra ex Coeliaca prodeat, quae dextrorsum abeat ex Aorta, sinistra ex Aorta. Addit WINSLOWVS, dextram nonnunquam ex lumbali prodire, quod facile credo, etsi non vidi, & Cl. LIEUTAUD utramque saepius ex Coeliaca venire l. c. quod & ipsum meae observationes confirmant, & alia WALTHERI l. c.

Ex hac origine dextra arteria & sinistra hujusmodi fere divisionem habent, quam ad unum quidem corpus infantile descripsi, ut tamen varietates suo loco addiderim.

Arteria Phrenica dextra ex origine sua dat ramum in appendicum septi concursum inferiorem, qui aortae inminet. Eum ramum vidi etiam sinistrae capsulae renali dedisse. Eo etiam loco in pancreas ramulum dedisse vidi, qui cum ramulis Mesentericae concurreret.

Deinde trunco suo adscendit extrorsum, trans oram dextram appendicis dextrae, cui ramulos mittit. Adejusdem appendicis partem dexteriorem truncus Phrenicae edit capsulares, duas tresve, partim anteriores, partim posteriores. Eas etiam WINSLOWVS habet n. 173. Mistas etiam capsularibus edit hepaticas parvas, cum vena Cava ad lobulum Spigelii & partem dextram & posteriorem

b Rami ad septum transversum.

sticam hepatis venientes, & inosculatas hepaticis & capsularibus, una ad hepar venientibus.

Tunc dividitur ad oram capsulae Phrenica. Et Ramus quidem sinister accedit ad venam Cavam, dat appendici aliquot ramos, quorum supremus trans concursum appendicum cum sinistra Phrenica coit arcu facto (Q). Inde attingit phrenicam venam, ostiumque cavae, ibi in thoracem ramum emittit, inosculatum comiti nervi phrenici & Pericardio varie insertum (Tabul. art. anter. pect. not. 7. & ad ima pericardii divisum. Ab eodem trunco dextro ad pericardium rami veniunt pluresculi, perforato septo, ab eadem hujus arteriae sede orti. Hi rami pericardiaci dudum noti fuerunt. Habet enim GALENVS, I. SYLVIVS, VESALIVS, SPIGELIVS (p. 178.) BARTHOLINVS, DIEMERBROECKIVS, & veterum plerique, & aliqui addunt, etiam mediastino furculos mittere; an forte viso trunculo, qui contra nervum phrenicum ascendit Tab. art. ant. thor. not. 7. RUYSCHIUS has arteriolas depinxit EPIST. II. T. II. f. 4. Idem Phrenicae ramus dat ramulum prope Cavam venam, qui hepatis partem convexam postremam adit, atque cum hepaticis & in convexa superficie, & ramis per ductum venosum inmissis multis locis anastomosi coit. An istae hepaticae a phrenicis RUYSCHII Epist. IX. p. 10. Hujus rami, quod superest, ascendit ad dextram partem ostii Cavae, perforat carnes septi, & uno trunco oras in universum legens tendinis, magno arcu, etiam duplici, inosculatur cum sinistrae arteriae trunco interiori ascendente ad sinistra oesophagi ©. Arcus iste ad carnes anteriores septi ramos edit antrorsum euntes, inosculatos mammariis (Art. Pector. p. 29. SYLVA l. c. p. 67. 68. HEBENSTREIT). Alter denique ramus de divisione rami sinistri phrenicae dextrae superstes, cum aliis furculis extrorsum euntibus supra alam in carnes costales exit, uti fere habet COWPERVS T. XXXV. Myolog. ad N. superius. Hujus trunci rami & rami trunculi inferioris inosculantur inter se, iidemque inferuntur mammariis retrorsum euntibus.

Ramus dexter transversaliter fere extrorsum & sub ala dextra excurrit, uti COWPERVS fere habet l. c. dat & ipse capsulares duas, dum praeterlegit oram capsulae renalis, & anteriores & posteriores, tum aliam non parvam, cum ligamento dextro hepatis in superficiem ejus convexam posticam, & terminatur in carnes a costis imis ortas.

Is ramus anastomoses habet cum intercostalibus, dictas ad Tab. Art. pectoris, & lumbalibus, & cum rami sinistri Phrenicae dextrae ramis ad carnes costales euntibus.

Vidi hanc dextram Phrenicam ita magnam fuisse, ut etiam tendini sinistro ramum exhiberet, & solae carnes sinistrae sinistros ramos acciperent. Ita etiam COWPERVM vidisse adparet ex Tab. citata. Vidi minimam, ut ramos ferre Mammaria subpleret.

Phrenica *sinistra* trans appendicem, deinde secundum ejus appendicis sinistram latum ascendens, dat mistam inter aliquot appendici datas arteriolas *oesophageam* (h), quae ad gulae latus sinistram admota ad thoracem ascendit, e regione dextrae arteriae sociae, quae ex Coronaria magna ascendit; utraque vero & cum socia, & cum Oesophageis in oesophago ex Aorta oriundis inosculatur. Habet etiam WALTHERVS de coeliaca.

Eodem loco, mistas appendicalibus etiam dat plures capsulares, ad quatuor usque (g. g.). Dat etiam in ipso tendine numerosos & magnos ramos, qui & in superiori & in inferiori plano septi transversi ad carnes costales medias, quae inter maxime anteriores & maxime posteriores sunt, ramis suis excurrunt, intercostalibus & mammariis inosculatae. Tunc finditur ut dextra, vel ad mediam partem ostii oesophagi, vel ad supremam, in ipso tendine. Et ramus *sinister*, sive truncus, per tendinem vel anteriorem tendinis oram extrorsum & in carnes costales imas septi terminatur, inosculatus intercostalium & lumbalibus, ramis aliis retrorsum, aliis sinistrorsum datis. Cum ligamento sinistro ramos non obscuros ad hepatis lobum sinistram extremum mittit, idemque cum ligamento sinistro lienis minimos emittit furculos, quibus alii a lumbali prima accedunt. An huc pertinentes venae fecerunt communicationem vasis brevis cum Phrenica, adeoque cum cava, quam sibi tribuit HABICOTVS Die I. Lect. II.

Dexter ramus Phrenicae sinistrae facit anastomosi parvam super appendicem (Q) cum dextra Phrenica. Eademque anastomosi magnam etiam duplicem efficit perforato septo, in plano superiori, quae circum legit partem mediam anteriorem tendinis (©) & definit ramis in carnes anteriores septi datis, atque cum mammariis varie conjunctis. Eorum ramorum interiores pericardio imo, quod cordi subjicitur, furculos exhibent. Praeterea pluresculi rami ad Pericardium imum, plano inferiori cordis respondens, passim circa sinistra oesophagi ex dextro ramo Sinistrae arteriae veniunt, perforato septo. Alii ramuli ex hoc magno arcu orti exeunt ad ligamentum suspensorium, inosculati prius dictis a Mammariis (not. 13. Tab. art. Pect. I. (l. l.)). Hae sunt arteriae a phrenicis ad suspen-

c Ra-

- c Rami a mammariis per diaphragma paulum conspicui. 2.)
- d Ramus appendicalis dexter.
- e Phrenicae, utriusque anastomosis.
- f Ramus Phrenicae sinister.
- gg Capsulares anteriores a phrenica.
- h Oesophagea.
- ii Rami ad tendinem utrumque.
- kk Ad appendicem.
- r Rami perforantes diaphragma, ut ad thoracem adscendant.

⊙ Ana-

susensorium ligamentum RUYSCH *Epist. V. T. 5. f. 5. Ep. IX. p. 10. HEBENSTREITII de artt. confin.* Hujus rami fuit propago, quam vidi sub octava costa, supra septum, exiisse ex septo, anastomoses fecisse cum intercostali septimo, octavo, & nono & in transversalem migrasse, ibique rete fecisse cum intercostalibus imis, ad musculos abdominis exeuntibus.

Arteriae Phrenicae ab Aorta aliae. Ab Aortae trunco ramus visus est ad concursum appendicum ex Aorta venisse, quem in nostra descriptione dextra Phrenica dedit.

Deinde dum aorta inter appendices descendit, plerumque unam vel duas utrinque dat arterias, quae partim ad capsulae faciem posteriorem, & retro capsulam in adipem renalem exeunt, partim in appendicibus manent. Quando majores sunt, ut nonnunquam fit, in sinistro maxime latere, vidi exiisse in tendineam alam septi finistram. Confer. not. 4. Has credo esse, quas adiposas vocat WINSLOW n. 174. Vidi similes ex coeliaca prodiisse.

Sed ab intercostalibus ad septum transversum plurimi rami exeunt, in superficiem superiorem posteriorem non tamen valde magni, & ab VIII. IX. X. & XI. intercostali oriuntur, dum trunci harum arteriarum retro septum transversum ad musculos exeunt. Habet ab intercostalibus imis phrenicas RUYSCHIIUS *Ep. IX. p. 11. WINSLOW. n. 175. HEBENSTREIT de art. confin.* Tum Lumbalis prima, vel ultima intercostalis, magno trunco diaphragmatis carnem posteriorem adit, quae eadem cum undecima in adscendente obliquo anastomoses habuit. Vidi alias ad appendices dedisse, ramumque inter eas appendices in adipem renalem misisse. Inde vero, ex convexitate septi transversi, ramos misisse ad pericardium minime contra RUYSCHIIUM negabo l. c. etsi non viderim. A lumbari ortas Diaphragmaticas tangit WINSLOW n. 225. & LIEUTAUD p. 487. & a lumbalibus insignia vasa ad diaphragma euntia vidit DRELINCOURTIS apud BLASIIUM *anat. anim. p. 113.*

A lumbali secunda ad idem diaphragma ejusque carnes postremas dexteris & sinistras sub alis tendineis rami bene multi exeunt intimi ad appendices, exteriores ad carnes proximatas. Omnes autem, & ab XI. intercostali & a I. & a secunda lumborum ortae, anastomoses habent cum ramis phrenicae utriusvis, ex transverso trunco retrorsum euntibus.

A lumbali tertia, dum tecta appendicibus extrorsum abit, furculi unus pluresve in appendicis carnes adscendunt.

Sed etiam ex renali sinistra ejusque aliquo capsulari ramo, vidi furculos non minimos ad diaphragma in sede arcus, quem trans Psoam facit, & in appendicem venisse, & inosculatos esse, tum dextrorsum cum phrenica sinistra, tum sinistrorsum cum lumbali. Aliquid hujusmodi habet. SYLVA l. c. p. 93. & WINSLOW n. 217. & olim in venis EUSTACHIUS l. c. p. 131.

Porro ex Coronaria majori ventriculi semper equidem furculi aliqui per ligamentum finistrum hepar adeunt. Tetigit WINSLOW n. 181. Adeo autem grandem ramum ea via ivisse, ut non alia esset Phrenica sinistra, rarum est. Vidi tamen *Tab. Coel. I. not. g.*

Denique a lienalibus arterias septi ortas dixit RUYSCHIIUS *Epist. IX. p. 11.* quae cum ligamento lienis adeunt rami finistri furculos, & cum ipsis inosculantur, uti vicissim, & in hoc cadavere, a Phrenicis in ligamentum lienis furculi iverunt.

Ergo in universum facies convexa septi ramos habet a mammariis, intercostalibus inferioribus multis (conf. *Tab. bronchial. not. 10. ad fin.*) ad undecimam usque, & phrenicis denique atque lumbalibus, perforantes.

Inferior superficies a Phrenicis, lumbalibus, maxime vero secunda & tertia, aortae ramis minoribus.

2) De art. pector. anter. not. 11. & 13.

⊙ Anastomosis five arcus vasorum dextrorum & sinistrorum in tendine.

I Rami ad ligamentum suspensorium.

A Vena Phrenica dextra. 3)

≡ Sinistra

3) In venis *Phrenicis* brevis ero. Vulgo notas ex Cava vena satis constanter video prodire, ut exiguae sint, quas mihi contigit vidisse, varietates. Nempe venam Phrenicam, unam duasve, vidi supra septum fuisse ortas, quod etiam vidit CL. NICOLAI l. c. p. 64. Vidi quatuor fuisse, duas supra septum, duas infra.

Vidi phrenicam, neque hoc rarum est, venam alterutram hepaticae alicui venae potius, quam cavae trunco insertam fuisse.

Decursus cum ramis arteriarum in universum convenit, ut tamen fatear, nunquam eadem sedulitate me esse persecutum. Perinde etiam Oesophageam dat sinistra Phrenica, quae in thoracem adscendens inosculatur ramis ab azyga profectis (disp. de art. ad ven. oesophag. not. aa.)

Veteres caeterum hujus venae historiam, ut fere solebant, melius & diligentius quam arteriarum sociarum excoluerunt. Duas quidem & ex Cava, infra septum oriundas, magno consensu fecerunt GALENVS de diff. venar. c. 2. AVICENNA, ut vocant, p. 246. IAC. SYLVIVS l. c. p. 34. VESALIUS L. III. p. 460. VALVERDVVS L. VI. 7. p. 268. EVSTACHIVS, GOLVMBVS p. 197. SPIGELIVS L. V. c. 4. p. 196. C. BAVHINVS L. II. c. 18. p. 205. RIOLANVS L. III. c. 8. p. 220. DIEMERBROECKIVS L. VII. c. 3. p. 493. LEONCENA in *Phil. Trans.* 280. qui non ex eadem altitudine ortas pinxit, BOURDON T. III. f. 11. (parum bene) VERHEYEN L. I. Tr. VII. c. 2. p. 377. & fere omnes alii.

Sed ramos a primis anatomes incunabulis satis recte descripserunt, etiam subtiliores. Ad pericardium enim & mediastinum ramulos dare omnis scripsit antiquitas, GALENVS ipse & AVICENNA, & SYLVIVS, & VESALIUS, *Exam. observ. fallop.* p. 282. & EVSTACHIVS de ven. fin. par. p. 281. & C. BAVHINVS, & RIOLANVS & DIEMERBROECK, L. VI. c. 5. p. 478. & reliqui fere ejus aevi omnes. Addidit, quem supra excitavi, FALLOPIVS, has venas perforato septo a Phrenica ad pericardium & mediastinum datas, anastomoses facere cum Mediastinis a Mammaria ortas *Obs. Anat.* p. 117. & procul dubio ex eo habet C. BAVHINVS. Confer. *Arter. ant. pect.* Inter nuperos venas pericardiacas a phrenicis habet etiam WINSLOW n. 144.

Sed multo etiam subtiliora viderunt aliqui peritiorum, Venas enim per ligamentum finistrum erepentes, ex vena portarum ortas, &

ad septum euntes, & aliis venis extra hepar a Vena portarum ortis mistas, atque aliquas lienem per ejus ligamentum Phrenicum adeuntes, descripsit FALLOPIVS p. 117. a. b. & ex eo C. BAVHINVS p. 50. EVSTACHIVS vero p. 133. ab hepate & venae portarum ramis aliquas ad septum venire observavit. Venas etiam hepaticas, quae phrenicis contiguae sunt, in azygam tendere, ex simili observatione HEBENSTREITIVS scripsit de ven. communic. quarum venarum comites arterias, a phrenica sinistra per ligamentum finistrum hepar adeuntes superius descripsi. Ita porro phrenicam venam cum vase brevi conjungi scribit C. BAVHINVS l. c. p. 52. & adiposam cum Phrenica IDEM p. 205.

Sed aliae venae Phrenicae arteriarum fimiles sunt. Ab azyga nempe in dextro latere ad undecimam & duodecimam costam, magni rami prodeunt, qui ad mediam partem septi descendunt, anastomosis inter se factis. In sinistro latere Phrenicae aliquae venae ex rete veniunt, quod in aorta facit hemiazyga. Venas ab azyga in septum habet LIEVTAUD p. 513. & Phrenicam ab azyga prodiisse vidit WINSLOW n. 53. Similes etiam arteriosis ramos lumbales venae septo praestant.

Deinde ab inferioribus venis capsularibus, quas vel cava vena generat, vel sinistra renalis, rami ad septum adscendunt. Has EVSTACHIVS descripsit de ven. p. 66. & 131. & illarum aliquid analogum, quando p. 61. venam sub capsulari dextra oriri scribit, quae septum adeat transversum. Sinistrae renali tribuit phrenicam LIEVTAUD p. 514.

4) Capsulares arteriae vel atrabiliariae nonnullorum paucis notae fuerunt veterum, EVSTACHIO fere, & inter posteriores SPIGELIO. VESALIUS, & qui ex eo fonte hauserunt, eas arterias ignorarunt, ut VALVERDVVS, PLATERVS, RIOLANVS, DIEMERBROECKIVS, & COWPERVS in celebrata illa apud minus anatomicos tabula, & H. A. NICOLAI, & de industria arterias aliquas hujusmodi adesse negavit IOHANNES VAN HORNE *microcosm.* p. 119. edit PAVLINAE.

Esti multum in his, non maximis vasis, sit varietatis, in eo tamen convenire videntur, quod capsulares arteriae sint trium generum, supremae, mediae, infimae: ex quibus omnibus classibus in eodem cadavere simul adsunt perpetuo aliquae, numero unice & situ diversae. Unde nullam descriptionem valde probare possum, cum

- = Sinistra.
 m Arteria coeliaca.
 n Mesenterica superior.
 o Appendicalis ex aorta dextra.

p Si-

cum arterias capsulares & ab aorta, & a phrenicis, & a renalibus optimi nonnulli scriptores utique habeant, sed quasi aliae aliis substituerentur, aut varietates essent, quarum una reliquas excluderet. In omnibus porro his classibus aliquae anteriores sunt, & in sola plerumque capsula terminantur, aliae posteriores, quae praeterea ex capsula in adipem renalem, superiorem & medium exeunt. Hujusmodi arterias fuisse credo, quas perforare capsulas multis locis scripsit EVSTACHIVS.

Arteriae capsulares supremae a Phrenicis sunt, in dextro & sinistro latere, tum a trunco, tum a divisionis ramo transversali ortae not. 1. & nunquam, quantum video unica, sed duae in *it. a. a. g. g.* & tres, & quatuor, & plures adfunt, quarum aliquae in capsularum superficie manent, aliae, uti modo dixi, in adipem exeunt ib. E. vel etiam ex uno trunco, & superficialis & profundus sive posterior ramus prodit. Hae imprimis adipi supremi renis, posterius posito, prospiciunt. Has, a phrenica ortas, capsulares habet WINSLOW des arter. n. 173. Unicam RVYSCHIVS *Thes. Anat.* VII. n. 8. Saepe vero a Phrenicis ait oriri capsulares LIEVTAUD p. 492.

Arteriae capsulares mediae (p. r. s.) ab aorta proveniunt, inter phrenicas & renales, nonnunquam etiam sub renalibus, una, duaeve ab utroque latere. Ex aorta provenire cum aliis varietatibus recenset VERHEYENIVS p. 372. & T. XII. f. 1. sinistram ab aorta ortam facit: sic omnino GARENGEOTVS *splanchnolog.* Tom. II. Tab. ad p. 79. & ad p. 19. ibid. & VERDIER II. p. 354. Duas ex aorta MORGAGNVS vidit *Epist. Anat.* XX. n. 5. Dixit etiam WINSLOW n. 218. pro varietate, & LIEVTAUD eodem modo, & BOVRDON apud PALFYN *Anat. Chir.* II. p. 247. Hae sunt forte adiposae, quae dederunt musculis inferioribus septi HEBENSTREIT *de art. confin.* Harum anteriores aliquae sunt, quales dixi, posteriores frequentiores alias praeter capsulas adipi, alias etiam appendicibus septi ramos exhibent. Ab istis arteriis spermaticae arteriae nonnunquam oriuntur.

Sed nec rarum est, quando ex Coeliaca proveniunt *T. art. Coeliac.* 1. vel dextra, vel sinistra, vel utraque. Hujusmodi arterias etiam MORGAGNO videre contigit l. c. & WINSLOW n. 118. & D. LIEVTAUD l. c. & PETSCHKE *diff. cit.* n. 49. Ab istarum mediarum dexterioribus ramulos ad duodenum & angulum dextri coli cum transverso venisse vidi, & ad hepatis partem proximam cavae venae, inosculatas hepa-

ticus. Sinistra vero in mesocolon, ubi sinistrum cum transverso coit, & in mesocolon etiam transversum furculos dedit, & frequentius in lienis superficiem.

Tertium genus est *insimarum*, quas renales producant, duas, tres, incerto numero, & pariter alias in capsula manentes, alias ad adipem renalem excursuras, circa superiorem, mediam, & inferiorem partem, anteriorem, & posteriorem. Ex istis circa venam cavam in lobulum hepatis & partem proximam posticam dextram ramos ivisse vidi, & cum hepaticis tum a coeliaca tum a phrenicis ortis convenisse. Alias ex capsulari a renali dextra orta ad superficiem lobi dextri hepatis superficiei, praelongum ramum vidi ivisse. Vidi etiam ad diaphragma venisse, & dedisse furculos phrenicis vulgo notis insertos; ut SYLVA l. c. p. 93. & alii, & lumbalibus. Eaedem etiam capsulares a renalibus ortae ad mesocolon duodenum continens furculos dant, qui & spermaticis, & duodenalibus vasis inosculatur. Ad adipem porro, quos mittunt rami, cum spermaticarum ramo adiposo, cum ileocolica in caeco, cum spermaticarum furculis ab ovario ad peritoneum adscendentibus, cum ramis lumbalium ad peritoneum, aliisque ad renis adipem datis, varie communicant. Denique & ipsae spermaticas non rarissime generant.

Capsulares utrinque ex renalibus ortas pinxit EVSTACHIVS T. II. f. 1. & CASSERIVS L. VIII. T. 13. f. 1. in corrupta icona, cum dextrae nescio quomodo quatuor tribuat radices. A renalibus etiam deducit utrinque D. de MARCHETT. p. 32. & RAUVIUS p. 104. solasque admittit MOLINETTVS p. 302. & pro frequente fabrica describit KVLTVS p. 83. & pro frequentiori LIEVTAUD p. 321. WINSLOW. n. 218. VERDIER l. c. IOHANNES VESLINGIVS ex renali utrinque depinxit ortas T. ad c. V. f. 2. T. ad c. VI. f. 1. T. ad c. VII. f. 2. & BOVRDON T. cit. Dextram a renali ortam pingit VERHEYENIVS T. XII. f. 1. & GARENGEOT *splanchnol.* T. II. p. 97.

Rariores sunt, quae ex lumbalibus, & prima imprimis, ad capsulam & adipem visae sunt venire. Hujusmodi originem VERHEYENIVS etiam vidit ex p. 371. & BOVRDON ap. PALFYN l. c. Aliquando a coronaria dextra ramus exit, qui & septo det tranverso & capsulis.

Quotquot sunt, solent inter se variis anastomosibus coalescere, ut in unum ibi convenient rami phrenicarum, coeliacae & renalium vatorum. Omnes extus capsulae innatant, ne-
 P que

- p Sinistra capsularis posterior prima. 4.)
 q Appendicalis ex aorta.
 z Capsularis posterior dextra.
 r Sinistra Capsularis posterior altera ex aorta.
 s Capsularis sinistra anterior.
 t Renalis sinistra arteria. 5.)

u Ra-

que ut venae magnis truncis per ejus ventriculum decurrunt.

4.) *Venae comites capsularum arteriarum*, quantum ego novi, paucissimis varietatibus obnoxiae sunt. Constanter enim fere vidi, dextram a Cava provenisse, omnium primam inter ramos sub hepate ortos. Ita primus definivit, si attentius eum legeris GALENVS l. c. c. 8. & pingit in iconibus EVSTACHIVS T. I. f. 1. 2. T. II. f. 3. T. XII. f. 1. p. 61. Ita in icone habet IOH. VESLINGIVS T. ad c. V. f. 2. ad c. VII. f. 2. & de industria contra RIOLANVM D. de MARCHETTIS p. 532. deinde pro lege referunt HABICOT. Die II. Lect. IV. p. m. 58. & MOLINETTVS *disquis. anat. pathol.* p. 302. & COWPER ad BIDLOO T. XLII. TYSON *Phil. Trans.* n. 142. LIEVTAUD p. 113. KRUGER *Anat. Theodidact.* p. 12. MORGAGNVS *Epist.* XX. n. 5. LIEVTAUD p. 325. BASS. *observ. Anat. Chir.* p. 59. in observatione vero RHODIVS *Mantiss. Anat.* n. 34. & inter nuperos DOUGLAS *Phil. trans.* 308. VESALIUS, cui haec vena, propter ramos ad adipem renalem euntes, ignorata tunc capsula renali *adiposa* vocatur, has origines convertit, ut dextram a Renali, sinistram a Cava deduceret, cum manifesto, eadem ratio, quae feminalem venam sinistram ad emulgentem ducit, etiam capsularem eo jubeat redire, ne nempe minutior vena trans Aortam feratur, cum manifesto metu compressionis. Eum magnum virum totum seculum secutum est. Locus VESALII est L. III. p. 474. SYLVII *Isagog.* p. 36. PAREI *Admin. Anat.* II. c. 25. VALVERDI L. VI. c. 9. p. 274. 275. VIDI L. III. c. 12. p. 123. PLATERI p. 109. SPIGELII L. V. c. 8. p. 172. (qui capsulae eam venam primus post EVSTACHIVM adsignat) C. BAVHINI p. 84. (qui capsulae pariter dare vidit) RIOLANI L. II. c. 24. p. 141. T. BARTHOLINI p. 184. ROLFINKII L. V. c. 27. p. 936. ISBR. & DIEMERBROECK L. VII. c. 6. p. 493. VESALIUS tamen & SPIGELIVS, & PLATERVS conversam hujus sententiae admittunt, in nonnullis casibus, ut sinistra ex renali, dextra ex cava esset: Excusationem aliam mea experimenta adferunt, cum semel a renali dextram unice ortam, quod saepiuscule ait se vidisse EVSTACHIVS p. 61. & semel & a cava & a renali totidem venas capsulares prodiisse viderim uti T.

2. f. 1. EVSTACHIVS pinxit, ubi duas capsulares dextras a renali, a Cava unam exhibet, in 2 vero figura unam a Cava habet, qualem VESLINGIVS dedit T. ad c. VI. L. 1. & CASSE- RIVS L. VIII. T. XIII. f. 1. & in sermone LAV- RENTIVS L. IV. p. 124. & DIONIS p. 238. & GARENGETVS p. 19. & WINSLOW n. 152. qui a renalibus etiam dextram adiposam deriva- runt. Posteriores vero a cava ad capsulam & adipem etiam distinctam fuisse vidi, uti duas ex Cava capsulares EVSTACHIVS deducit l. c.

Sinistra vena Capsularis constantissime a renali sui lateris oritur, neque exceptionem vidi, & paucas in libris legi. Vide icones EVSTACHII T. I. f. 1. 2. T. II. f. 1. 2. 3. T. III. f. 2. 3. SPI- GELII L. VIII. T. X. f. 1. T. XI. T. XII. T. XIII. f. 1. de m. c. 16. p. 66. & LEONCENAE figuram & aliorum. Dudum etiam hanc originem pro lege posuit GALENVS, & D. de MARCHET- TIS, MOLINETTVS, COWPERVS, MOR- GAGNVS, & alii supra citati. Sinistram equi- dem ex Cava oriri MORGAGNVS vidit l. c. sed in monstroso pene corpore. Ego ab ea capsu- lari sinistram phrenicam ortam fuisse bis vidi, & in una observatione trunculus iste a Cava, in altera ab Emulgente ortus est. Vasa a succen- turiatis ad septum transversum habet RAU l. c. p. 107. & EVSTACHIVS p. 86. & T. I. f. 1. T. II. f. 1. 2. & phrenicam sinistram cum capsulari u- no trunco oriri pro perpetuo descripsit LIEV- TAVD p. 325. Caeterum haec Vena sulcum lon- gitudinalem sinumque capsulae ingreditur, & per ejus longitudinem nuda decurrit praecipuo trunco, nudosque per eam cavitatem ramos edit. Poros vero habere visibiles cerae refu- tat injectio, quae nihil in caveam capsulae di- mittit, nisi rupta sit urgendo. Conf. COMM. BOERH. T. III. p. 250.

5.) In arteriis renalibus notum est, valde na- turam ludere, etiam magis, quam in venis: non tamen unquam perinde raras fabricas repe- ri, ac EVSTACHIVS habet, qui ex Iliaca prode- untem pinxit T. III. f. 3. f. 2. 3. aut STAEHELIVS noster, qui ex hypogastrica in specimine *Anat. Bot.* a. 1724. edito, si exceperis monstro- sum & unicum renem, quem in *fetus bicipitis* historia descripsi. In numero utique ludunt. Naturaliter utraque unica est, eaque non ad rectum



- u Ramus adiposus ex trunco.
- w Arteria renalis dextra. 6.)
- φ Arteria capsularis dextra anterior ex renali.
- ψ Vena comes.
- xx Arteriae ad glandulas lumbales. 7.)
- y Arteria adiposa dextra ex renali. 8.)

z Ar-

rectum angulum, ut vulgo scribitur, sed ad fati insignem, semirecto tamen minorem, descendit ex Aorta continuo sub Mesenterica; Ita etiam MORGAGNVS confirmat *Epist. Anat.* l. n. 7. & in iconibus expresserunt EVSTACHIVS fere ubique, GARENGEOTVS & alii.

Ramis suis sinistra, ut posterior orta sit, ante venam prope insertionem se conflectit (t) quod etiam WINSLOWVS observat. Duas vero fuisse nunc omnino septies in commentariis meis reperio, etsi saepius me vidisse facile persuadeat, sed neglexisse nimis frequentem varietatem: tunc vero ex superiori capsularis, ex inferiori nonnunquam spermatica prodit.

Duas etiam ex aorta VESLINGIVS pinxit T. c. V. f. 1. & se vidisse refert VERHYEN p. 102. & alii.

Duas, sed unam ex Iliaca EVSTACHIVS delineat T. III. f. 2.

Tres bis reperi, & tres etiam EVSTACHIVS, habet T. 3. f. 3. ut ima ex Iliaca sit. Tres, quarum una a divisione trunci, BARTHOLINVS vidit *Cent. I. hist.* 38. & tres etiam MOEBIVS observ. 7.

Quatuor sinistras PAREVS (cum dextris tribus), quarum ima ab Iliaca, describit *Admin. Anat.* II. c. 25. & quatuor etiam emulgentes sinistras MOEBIVS l. c. & VESLINGIVS apud BLAS. in ed. *Syntagm.* p. 75. in not.

9.) In dextra renali arteria fere similia observo: & ipsa naturaliter descendit, & longior sinistra, (WINSLOW n. 214.) & unica. Observationes autem meae, in qua duas reperi, nonnisi quatuor nunc reperio, fere proxime ortas, semel tamen alteram in Mesocoliae vicinia natam.

Duas ex Aorta ortas habet SPIGELIVS L. VIII. T. X. & VESLINGIVS T. ad c. V. f. 2. ad c. VII. f. 2. & SAL. ALBERTI post orationes p. 162.

Duas, sed alteram ex Iliaca EVSTACHIVS T. 3. f. 1. Tres ex Aorta omnes EVSTACHIVS T. 3. f. 2. Tres etiam vidit PAREVS *Admin.* II. c. 25.

Quinque omnino, quarum quarta ex Iliaca sinistra quinta ex hypogastrica dextra prodiit EVSTACH. T. 3. f. 3. Geminatas arterias renum vidit FALLOPIVS *observ. anat.* p. 179. b. 180. & HARDERVS in *apiar.* p. 296. & RVYSCH. *Thef.* V. n. 47. BEHRENS *Act. Urat.* 1732. M. Jan. LIEVTAUD p. 492. & alii. Tres quatuorve dixit renales PICCOLHOMINEVS p. 142. Tres apud FALCOBVRGIUM BLASIVS vidit

l. c. Quatuor etiam emulgentes arterias ETTMULLER ad *diff. inaug. Schusteri*, & Cl. WEISS de *art. visc. propr.* p. 16. Rationem vero duplicium arteriarum mechanicam, quam adfert Cl. HUNAULD *Comm. Reg.* p. 382. 383. facile refutant experimenta. Duas enim tunc dicit adesse, quando in fetu una adfuit bifida, sed valde brevis, & rami ita increverunt, ut truncus quasi in punctum abiret. Subtiliter, sed an explicat eo modo arterias renales ab hypogastricis ortas. An & eae communi trunco cum renali in primordiis prodierunt?

Rami arteriarum Renalium sunt capsulares not. 4. adiposae not. 7. spermaticae nonnunquam not. 8. uretericae supremae not. 10. Caeterum satis notum est, arterias ad sinum renalem plerumque accedere, ut tamen ramus, aut truncus aliquis, non raro extra sinum inferatur, in ramos vero findi majores duos, tres, prius quam subeant renem, in rene denique dividi in brachiatos ramos, qui inter tubulos pelvis exeuntes, divisi, vicinis ramis vel omnino arcus perficiunt, vel certe satis prope ad se invicem accedunt, ut circumscribant papillarum tabulosam substantiam, & separent a corticali.

Arcus notissimum est vulgo describi & pingi ab EVSTACHIO *Tab. V. VIEVSSENIO nov. vasor. syst.* p. 161. Sed de venis qui concedit, negat de arteriis NICHOLSIVS *Praelect. Anat.* XVI.

Utrique verum viderunt, nam in eodem rene & desunt arcus & adsunt. Ex eo arcu alii rami a convexitate exeunt in corticem, quem vocant, renis WINSLOW. n. 216. alii ex concavitate descendunt in papilarem substantiam.

Addo ramos istos, qui inter papillas exeunt, non raro directe ex renis corpore educi, & perforare ejus superficiem, atque exire in adiposam substantiam, quod saepe vidi.

7.) Arteriolae minores ex Aorta inter septum transversum & Iliacas plusculae proveniunt, incerto equidem numero, *Comm. BOERH.* III. p. 31. Prima aliquando sub phrenica ad ganglion semilunare venit. Sub rene vero non paucae in glandulas lumbales exeunt, ibique & cum spermaticis, & cum ramis Mesocolicarum anastomoses habent. De uretericis suo loco dicam.

8.) Adiposae arteriae, quae renes involventem pinguedinem adeunt, multorum generum sunt



- 2 Arteria spermatica dextra. 9.)
- 1 Adiposa inde orta.
- 2 Ureterica superior ex aorta. 10.)
- 3 Ramus adiposus inferior major.
- 4 Ramus ad testem euns.

5 Sper-

sunt. In superiores, medias, inferiores eas nunc dividere visum est, quarum superiores & inferiores praeterea posteriori etiam renum adipi rami dant, mediae fere anteriori.

Superiores oriuntur a capsularibus omnibus superioribus not. 3. phrenicis nempe, aorticis, & a renalibus ortis, quarum, quae posteriorem adeunt capsulae superficiem, plerumque ad adipem exeunt, secundum marginem exteriorem Capsulae, earumque aliquae cum exteriori renis ora longe in adipe descendunt (E. u. 9.)

Alii ramuli a lumbalibus primis prodeunt ad summum renem, cum capsularibus, & spermaticis anastomoses facientes.

Sed etiam ab undecima intercostali vidi ramum majusculum ex septo transverso venisse in angulum, quem lien cum lumbis intercipit. Adit is externam tunicam coli intestini, adipem renalem, peritonaeum, ligamentum lienis, & cum colicae pariter & capsularis arteriae alicujus ramo adiposo communicavit.

Mediae adeunt mediam fere renis faciem, quam vasa ingrediuntur. Eae tamen non raro vel per universum renem anterieus disperguntur, vel per inferiorem ejus partem: EVSTACHIVS T. XXV. Producentur aliae ex renalibus (y) casque habet VESALIUS p. 491. EVSTACHIVS l. c. VERHEYEN T. XII. f. 1. BOVRDON l. c. RAV p. 104. GARENGEOT. II. p. 97. Has vidi longe per peritonaei superficiem ad os illium usque descendisse, inosculatas spermaticarum & lumbalium ramulis. Alias hujusmodi arteriola comes spermaticae, tamquam secunda seminalis longe descendit in funiculo spermatico. Aliae ex spermaticis veniunt, (6. 1.) quarum primus ramus (primive) non longe ab ortu medium adipem renis adscendit. Haec est ea arteria spermatica, quam in adipe consumtam vidit IDO WOLF observ. p. 64. & hujusmodi adiposas habet WINSLOW III. n. 220. tr. des arter. & forte LIEVTAVD p. 493. Denique ex aorta infra renales, exeuntes ad adipem, glandulasque magnis vasis circumpositas varie distributae visae sunt.

Ima adiposa perpetuo prodit a spermatica (7. 3.) postquam imum extremum renis adrigit. Ibi enim & arteria & vena memorabilem ramum & paulo trunco minorem edit, circa exteriorem circumferentiam renis adscendentem, & cum superioribus adiposis inosculatum. Eadem cum ileocolicae ramis posticis multis locis com-

municat in caeci sede, & cum aliis inferioribus spermaticae ramis.

Vidi etiam duas hujusmodi adiposas ex una spermatica, sed id rarius est. Istam arteriam adiposam habent VESALIUS L. V. f. 20. LOESEL de off. ren. p. 10. BOVRDON l. c. VERHEYEN l. c. p. LVD OV. RIPA in iconibus, DOUGLAS l. c. BIDLOO T. XXXXII. & alii.

Sed etiam lumbalis tertia ad imum renis adipem non raro ramulos mittit fursum & posterius, in occursum ramorum, qui ex renalibus & capsularibus descendunt.

9.) Ad spermaticarum arteriarum originem variabilem hic unice observationes meas proprias ex triginta cadaveribus adferam, ut confirmem, quod ad BOERHAAVIUM scripsi, esse nempe variabilem.

Ex aorta utramque ortam fuisse, observavi decies osties. Inaequabili autem modo prodire ut sinistra altior esset sexies, atque tunc sinistra, postquam adscenderat, ter circa venam emulgentem, semel circa azygam conflexa, unco facto, descendit. Bis dextra insigniter altior prodit. In reliquis altitudo parum diversa fuit. Porro ex capsulari arteria sinistra prodit sexies. Ex renali eadem ter.

Sinistrae spermaticae duae fuerunt, cum dextra una a renali, altera ab Aorta oriretur bis, ut una a capsulari altera ab aorta exiret, semel.

Semel sinistrae duae fuerunt, & totidem dextrae, ut duae super renales, communi cum capsularibus trunco, sub iis vero duae aliae arteriae vicinae Mesocolicae prodirent, omnes ex Aorta.

Dextra a capsulari bis prodit.

Dextrae bis duae fuerunt, cum unica sinistra: semel una a renali altera ab aorta semel utraque ab Aorta. Duae cum duabus sinistris, uti dixi, semel.

Spermaticae caeterum arteriae ramos hic non prosequor, quos vide in Comm. Boerb. T. V. P. I. p. 275. 298. & in iconibus arteriarum pelvis. Adiposam priorem medii fere renis regionem perambulantem, dixi not. 8. inferiorem ad imum renem not. eadem. Arteriolas ad ureterem continuo dicam. Ramulos ad duodenum, & Mesocolon dixi p. 48. ad Mesentericarum arteriarum historiam. Ramuli denique introrsum ad glandulas lumbales euntes, ibi cum aorticis arteriis, not. 7. & cum mesocolicis anastomoses habent.

10.) Vasa haec, ob parvitatem fere omissa, dicta p. 31, Comm. Boerb. T. III. sunt hujusmodi. Cum



- 5 SpermatICA sinistra.
- 6 Adiposae inde ortae.
- 8 Ramus ad testes.
- 9 Adiposa ex capsulari postica orta.
- 10 Arteria Mesenterica inferior.
- 11 11 Iliacae communes.
- 12 12 Externae.
- 13 13 Internae.
- 14 14 Epigastricae.
- 15 Sacra arteria.
- 16 Ureterica sinistra.
- 17 Arteria ureterica dextra inferior.
- 18 Vena sacra.
- 19 Vena Capsularis dextra.
- 20 Vena renalis sinistra. 11)

21 Ca-

Cum praelongus sit canalis, habet plurium generum arteriolas. Supremae, ad pelvim, partemque reni proximam, sunt ex renalibus fere, saepe etiam adipi communes. Vidi a capsularibus fuisse, & frequentius etiam a spermaticis.

Mediae vel ab Aorta veniunt, vel ex magnis truncis Iliacis. Ab Aorta nempe, proxime ubi finditur, una (2), vel duae dextra & sinistra, prodeunt quae longulae, ad mediam partem ureteris, incumbentem Iliacis vasis, ramos dant, & sursum, ad renalium furculos, & deorsum, ad hypogastricarum propagines continuatos.

Sed hi rami aequae frequenter vel frequentius ab Iliacis proveniunt, in glandulas lumbales sursumque versus renem propagatae: Prodeunt autem modo a communi Iliaca (16.), modo ab hypogastrica haud longe ab ejus origine (12.). Est ubi ex Umbilicali, prima omnium vasorum ab ejus a magnis ramis pelvis discessu prodierunt. Dant & deorsum in pelvim & sursum longe furculos per ureterem, tum peritonaeo pelvem vestienti, glandulis conglobatis pelvis &c. Medios tamen, ad inum renem, etiam a spermaticis prodisse vidi.

Imae uretericae una utrimque, quae circa insertionem ureterum in vesicam oriuntur, constanter veniunt ab arteriis imis vesicalium in viris, quae eadem vesiculas seminales perreptant, in feminis vero ex magnis arteriis uterinis. Eae sursum euntes cum mediis communicant. Dixi

p. 421. COMM. BOERH. V.P.I. & in vasis pelvis depictas dabo.

11) Venarum renalium varietates mihi rariores videntur, quam arteriarum. Quater tantum reperio duas dextras me reperisse, & semel, dextrarum superiorem dedisse capsularem sui lateris. Brevem caeterum & reconditam magis esse eam dextram, & ramum vix ullum edere, qui reni non accedat, & raro azygae ramum recipere, alibi dictum est. Eadem magis quam sinistra descendit, vide CHESDEN I. c. T. XXII. & monentem FANTONVM *Dissert. Anat. renov.* p. 312. & C. BAUHINVM p. 74. VESALIUS & EVSTACHIVS recte observant, altitudinem renalium vasorum sibi non satis respondere, ille p. 474. hic *de renib.* c. 15. p. 60. quod ita intelligendum est, ut plerumque, uti ren dexter sinistro, ita haec vena sua sodali sit humilior.

Deinde simplices quidem plerumque fecit renales utrinque EVSTACHIVS T. I. f. 1. quae est T. XII. f. 1. T. I. f. 2. quae est, quod ad vasa T. XII. f. 3. & cujus ren sinister repetitur T. XIII. & T. XXV. tum T. I. f. 3. quae est T. XII. f. 7. & T. II. f. 1. 2. 3. Simplicem etiam, uti quidem naturaliter esse videtur, CASSERIVS pinxit L. VIII. T. X. f. 1. & T. XI. XII. XIII. & VESLINGIVS T. ad c. V. f. 1. Dextras duas sinistram unam EVSTACHIVS T. II. f. 1. T. III. f. 2. quae est f. 12. T. XII. VESLINGIVS T. ad c. V. f. 2. T. ad c. VII.



- 21 Capsularis sinistra ex renali.
- 22 Adiposa ex eadem. ¹²⁾
- 23 SpermatICA ex eadem. ¹³⁾
- 24 Renalis dextra prima.
- 25 Secunda.
- 26 SpermatICA inde orta.
- 27 Adiposa ex eadem.
- 28 & ex Cava.
- 29 Vesicae apex.

c. VII. f. 2. T. BARTHOLINVS *Cent. I. hist.* 38. Tres dextras finistram unam EVSTACHIVS T. III. f. 1. quae est f. 9. T. XII. SALOM. ALBERTI ic. post orationes p. 162.

Tres dextras finistras quatuor PAREVS L. II. c. 25. Tres dextras & finistras duas EVSTACHIVS T. III. f. 3. sive T. XII. f. 12.

In universum geminatas arterias venasque renales vidit jam citatus FALLOPIVS *obs. anat.* p. 197. b. 180. HARDER *in apiario* p. 296. & duplicem & triplicem venam renalem se observasse scripsit LAVRENTIVS L. IV. c. 5. p. 125. & RIOLANVS L. II. c. 24. p. 141. qui recte addit id in dextro latere frequentius esse, & ROLFINKIVS p. 937. & KVLMVS p. 89. Dari duas, etsi frequentius una sit, DIEMERBROECKIVS p. 493.

Sinistra vena renalis valde constans, magna, praelonga (COWPER l. c.) fere transversa vel parum inclinata, ut in hac icone, trans Aortam migrat, in qua nullam memini me vidisse varietatem, vide adeo p. 207. 208. ad *Comm. Boerhaav. III.*

Ramum inter Cavam & Emulgentem communicantem pingit LEONCENA l. c. Quid denique verum sit in splenici rami insertionem in emulgentem, dicta RHODIO in *Mantiff. Anat.* n. 28. vel tribus ramis a vena Emulgente ad lienem euntibus IACOBI SYLVII in *Isagog.* p. 70. haecenus ignoro.

Si plures auctorum locos desideres vide p. 207. 208. *Comm. Boerhaav. T. III.*

12.) Adiposarum venarum nullam certam legem novi. Dextra oritur vel ex Cava vena super renales (ubi propria literula omissa est) vel infra eas ad divisionem usque Cavae (28). Vel sola ex Cava prodiit ut EVSTACH. T. f. 1. vel capsulari conjuncta, EVST. p. 61. T. I. f. 2. T. II. f. 1. 3. Vel ex renali dextra oritur, unde venam ad peritoneum reni vicinum atque duodeni partem transversam secundam euntem vidi. Habet etiam adiposam ex renali dextra ad totum renem solam EVSTACHIVS p. 61. T. II.

f. 1. & f. 2. A sinistra renali etiam vidi oriundam, vel solam, EVSTACH. T. I. f. 1. T. II. f. 1. ubi duas pingit T. II. f. 3. cum spermatICA conjunctam EVSTACH. l. c. p. 61. C. BAVHIN. p. 74. vel junctam cum capsulari, ut EVSTACHIVS T. I. f. 1. T. II. f. 1. 2. 3. aut phrenicae alicui inferiori EVST. T. II. f. 1. c. BAVHIN. *theatr.* p. 205. A renalibus adiposas deducit D. de MARCHETTIS c. 5. p. 30. & WINSLOW III. *tr. des vein.* n. 152. BOVDON. l. c. KVLMVS p. 89. qui cum phrenicis communicare addit. Ex azyga adiposa cariori spectaculo visa est ADAMO KVLMVS *Bresl.* 1720. p. 327. A spermatICA vena & eodem fere cum arteriis loco (27.), ad idem renis adipem etiam cum arteria ramus venit not. 8. & EVST. T. II. f. 2. LOESEL l. c. WINSLOW n. 155. conf. p. 201. *Comm. Boerh. T. III.* & LIEVTAUD 524.

Caeterum hujusmodi adiposae venae in eodem corpore plures conjunctae adsunt, magis tamen in dextro latere a Cava, in sinistro a renali. Reliqui praeter EVSTACHIVM veteres fere confuderunt cum Capsularibus.

Uretericae a renalibus, spermaticis, & hypogastricis perinde (prope 15.) oriuntur, & anastomoses inter renales & Iliacas faciunt.

13) Spermaticarum venarum origo non quidem penitus constans est. In dextra quidem vena inter copiosissima exempla has tantum varietates reperi. Semel communi trunco cum capsulari prodiit. Semel ex dextra renali non ex Cava orta est. Duae fuerunt & ex Cava semel. Duae quarum una ex Cava altera ex renali ter. Tres dextrae, & una ex ortu renalis, duae ex Cava semel. Quando vero plures sunt venae unius lateris, eae aliquando cito confluent in unum truncum, alias longe parallelae & distinctae incedunt, in corpore tamen pampiniformi confunduntur. Sed vide Vol. V. *Comm. Boerb. P. I. p. 276. sqq.*

In sinistro latere semel tantum duas spermaticas venas & utramque ex renali orram reperio me invenisse, aliquoties vero conjunctam sperma-

30. Ura-

30 Urachus. ¹⁴⁾

31 Arteriae umbilicales.

32 Omiffa cafu in tabula vena adipofa ex cava orta, comes arteriae capfularis, quae ex renali venit.

spermaticae venam fine pare, neque quidquam invenio, unde cum D. LIEVTAUD concluderem, in ordinaria fabrica spermaticam finiftram venam in capfularem inferi p. 514. Hiftoriam alibi dabo. Ramos autem adipofos superiores comites arteriarum, not. 12. inferiores ibid. uretericos, ad peritonaum, eosque copiofiores, ad duodenum denique, perinde, ut arteriae, edunt.

¹⁴⁾ Ad urachi hiftoriam addere liceat, quae poft meos in BOERHAAVIVM commentarios V. P. I. p. 368. in aliquot corporibus, tum tenerorum fetuum, tum maturorum reperi. Vagina circumpofita uracho, orta a fibris externis veficae, confans eft, & magnam partem

molis urachi efficit. Sed cito major pars fibrarum recedit, & adarterias umbilicales divergit, quibus fuperfternuntur, hinc fuperior & umbilico propior pars urachi gracilior eft. Intra eam nunc vaginam, reperio canalem verum, liquido pellucido & gelatinofo plenum, variabili diametro, qui fatis facile fetam tenuiorem recipiat, & in vefica minuto osculo, neque femper vifibili, aperiatur, in quod tamen bis vel ter fetam ad fex omnino lineas introduxi. Difsectus canalis limpidam gelatinam stillat. In umbilicali fune per uncias aliquot eum perfecutus fum, donec nescio quomodo in filamenta extenuatus & arteriis umbilicalibus adhaerens evaneſcat, ut ultra perſequi nequeas.



1. The first part of the history is the history of the world.

2. The second part of the history is the history of the

3. The third part of the history is the history of the

4. The fourth part of the history is the history of the

5. The fifth part of the history is the history of the

6. The sixth part of the history is the history of the

7. The seventh part of the history is the history of the

8. The eighth part of the history is the history of the

9. The ninth part of the history is the history of the

10. The tenth part of the history is the history of the

11. The eleventh part of the history is the history of the

12. The twelfth part of the history is the history of the

13. The thirteenth part of the history is the history of the

14. The fourteenth part of the history is the history of the

15. The fifteenth part of the history is the history of the

16. The sixteenth part of the history is the history of the

17. The seventeenth part of the history is the history of the

18. The eighteenth part of the history is the history of the

19. The nineteenth part of the history is the history of the

20. The twentieth part of the history is the history of the

21. The twenty-first part of the history is the history of the

22. The twenty-second part of the history is the history of the

23. The twenty-third part of the history is the history of the

24. The twenty-fourth part of the history is the history of the

25. The twenty-fifth part of the history is the history of the

26. The twenty-sixth part of the history is the history of the

27. The twenty-seventh part of the history is the history of the

28. The twenty-eighth part of the history is the history of the

29. The twenty-ninth part of the history is the history of the

30. The thirtieth part of the history is the history of the

31. The thirty-first part of the history is the history of the

32. The thirty-second part of the history is the history of the

33. The thirty-third part of the history is the history of the

34. The thirty-fourth part of the history is the history of the

35. The thirty-fifth part of the history is the history of the


36. The thirty-sixth part of the history is the history of the

37. The thirty-seventh part of the history is the history of the

38. The thirty-eighth part of the history is the history of the

39. The thirty-ninth part of the history is the history of the

40. The fortieth part of the history is the history of the



ARTERiarum RENALIUM TABULA.

J. D. Kaltenhofer del. et sc. Gött.

